

ఖనిజాన్వేషణ పద్ధతులు

రచయిత

స్వర్ణీయ డాక్టర్ సి. బొరేశ్వర రావు, ఎమ్.ఎస్.సి; డి.ఎస్.సి. సి.యస్.సి
(మాస్కో) డైరెక్టర్ ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్, పబ్లికేషన్స్
ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్తు, వాల్తేరు

సంపాదకుడు

ఆచార్య ఎ. శ్రీరామదాస్, ఎమ్.ఎస్.సి; ఎ.ఎమ్ (హార్వర్డ్);
విహెచ్.డి. (హార్వర్డ్)
ప్రిన్సిపాల్, యూనివర్సిటీ కాలేజీ ఆఫ్ సైన్స్, టెక్నాలజీ.
ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్తు, వాల్తేరు.



తెలుగు అకాడమి
హైదరాబాదు

1984

monograph : khanijaanveeshana paddhatulu (Mineral Prospecting Methods) Authors: Late Dr. C. Borreswara Rao, Editor; Prof. A. Srirama Das. First Edition. 1984 pp. iv + 186

© TELUGU AKADEMI
HYDERABAD

First Edition, 1984

Copies: 1000

Published by TELUGU AKADEMI,
Hyderabad-29 (Andhra Pradesh) under the
Centrally Sponsored Scheme of Production of
Books and Literature in Regional languages at
the University level, of the Government of
India in the Ministry of Education and Social
Welfare (Department of Culture), New Delhi.

*All rights whatsoever in this book are strictly
reserved and no portion of it may be reproduced
by any process for any purpose without the
written permission of the Copyright owners.*

Price ; Rs. 10.00

Printed in India

Text at Prasad Printers, M. C. H. 27, Esamia Bazar, Hyd.

Cover at Anupama Printers, Hyderabad-500028

Andhra Pradesh.

భూ మి క

తెలుగు అకాడమి ఇంతవరకు ఇంటర్మీడియట్ స్థాయిలో పాఠ గ్రంథాలను, డిగ్రీస్థాయిలో వతనీయ గ్రంథాలను 300 పైగా ప్రచురించింది. శాస్త్రగ్రంథ ప్రచురణలో ఇవి మొదటిదశ. రెండోదశలో కొన్ని ప్రామాణిక గ్రంథాలకు అనువాదాలను, ఆయా శాస్త్రాంశాలమీద వాటివాటి ప్రాముఖ్యాన్ని పునర్నర్పించుకొని కొన్ని మోనోగ్రాఫ్లను ప్రచురించదలచింది.

ఇందువల్ల విద్యార్థులకూ, ఉపాధ్యాయులకూ పాఠ్యగ్రంథాలేకాక ఆయా పాఠ్యాంశాలమీద విస్తృతాధ్యయనానికి సహాయపడే విషయ ప్రధాన రచనలుకూడా లభిస్తాయి. అంతేకాదు ఉన్నత విద్యాబోధన భాషగా తెలుగు సుప్రతిష్ఠితమై తెలుగు అకాడమి పాత్ర మరింత సునంపస్నం కాగలదు.

విశ్వవిద్యాలయస్థాయిలో శాస్త్ర గ్రంథ ప్రచురణ చేపట్టిన ఈ రెండో దశలో “మోనోగ్రాఫ్” అనే పేరిట ప్రచురితమవుతున్న గ్రంథాలలో ఇది ఒకటి. (చిత్రకారునకు, ముఖచిత్ర రచయితకు ఈ గ్రంథ ప్రచురణ లో మాకు తోడ్పడినందుకు మాకృతజ్ఞతలు).

గుణగ్రహణ పారీక్షులయిన పాఠకులు ఈ గ్రంథాన్ని అభిమానించి ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాము. సహృదయ విమర్శకులు ఇచ్చే నూచనలను పునర్ముద్రణలో తప్పక పరిశీలించగలము.

విషయ సూచిక

1. పరిచయము	1-8
2. భూవిజ్ఞానశాస్త్ర విధానము	9-30
3. భూ రసాయనశాస్త్ర విధానాలు	31-93
4. జల-భూ రసాయనిక విధానాలు	94-101
5. జీవ భూరసాయనిక విధానాలు	102-112
6. భూ భౌతిక శాస్త్ర విధానాలు	113-135
7. ముగింపు	136

పరిచయము

మానవుడు అనాది నుంచి ప్రకృతి సంపదను తన శ్రేయస్సుకు వినియోగించు కోవడం మొదలు పెట్టినాడు. అటువంటి ప్రకృతి సంపదలో ఖనిజాలు అతి ముఖ్యమైనవి నాగరకతాభివృద్ధితోబాటు ఖనిజాల వాడుకకూడా వృద్ధి చెందినవి. ముఖ్యంగా ద్వితీయ ప్రపంచ సంగ్రామం తరువాత పిటి ఉత్పత్తి వాడుక అంతకు ముందెన్నడూ లేని ప్రమాణంలో ఉన్నాయి. ఖనిజాల వాడుకను ఎక్కువ చేసేముందు ప్రపంచ పౌరులుగా మనము ఆలోచించవలసినది, జ్ఞాపకముంచుకోవలసినది ఒక్కటే: ఖనిజాలు వ్యవసాయ వస్తువులపై ప్రతి సంవత్సరం పండే పంట కాదు. భూమినుంచి ఖనిజాలను మనము ఏ ప్రమాణంలో తీస్తుంటామో అవి అదే ప్రమాణంలో భూమిలో తరిగి పోతూఉంటాయి. కొంతకాలానికి ఈ ఖనిజాలు భూమిలో పూర్తిగా లోపిస్తాయి. అటువంటి పరిస్థితులలో ఖనిజాలమీద మానవుడు పూర్తిగా ఆధారపడి ఉన్నందువల్ల అతని మనుగడకు, పురోభివృద్ధికి చాలా ఆఘాతం కలుగుతుంది. ఈ విధమైన క్లిష్టపరిస్థితి కనుచూపుమేరలో ఉండగానే ఖనిజాల ఉత్పత్తిలోను, వాడుకలోను మనము చాలా జాగ్రత్త వహించవలె ఇదిగాక భూమి అంతర్భాగంలో ఏ ఏ ఖనిజాలు ఏ ప్రమాణంలో ఉన్నాయో అంచనాలు వేసుకొని మానవుని భావిశ్రేయస్సుకు, పురోగతికి ఆడ్తులేని మార్గాన్ని నిర్మించడం ప్రస్తుత తరం వారి బాధ్యత.

ఖనిజాన్వేషణ అనేక పద్ధతులద్వారా చేయవచ్చు. శాస్త్రపురోభివృద్ధితోబాటు ఖనిజాన్వేషణ పద్ధతులు కూడా చాలా అభివృద్ధి చెందినాయి. ఖనిజాన్వేషణ ప్రారంభించేముందు ఈ పద్ధతులను గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యము. ఖనిజాన్వేషణ శాస్త్రీయ పద్ధతులద్వారా కాకుండా అశాస్త్రీయ పద్ధతులలో సాగించడం వృధాశ్రమే అవుతుంది.

ఖనిజాలను అయిదు ముఖ్యభాగాలుగా విభజించవచ్చు. అవి: (1) అమూల్యలోహాలు, డైమండ్లు (2) ఐరన్, ఐరన్ ధాతు ఖనిజాలు. (3) మూలాధార

లోహాలు (base metals) (4) ఖనిజ ఇంధనాలు, (5) పారిశ్రామిక మూలఖనిజాలు ఈ అయిదు ఖనిజ విభాగాలు భూమిలో వివిధ రీతులలో దొరుకుతాయి. అనాదిగా మానవుడు ఈ వివిధ ఖనిజ నిక్షేపాలను చాలావరకు కాకతాళీయంగానే కనుక్కొనేవాడు. శాస్త్రవిజ్ఞానాభివృద్ధితోబాటు ఈ కాకతాళీయ పద్ధతులలోకూడా అనేక మార్పులు వచ్చినాయి. ప్రస్తుతం కొత్త ఖనిజ నిక్షేపాలను ఎక్కువగా శాస్త్ర పద్ధతుల ద్వారానే కనుక్కొంటున్నారని చెప్పవచ్చు. వివిధ పారిశ్రామిక రంగాలలోను ఖనిజాల ఉపయోగము విరివిగా ఉన్న ఈ వర్తమానంలో ఖనిజనిక్షేప విషయసేకరణ ఎంతతీవ్రగతిని సాగితే అంత శ్రేయోదాయకము. లోహఖనిజాలు గాని, అశోహ ఖనిజాలుగాని వాడుకలోలేని పరిశ్రమే లేదని చెప్పవచ్చును.

భూవిజ్ఞానశాస్త్ర వివిధ పద్ధతులు :

భూవిజ్ఞానశాస్త్ర ప్రప్రథమంగా కాకతాళీయంగానే జరిగేదని వైనం చెప్పడం జరిగింది. రాను రాను శాస్త్రపురోభివృద్ధితోబాటు ఖనిజనిక్షేపావనరాలు కూడా ఎక్కువ అవుతూవచ్చినాయి. అందువల్ల ఈ కాకతాళీయపద్ధతులు ఖనిజనిక్షేప విషయసేకరణకు అంతఉపయుక్తాలుగా ఉండవు. శాస్త్రపురోభివృద్ధితోబాటు ఖనిజ నిక్షేపవిషయసేకరణలోకూడా మార్పులు వచ్చినాయి. భూవిజ్ఞానశాస్త్ర పద్ధతులను కింది విధంగా విభజించవచ్చు. (1) భూవిజ్ఞానశాస్త్ర పద్ధతి, (2) భూభౌతికశాస్త్ర పద్ధతి, (3) భూరసాయనిక శాస్త్రపద్ధతి. వీటిలో మొదటిది అనాది కాలంనుంచీ కూడా అనునరణలో ఉన్నదే. ఇది భూవిజ్ఞాన శాస్త్రంతోబాటు ఎప్పటికప్పుడు దినదిన ప్రవర్ధమానమవుతూఉంది. వివిధశిలల భౌతిక ధర్మాల నాదారంగా తీసుకొని భౌతిక శాస్త్రప్రయోగాలద్వారా నిధినిక్షేపాలను కనుక్కోవడం భూభౌతిక శాస్త్రపద్ధతి అవుతుంది. అదేవిధంగా వివిధశిలల రసాయనిక ధర్మాల నాదారంగా చేసుకొని రసాయనిక శాస్త్రప్రయోగాల ద్వారా నిధినిక్షేపాశ్లేషణ జరిపించడం భూరసాయనిక శాస్త్రపద్ధతి. ఈ మూడింటిలోను ఏ ఒక్క పద్ధతీ మిగిలిన వాటికి తీసిపోదు. భూవిజ్ఞాన శాస్త్రపద్ధతిద్వారా శిలలుపైకి కనబడే ప్రదేశంలో మానవాళికి కావలసిన ఖనిజనిక్షేపాలన్నింటిని గురించీ పరిశోధించవచ్చు. కాని భూభౌతిక శాస్త్ర భూరసాయనిక శాస్త్రపద్ధతులు కొన్ని నిధినిక్షేపాల విషయ సేకరణకు పనికిరావు. ఈ మూడు పద్ధతులను ఒక్కొక్కటిగా ప్రయోగించి విషయసేకరణ జరిపించడం చాలా లాభకరము. ఫలితాలు విజయవంతంగా ఉంటాయి.

శిలలు ఖనిజనిక్షేపాలు :

భూ విజ్ఞానశాస్త్రవృత్తి ద్వారా ఖనిజనిక్షేపాన్వేషణ వివిధంగా ఉంటుందో తెలుసుకొనేముందు వివిధరకాలైన ఖనిజనిక్షేపాలు భూమి అంతర్భాగంలో ఏ రీతిగా ఉంటాయో తెలుసుకోవడం చాలాముఖ్యము. ఖనిజాల సముదాయమే శిల అని. ఇటువంటి శిలలలో ఖనిజవిస్తరణ ప్రకృతి ధర్మాలనుసరించి ఉంటుందని మనము గ్రహించవలె. ఈ విధంగా ప్రకృతి ధర్మానుసారం విస్తరించియున్న ఖనిజాలు మూడువిధాలు : మాగ్మాసంబంధ ఖనిజ సముదాయము, అవక్షేపఖనిజ సముదాయము, రూపాంతర ప్రాప్తఖనిజ సముదాయము.

మాగ్మాసంబంధ ఖనిజ సముదాయాలు మాగ్మాటిక్ అంగవిభజనలోని, వివిధ దశలలో రూపొందుతూ ఉంటాయి. కొన్ని ఖనిజాలు చాలాలోతైన మాగ్మా కోష్ఠికలో ఏర్పడతాయి. (క్రోమైట్, వజ్రాలు). కొన్ని మధ్యంతరంగా ఉపరితలాల నీకి లోతైన మాగ్మాకోష్ఠికకు చుట్టూ ఏర్పడతాయి. మరికొన్ని భూమి ఉపరితలాల నీకి సమీపంగాను ఉపరితలంమీదను ఏర్పడతాయి. ఈ మాగ్మాసంబంధ ఖనిజాలలో క్రోమైట్, వజ్రాలు, కొన్ని అరుదైన లోహఖనిజాలు చాలా లోతులోను, కొన్ని పరిస్థితులలో మాగ్మాఅంతర్భాగంలోను ఏర్పడతాయి. బీస్, టాంటులమ్ నియోబియమ్ (కొలంబియమ్) మొదలైన వాటి ఖనిజాలు, టూంగ్స్టేన్, బెరీల్, టాపాజీల వంటిరత్నాలు, స్వర్ణసహితమైన క్వార్ట్జ్ సీలలు మాగ్మాకు కొంచెం చూపంలో ఏర్పడతాయి భూమి ఉపరితలాలనీకి కొంచెం దగ్గరలో ఏర్పడేవి ఓంగ్ స్టన్, మోవిల్లనమ్, కావర్, జింక్, లెడ్, సిల్వర్ మొదలైనవాటి ఖనిజాలు. ఇవి ఉపరితలం చిశగా ప్రయాణించేసే వాయువులు, ఉష్ణజలీయ ద్రావణాలద్వారా నిక్షేపితమవుతాయి. మాగ్మాకోష్ఠికకు ఇంకాచూపంగా నిక్షేపితమయ్యేవి, ఆంటి మోన్, ఆర్సెనిక్ ఖనిజాలు, సినిబార్ మొదలైనవి. ఇవి మాగ్మా జలాలూ చల్లబడిన తరువాత వాటినుంచి అవక్షేపరూపాలుగా నిక్షేపితమయ్యే ఖనిజాలు. ఈ విధమైన ఖనిజాభివృద్ధి సిద్ధాంతము ఖనిజాన్వేషణకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది.

మాగ్మా సంబంధ శిలలను వాటిలోగల సిలికా శాతాన్నిబట్టి నాలుగువర్గాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. అవి (1) అలిమూరిక శిలలు ($SiO_2 < 40\%$), (2) మౌలికశిలలు ($SiO_2 = 40.55\%$), (3) మాధ్యమిక శిలలు ($SiO_2 = 55-65\%$), (4) ఆమ్లశిలలు ($SiO_2 > 65\%$). అవక్షేపశిలలలోని ముఖ్యమైన రకాలు : (1) ఇసరాయి, (2) షేల్. (3) సున్నపురాయి. ఈవిభజన వాటి సిలికా

శాతాన్ని బట్టికాక వాటి మొత్తం ఖనిజ సంఘటననుబట్టి ఉంటుంది. రూపాంతర ప్రాప్తశిలల విస్తృతమైన మొదలైన అనేక రకాలు ఉన్నాయి. ఖనిజసంఘటన రూపాంతర ప్రాప్తిదశ, శిలల వయసాలను బట్టి వీటి విభజన జరిగింది.

అవశేష శిలలలోని ఖనిజసముదాయము రెండు విధాలుగా ఏర్పడుతుంది. ఇటువంటి శిలలు ఏ ఏ ప్రక్రియల ద్వారా ఏర్పడతాయో వాటిలోని ఖనిజ సముదాయం కూడా అవే ప్రక్రియల ద్వారా ఏర్పడతాయి. ఈ అవశేష శిలలలోకి మాగ్మా సంబంధ శిలలు అంతర్గమనం చెందినప్పుడు ఏర్పడే ఖనిజ సముదాయము రెండవ రకము. రూపాంతర ప్రాప్త శిలలలోని ఖనిజ సముదాయం కూడా ఆయా శిలలు ఏ ప్రక్రియల ద్వారా ఏర్పడినాయో అటువంటి ప్రక్రియల ద్వారానే శిలలతో బాధే ఏర్పడుతుంది. ఈ విధంగా కాకుండా రూపాంతర ప్రాప్త శిలలలోనికి మాగ్మా సంబంధ శిలలు అంతర్గమనం చెందినప్పుడు కూడా ఖనిజ సముదాయము ఏర్పడుతుంది. అవశేష శిలలలోను, రూపాంతర ప్రాప్త శిలలలోను మాగ్మా సంబంధ శిలల అంతర్గమనం వల్ల ఏర్పడే ఖనిజ సముదాయము మాగ్మా సంబంధ ఖనిజ సముదాయపు విభాగంగానే చెప్పవచ్చు.

శిలలు -- ఖనిజ సముదాయాలు :- శిలల రసాయనిక, ఖనిజ సంఘటనలను బట్టి వాటిలో ఏర్పడే ఖనిజ సముదాయాలు విభిన్నంగా ఉంటాయి. అవశేష శిలలలో గాని, రూపాంతర ప్రాప్త శిలలలోగాని మాగ్మా ద్రావణాల వల్ల ఏర్పడే ఖనిజాలు కూడా ఆయా శిలల సంఘటనలను బట్టి ఉంటాయి. ఈ విధంగా శిలల రకాలను బట్టి కనుక్కోగల ఖనిజాలు చాలా ఎక్కువ. కాబట్టి ఖనిజ నిశ్చేపాన్నేషి మొట్ట మొదట గ్రహించవలసినది; శిలలు, వాటి ఉనికి, వాటిలో ఏ ఏ ఖనిజాలు ఏర్పడతాయి. అనేది. భూ విజ్ఞాన శాస్త్ర పద్ధతిలో ఖనిజాన్వేషణకు తొలి మెట్టు ఇది వివిధ రకాలైన శిలలు, వాటికి సహజీతంగా దొరికే ఖనిజ సముదాయము, ఖనిజాలు ఈ దిగువన పొందుపరచినాము.

(1) అతి మౌలిక శిలలు :- అతిమౌలిక శిలలలో ఆలివీన్, మైరాక్సిన్ ఉంటాయి. వీటిలో దొరికే ధాతు ఖనిజాలు ప్లాటినమ్, (క్రోమైట్, పారిశ్రామిక మూల పదార్థమైన ఆస్ట్రెస్టాస్ టైటానియమ్ మిశ్రితమైన మాగ్నెట్ టైట్ మొదలైనవి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని, అనంతపురం జిల్లాలోని వజ్రకరూరు వద్ద వజ్రయుత అగ్ని శిల, మైసూరు రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో లభించే (క్రోమైట్, ఆంధ్రలోని కృష్ణా జిల్లా కొండవల్లి వద్ద లభించే క్రోమైట్, మైసూరు నుగ్గహళ్ళి

షిస్ట్ మేఖలలో లభించే బైటానియమ్ మిశ్రిత మాగ్నైట్ సిరలు, ఆంధ్రాలోని తూర్పు గోదావరి జిల్లా అడ్డతీగల గ్రామ సమీపాన గల మాగ్నైట్-టైరాక్సి నైట్ సిరలు, తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని కన్యాకుమారి జిల్లా ఆరుమ నల్లూరు గ్రామం వద్ద గల నల్మేట్ ఖనిజ సిరలు ఈ కోవకు చెందినవే.

(2) మౌలిక శిలలు : ఈ తరగతికి చెందినవి గ్రానో, నౌరైట్ మొదలైనవి. వీటిలో మాగ్మా నుంచి నృటికి కరణం చెందిన ధాతు ఖనిజాలు మాత్రమే లభ్యమవుతాయి. మిగిలిన రకపు ధాతు ఖనిజాలు చాలా అరుదు. ఈ శిలలలో లభ్యమయ్యేవి : ప్లాటినమ్, కావర్, నికెల్, ఐరన్, బైటానియమ్ ధాతు ఖనిజాలు.

(3) మాధ్యమిక శిలలు: వివిధ ఖనిజ సంపర్క కేంద్రీకరణకు ఈ మాధ్యమిక శిలలంత అనుకూలమైనవి మరేవి లేవు. మాగ్మా నృటికి కరణ ద్వారా ఏర్పడిన ఖనిజ సముదాయమే కాక మాగ్మా అంతర్గమనం ద్వారా ఏర్పడిన ఖనిజ సంపత్తి, అగ్ని వర్షిత నిర్గమాల ద్వారా, ఉష్ణ జలీయ ప్రక్రియ ద్వారా ఏర్పడిన ఖనిజ సముదాయం కూడా ఈ మాధ్యమిక శిలలలో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఈ శిలలలోని సాధారణ ఖనిజాలు : ఆర్థోక్లేస్, ప్లజియోక్లేస్, హార్నబ్లెండ్ ఇవి కాక కొన్ని రకపు శిలలలో క్వార్ట్జ్ కూడా ఉండవచ్చు. ఈ మాధ్యమిక శిలలలో మనకు లభ్యమయ్యే ధాతు ఖనిజ నిక్షేపాలు అమూల్యమైన కావర్, మోలిబ్డెనమ్, గోల్డ్, సిల్వర్, ఐరన్, జింక్, లెడ్. భారతదేశంలో ఈ తరగతికి చెందిన ఖనిజ నిక్షేపాలు : కర్ణాటక రాష్ట్రపు చిత్రదుర్గ జిల్లాలోని ఇంగళదాస్ వద్ద ఉన్న కావర్ నిక్షేపాలు.

(4) పెట్రోల్ రసాయన : పెట్రోస్పార్, నెఫిలీన్, ముఖ్య ఖనిజాలుగా ఉండే ఈ అగ్నిశిలలలో కూడా కొన్ని అపురూపమైన ఖనిజాలు-ముఖ్యంగా కొరండమ్ - దొరుకుతాయి. ఈ నెఫిలీన్ నయనైట్లో పెగ్మాటైట్ దశ కూడా ఉన్నచోట్ల ఖనిజ సంపత్తి చాలా ఎక్కువ. తమిళనాడు రాష్ట్రం కోయం బత్తూరు జిల్లాలోని 'శివమలై' కొండలలో కొరండమ్ ఖనిజము నయనైట్ శిలలో దొరుకుతుంది.

(5) గ్రానైట్ :- నిలికా శాతము ఎక్కువగా ఉన్న ఈ శిలలలో క్వార్ట్జ్, పెట్రోస్పార్, ముఖ్యమైన ఖనిజాలు. ఈ గ్రానైట్లో ఉండే క్వార్ట్జ్ శిలలో టంగ్స్టన్, టీన్, మోలిబ్డెనమ్ దొరుకుతాయి. ఇవిగాక ఇంకా ఎన్నో

ఋణిజాలు ఈ గ్రానైట్ లలో దొరుకుతాయి. బీహారు రాష్ట్రంలోని సింగ్ భమ్ వద్ద లభ్యమయ్యే కావర్ ఋణిజ నిక్షేపాలు గ్రానైట్ లో నిరలుగా లభిస్తాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోను, అస్సాం రాష్ట్రపు 'ఖాసీ' కొండలలోను గ్రానైట్ శిలలలో మోలిబ్డెనైట్ లభ్యమవుతుంది. రాజస్థాన్ లోని 'రావత్' కొండలలో గ్రానైట్ శిలలలో టంగ్ స్టన్ నిరల రూపాలలో ఉంటుంది.

(6) పెగ్మటైట్ :- ఈ స్థూలరేణుయత శిలలలో క్వార్ట్జ్, ఫెల్ స్పార్ ముఖ్య ఋణిజాలు. మరి ఏ ఇతర శిలలలోను లభ్యం కాని అమూల్య ఋణిజాలెన్నో ఈ పెగ్మటైట్ లలో దొరుకుతాయి. రత్నాలు, రత్నయత ఋణిజాలు (కాశ్మీరులోని నూంజమ్ సెఫైర్ గనులు, ఆంధ్ర బీహారు రాష్ట్రాలలోని మైకా పెగ్మటైట్ లు), రేడియో ధార్మిక ఋణిజాలు (ఆంధ్ర, తమిళనాడు, కాశ్మీరు, కేరళ రాష్ట్రాలలోని పెగ్మటైట్ లు), టిన్, టంగ్ స్టన్, మైకా బెరిల్, లీథియమ్ లోహపు ఋణిజాలు, అపటైట్, ఫ్లోరైట్, మోనజైట్ మొదలైనవి, పెగ్మటైట్ లలో లభిస్తాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్, బీహార్ రాష్ట్రాలలోని పెగ్మటైట్ లలో మైకా, కరాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలోని కొన్ని పెగ్మటైట్ లలో బెరిల్, లీథియమ్ లోహపు ఋణిజాలు, ఆంధ్రప్రదేశ్, బీహార్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాలలోని మైకా పెగ్మటైట్ లలో అపటైట్, మధ్యప్రదేశ్ లోని (దూగ్ జిల్లా) లోని పెగ్మటైట్ సంబంధ క్వార్ట్జ్ నిరలలో ఫ్లోరైట్, బీహారు (గయ జిల్లా), కేరళ (క్రిలాన్ జిల్లా), కరాటక లోని పెగ్మటైట్ లలో మోనజైట్ ఉదాహరణలుగా తీసుకోవచ్చు, ఇవి కాక పెగ్మటైట్ లోని క్వార్ట్జ్, ఫెల్ స్పార్ లను పరిశ్రమలలో ఉపయోగిస్తారు.

(7) అగ్నిపర్వత శిలలు :- ఈ అగ్నిపర్వత శిలలు వాటి ఋణిజ సంఘటనను బట్టి చాలా రకాలుగా ఉన్నాయి. వీటిలో మౌలిక సంఘటనపు అగ్ని పర్వత గ్రీవ శిలలు అమూల్యములైన వజ్రాలకు ఉత్పత్తి స్థానాలు. మిగిలిన రకపు శిలలలో గోల్డ్, సిల్వర్, కావర్, నికెల్, టంగ్ స్టన్, ఫ్లోరైట్ లభ్యమవుతాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్, అనంతపురం జిల్లాలోని 'వజ్రకరూరు' వద్ద ఉన్న అగ్ని పర్వత గ్రీవ శిలలలో క్రైమండ్లు దొరుకుతాయి. బరోడా-జిల్లా, గుజరాతులోని ఫ్లోరైట్ అగ్నిపర్వత శిలలలో లభ్యమవుతుంది.

అవక్షేపశిలలు : అవక్షేప శిలలలోకూడా శిలల ఋణిజ సంఘటననుబట్టి అవక్షేపశిలలు వాటిలో ఏ ఏదాతు ఋణిజాలుంటాయో మనము తెలుసుకోవచ్చును.

(1) కంగ్రెగేటెడ్ :- వివిధ పరిమాణాలుగల రేణువులు రవాణాచెంది ప్రకృతి సిద్ధంగా బంధనం చెందిన తరువాత ఏర్పడిన ఈ శిలలో మనకు లభ్యమ

య్యేవి గోల్డ్, సిల్వర్ కాపర్, డైమండ్లు, రత్నాలు. ఆంధ్రాలోని 'జనగానవల్ల' వద్ద ఉన్న కంగ్లోమరేట్ శిల మధ్యప్రదేశ్ లోని 'పన్నా' వద్ద ఉన్న కంగ్లోమరేట్ శిలలలో ముఖ్యమైన డైమండ్లు లభ్యం కావడం ఉదాహరణలుగా చెప్పకోవచ్చు.

(2) ఇనకరాయి:- వివిధరకాల లోహ, అలోహధాతు ఖనిజాలు ఘనక ఇనకరాయిలో దొరుకుతాయి. ముఖ్యంగా చెప్పకోదగినవి: గోల్డ్, సిల్వర్, కాపర్, ఐరన్. మాంగనీస్.

(3) షేల్:- ఈరకపుశిల చాలా అప్రవేశ యోగ్యమైనందువల్ల ఈ శిలల సరిహద్దులలో లోహాలనల్పైడ్ ఖనిజ సముదాయం దొరుకుతుంది. ఇవిగాక ఈ శిలలలో ఏరకాలు ప్రాప్తిచెందిన ఐరన్, మాంగనీస్ కూడా దొరుకుతాయి. కర్బన భరిత షేల్లు వాటి సమీపంలో కర్బనపు నిక్షేపాలున్నాయని సూచిస్తాయి రాణిగంజ్ (పశ్చిమ బెంగాలు) వద్ద "ఐరన్ స్టోన్ షేల్" లో ఐరన్ లోహము నైడ్రేట్ గా దొరుకుతుంది.

(4) సున్నపురాయి :- డోలమైట్ సున్నపురాయిలో కార్బియమ్ కార్బోనేట్ ఎక్కువ శాతం ఉంటుంది. డోలమైట్ లో మెగ్నీషియమ్ కూడా ఉంటుంది. దీని ప్రవేశయోగ్యతా గుణం వల్లను, రసాయనికంగా ప్రతిస్థాపన క్రియకు చాలా అనుకూలమైనందువల్లనూ, సున్నపురాతిలో ఎన్నోరకాల లోహ అలోహధాతు ఖనిజ నిక్షేపాలు దొరుకుతాయి. కాపర్, రెడ్, జింక్, గోల్డ్, సిల్వర్, టంగ్ స్టన్, మోలీబ్డెనమ్, టిన్ ఆంటిమోని మొదలైన లోహాలు రేడియో దార్మిక ధాతువులు బెర్రెటిస్ ఆస్ట్రెస్టాస్ స్థియరైట్ టార్క్ మొదలైన అలోహ ఖనిజధాతువులు దొరుకుతాయి. ఈ సున్నపురాయి అంతర్గమన అగ్నిశిల పరిసరంలో ఉన్నప్పుడు ధాతు ఖనిజాలు ఇందులో కేంద్రీకృతం కావడానికి అవకాశమెక్కువగా ఉంటుంది. ఇదిగాక సున్నపురాయే ఒక పారిశ్రామిక ముడిపదార్థము.

పైనచెప్పినవి కాక జిప్సమ్ శిలాలవణముకూడా ఆవశ్యేవశిలల మూదిరి ఏర్పడే అలోహ ఖనిజాలు. రాజస్థాన్ లోని జిప్సమ్ నిక్షేపాలు, తమిళనాడు రాష్ట్రం పుచ్చిరాపల్లి జిల్లాలో లభ్యమయ్యే జిప్సమ్ జమ్ము, కాశ్మీర్ రాష్ట్రాలలో ఉధం పూరు, దోడా, బారాముల్లా జిల్లాలలోని జిప్సమ్ నిక్షేపాలు, సౌరాష్ట్ర, కచ్ (గుజరాతు) లలో లభ్యమయ్యే జిప్సమ్ ఇతరచోట్ల నిక్షేపాలు ఈవిధంగా ఏర్పడినవే. హిమాలయ్ ప్రదేశ్ లోని చుండిజిల్లాలో దొరికే శిలాలవణము ఈవిధంగా యేర్పడిన నిక్షేపము.

రూపాంతర ప్రాప్తశీలలు

రూపాంతర ప్రాప్తశీలలలో ఎన్నో రకాలున్నప్పటికీ ధాతు ఋణిజాన్వేషకుడు తెలుసుకోవలసినవి నైస్, వీప్స్ క్వార్టజైట్, స్లేట్, పాలరాయి, సర్పెంటిన్ శీలలు. నైస్, వీప్స్ లలో వివిధరకాలైన లోహ, అలోహ ధాతు ఋణిజాలు దొరుకుతాయి. ముఖ్యంగా పేర్కొనవగినవి. కావర్, గోల్డ్, నిల్వర్ మొదలైన లోహాలు. మైకా గ్రానైట్, కోలంబమ్, టాల్క్, కయనైట్, గార్నెట్ మొదలైన అలోహధాతు ఋణిజాలు. ఎక్కువభాగం లోహధాతు ఋణిజ నిక్షేపాలు ఆగ్నిశీలల అంతర్గమన ప్రక్రియ మూలంగా ఉష్ణ జలీయ నిర్గమల మూలంగా ఏర్పడతాయి. అలోహ ఋణిజాలు రూపాంతర ప్రాప్తి ప్రక్రియలోనే శీలతో ఏక కాలంలో వుడతాయి. క్వార్ట్జైట్ లోను, స్లేట్ లోను కూడా ఉత్తర జనిత (epigenetic) ఋణిజీ కృత ప్రక్రియ ద్వారా ఏర్పడిన గోల్డ్, కావర్, లెడ్, జింక్, ఆంటిమోని, వైరైట్, ఏక కాల జనిత ఋణిజీ కృత ప్రక్రియ ద్వారా ఏర్పడిన ఐరన్, మాంగనీస్ దొరుకుతాయి. పాలరాయి గొప్ప విలువైన అలంకార పారిశ్రామిక ముడిపదార్థము. సర్పెంటిన్ శీలలో నికెల్, క్రోమియమ్, ప్లాటినమ్ లభ్యమవుతాయి. ఈ శీలలో ఈ ధాతు వులు రూపాంతర ప్రాప్తి చెందక ముందున్న అతి మౌలిక అగ్ని శీలలో ఏక కాలంలో ఏర్పడిన ధాతు లోహాలుగా మనము గ్రహించ వలె. భారత దేశంలో దొరికే ఐరన్, మాంగనీస్ లలో చాలా ఎక్కువ శాతం రూపాంతర ప్రాప్తి శీలలో ఏక కాల జనిత ఋణిజీ కృత ప్రక్రియ ద్వారా ఏర్పడినవి. అందమైన కట్టడాలకు ఉపయోగించే స్పటికీ కృత (crystalline) సున్నపురాయి మన దేశంలో చాలా చోట్ల దొరుకుతుంది. పేరెన్నిక గన్న మక్రానా పాల రాయి రాజస్థాన్ లో దొరుకుతుంది.

పైన పేర్కొన్న వివిధ రకాల శీలలలోనూ ప్రత్యేక రకమైన ధాతు ఋణిజ నిక్షేపాలు దొరుకుతాయి. ఋణిజాన్వేషకుడు వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ధాతు ఋణిజ నిక్షేపాలు వెదక వలె. ఏవీ శీలలలో ఏవీ ధాతు నిక్షేపాలుంటాయో తెలుసుకో వలె. అప్పుడు ఆయా శీలలలో ఆయా ధాతువుల కోసమే వెదకవలె. సున్నపు రాతిలో రత్నాల కోసం రూపాంతర ప్రాప్త శీలలలో బొగ్గు కోసం పెగ్మటైట్ లలో మాంగనీస్, (క్రోమియమ్ ల కోసం వెదకడం అనవసరపు శ్రమ, ధనవ్యయము మాత్రమే.

భూవిజ్ఞాన శాస్త్ర విధానము

కిందటి అధ్యాయంలో ఖనిజాన్వేషకుడు తెలుసుకోవలసిన విషయాలను గురించి, శిలలు వాటితో బాటు ఉన్న ధాతు ఖనిజ నిక్షేపాలను గురించి, చెప్పడం జరిగింది. భూవిజ్ఞాన శాస్త్ర వర్గంతో ఖనిజాన్వేషణ జరిపేటప్పుడు తెలుసుకోవలసిన మరొక విషయమేమంటే : శిలలలో ఎటువంటి ప్రదేశాలు ఈ ధాతు ఖనిజ నిక్షేపాలు కేంద్రీకరింపబడి ఉండటానికి అనువుగా ఉన్నవనేది.

ప్రాథమిక ప్రక్రియలు :-

ప్రాథమిక ప్రక్రియల వల్ల ఏర్పడే ఖనిజ నిక్షేపాల ఉనికిని కనుక్కోనేటప్పుడు నిక్షేపాన్వేషకుడు తాను అన్వేషించబోయే ఖనిజ నిక్షేపము ఏ శిలలున్న ప్రాంతాలలో కేంద్రీకృతమై ఉంటుందో ఆ ప్రాంతాలలోనే తన ఆన్వేషణను ప్రారంభించ వలె. అవక్షేప శిలలలో ఏక కాల జనితమైన ఐరన్, మాంగనీస్, జిప్సమ్ మొదలైన ఖనిజ నిక్షేపాలను గురించి వెదకడానికి ముందుగా అవక్షేప హరివాణాలను గుర్తించవలె. ఇటువంటి హరి వాణాలకు అంచులు ఉంటాయి. కనక వీటిని గుర్తించి మాన చిత్రం చేయడం చాలా సులభము. మాన చిత్రణ జరిగిన తరువాత ఆ అవక్షేప శిలలలో ఏవి ఖనిజ సంవత్తి ఉండటానికి అవకాశముందో ఆయా ఖనిజాలను గురించి అన్వేషణ జరిపించ వలె. ఈ అవక్షేప శిలల పొరల మందము, సచ్చిద్రత (porosity) ప్రవేశయోగ్యత (permeability) లను గుర్తించ వలె. ఇవి కాక అవక్షేప శిలలలోని ఖనిజ సంఘటనలోని మార్పులను గుర్తిస్తూ ఆయా మార్పులు ఏ కారణాల వల్ల కలుగుతున్నాయో గ్రహించ వలె. అప్రవేశయోగ్యమైన షేల్ వంటి శిలలను గుర్తించినప్పుడు ఆ శిలలు ఉపరితల దిశలో ప్రయాణించే ధాతు ద్రావణాలను ఉపరితలాన్ని చేరుకోకుండా ఆవి ఉంటాయని గ్రహించి అటువంటి శిలల అంచులలో ప్రాథమిక ప్రక్రియల ద్వారా ఏర్పడే ధాతు ఖనిజాలను గురించి అది శ్రద్ధగా వెదక వలె. శిలల రసాయన సంఘటన ఖనిజ కేంద్రీకరణ మీద ఎక్కువ ప్రభా

వాన్ని కలిగి ఉంటాయని ఇంతకు ముందు చెప్పడం జరిగింది. అందువల్ల కేంద్రీ కరణకు అనువైన సున్నపు రాయి, టోలమైడ్, కంగ్రామరేట్ మొదలైన శిలల పొరలలో వ్యిగుణీ కృత ఉత్సాహంతో అన్వేషకుడు పని చేయవలె.

అనంతర ప్రక్రియలు :-

అద్రావణ ఖనిజాలు :- నిక్షేపాలు అనేక విధాలుగా ఏర్పడతాయి. బాతావరణ శైథిల్య క్రియ, అంతర్జల రసాయనిక క్రియలు కలిసి శిలలలోని ఖనిజాలను ఆక్సికరణం చేసి కొన్ని ద్రావణాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఈ ద్రావణాలు మిగిలిన ఖనిజాలను కరిగించుకొన్న తరువాత ఈ శిలా రంధ్రాలగుండా కిందికి పోతూ మధ్య మార్గంలోని ఖనిజాలను కూడా కరిగించు కొంటాయి. ఈ విధమయిన ప్రక్రియ వునరావృత్త మవుతూ కొంత కాలానికి శిలలలో అద్రావణీయమైన పదార్థాలు మిగిలిపోతాయి. శిలలు శైథిల్యం చెందేటప్పుడు ఏర్పడే అద్రావణీయ ఖనిజాలు ముఖ్యంగా మూడు. అవి గోడైట్, బాక్సైట్, కెయ్లీన్, ఇంచుమించు అన్ని రకాలైన శిలల నుండి ఈ ఖనిజాలు ఏర్పడతాయి. ఐరన్, అల్యూమినియమ్లతో సంయోగం చెందిన ఖనిజాలున్న శిలల నుంచి ఇవి తప్పక ఏర్పడతాయి. వీటిలో బాక్సైట్ ఎక్కువ శాతంలో ఏర్పడితే అవి బాక్సైట్ నిక్షేపాలుగా గ్రహించడం జరుగుతుంది. ఐరన్ ఖనిజాలు (గోడైట్, కొన్ని చోట్ల హెమటైట్) ఎక్కువ శాతంలో ఏర్పడినప్పుడు అవి "లేటరైట్" లుగా గ్రహించడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా లేటరైట్, బాక్సైట్ ఏర్పడటానికి ముఖ్యంగా కావలసినవి శైథిల్య క్రియకు అనుకూలమయ్యే బాతావరణము, ఆక్సికరణచెంది ద్రావణీయమైన ఖనిజపదార్థాలను అతివేగంగా మరొక చోటికి తీసుకుని పోవడానికి పీల్చిన వర్షపాతము బాక్సైట్ అనే గిబ్సైట్, బొహిషైట్ మొదలయిన అల్యూమినియ హైడ్రాక్సైడ్ల నమ్మేళనము. వీటితోబాటు గోడైట్ కూడా ఉంటుంది. ఈ బాక్సైట్ స్వచ్ఛమైనరూపంలో తెల్లగాఉంటుంది. గోడైట్తో సమ్మిశ్రితమైనప్పుడు ముదురు ఎరుపు వర్ణపు గోడైట్లో అక్కడక్కడ స్వచ్ఛమైన తెల్లటి మచ్చలుగా కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా బాక్సైట్ ఊలైట్ నిర్మితితో ఉంటుంది. ఇది గాక ముద్ద రూపంలో కూడా ఉంటుంది. బాక్సైట్ ఎక్కువగా ఎత్తైన పర్వత శిఖరాల మీద ఏర్పడుతుంది. ఉపరితల భాగం గోడైట్తో కప్పబడి ఉండి కింది భాగంలో బాక్సైట్ కేంద్రీ కృతమై ఉంటుంది. అందువల్ల బాక్సైట్ గురించి వర్షపాతము ఎక్కువగా ఉన్న పర్వత శ్రేణులలో వెదకవలె. లేటరైట్తో

కప్పబడి ఉన్న పర్వత శిఖరాలమీద ఆ లేటరైట్ కింది పొలంలో నున్న ముద్ద రూప వదార్థాన్ని పరీక్షించవలె. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా లేటరైట్ కొండలుగా భావించబడిన విశాఖ జిల్లాలోని అనంత గిరి శిఖరాలలో బాక్సైట్ను ఈ విధంగా కనుక్కొన్న మనత భారత భూవిజ్ఞాన సర్వేక్షణ శాఖకు చెందుతుంది. ఈ విధంగా ఏర్పడిన బాక్సైట్ నిక్షేపాలను మన ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఎత్తైన పర్వత శ్రేణులలో చాలా చోట్ల కనుక్కోవచ్చు. ఈ మధ్యనే (1978 వ సంవత్సరంలో) విశాఖ జిల్లాలోని చింతవల్లి కొండలలో కూడా బాక్సైట్ నిక్షేపాలను కనుక్కొన్నారు. తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని యార్కాడ్ కొండలపైన, మధ్య ప్రదేశ్‌లోని అమర్ కంటక్ పర్వత ఉన్న బాక్సైట్ నిక్షేపాలు ఈ విధంగా ఏర్పడినవే. ఇవి కాక మన దేశంలో ఇటువంటి బాక్సైట్ నిక్షేపాలు ఎన్నో ఉన్నాయి.

ఆక్సీకరణ క్రియ :-


శైథిల్య క్రియ శిలాంతర్భాగాలలో ఉన్న ఖనిజ నిక్షేపాలను గుర్తింప జేస్తుంది. లోహ సల్ఫైడ్ ఖనిజ నిక్షేపాలున్న శిలలు బహిర్గత మయనప్పడు అవి శైథిల్యం చెంది అందులో ఉన్న వైరైట్ ఆక్సీకరణం చెంది బహిర్గతాలకు గోడైట్ పూత నిస్తుంది. ఈ బహిర్గతాలలో చాల్కోవైరైట్ ఉంటే దాని నుంచి మాలఖైట్, అజురైట్‌లు ఏర్పడి గోడైట్ తో మిశ్రమయి ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, నీలం వర్ణం గల వై పూతను ఈ బహిర్గతాలకు ఇస్తాయి. ఇటువంటి వై పూతలు గల శిలా బహిర్గతాలు ఖనిజీ కరణ చెందిన శిలా బహిర్గతాలుగా గుర్తించి అటువంటి చోట్ల నిక్షేపాన్వేషణ ప్రారంభించ వలె. ఈ విధమైన వై పూతను “గోసాన్” అంటారు. ఈ “గోసాన్” కింది భాగంలో ఉన్న ఖనిజ నిక్షేప మంతా కూడా ఆక్సీకరణ చెంది ద్రావణ స్థితిలో కిందికి రవాణా అయి భూజల తలానికి కింది భాగాన ఉన్న ప్రాథమిక ధాతు ఖనిజాలతో తిరిగి చర్య పొంది క్షయకరణ మవుతాయి. ఈ విధమైన క్షయకరణ వల్ల తిరిగి లోహసల్ఫైడ్‌లు ఏర్పడతాయి. ఈ కారణంగా భూజల తలానికి దిగువ భాగంలో ఉన్న ప్రాథమిక సల్ఫైడ్ ఖనిజాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. అందువల్ల శిలా బహిర్గతాల మీద గోడైట్, మేలఖైట్, అజురైట్ పూతలుంటే అటువంటి ప్రదేశాలలోని కింది భాగాలలో అనంతర ప్రక్రియల వల్ల అభివృద్ధి చెందిన లోహ సల్ఫైడ్‌ల (లెడ్, కాపర్, జింక్) చుండలమున్నదని గ్రహించవలె. ఇటువంటి “గోసాన్” లను అధారంగా చేసుకొనే తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని మామండూరు గ్రామం వద్ద ఉన్న కాపర్

నిక్షేపాలను కనుక్కొన్నారు. ఇదే విధంగా మైసూరు లోని చిత్రదుర్గా జిల్లా, ఇంగ్లీషాల్ గ్రామం వద్ద ఉన్న కావర్ నిక్షేపాలను కనుక్కొని తవ్వి తీస్తున్నారు. “గోసాన్” లున్న ప్రతిచోటా కిందిభాగంలో ఉన్న ప్రాథమిక సల్ఫైడ్ ఖనిజ నిక్షేపాలు అభివృద్ధి చెంది ఉండకపోవచ్చు. సల్ఫైడ్ ఖనిజాలలో వైరెడ్ కూడా కలిసి ఉన్నప్పుడే ప్రాథమిక ఖనిజ నిక్షేపాలు అభివృద్ధి చెంది వివిగుణీకృత మవుతాయి.

ప్లేసర్లు :-

అనంతర ప్రక్రియలవల్ల ఏర్పడే ఖనిజ నిక్షేపాలలో అవక్షేపాలతో ఏర్పడే ప్లేసర్ నిక్షేపాలు ముఖ్యమైనవి. ఇవి వివిధ భౌమ కారణాలవల్ల ఏర్పడతాయి. శైథిల్య క్రియకు లొంగకుండా ఉన్న నిరోధక ఖనిజాలే ప్లేసర్ నిక్షేపాలుగా ఏర్పడతాయి. ఈ విధంగా గార్నెట్, మోనజైట్, ఇల్మినైట్, సిల్లిమనైట్, రూటైల్, కాసిటరైట్, పజ్జాలు, జిర్కాన్, గోల్డ్ మొదలైనవి ప్లేసర్లుగా కేంద్రీకృత మవుతాయి. భౌమిక క్రియను బట్టి ఈ ప్లేసర్లను అవశిష్ట ప్లేసర్లని ఎల్లూవియల్ ప్లేసర్లని రురీఫ్లెసర్ లని (Stream Placers) తీరప్లేసర్ లని, వాయుకృత ప్లేసర్లని అంటారు. కొండ చరియలలో బహిర్గతమై ఉన్న ఖనిజ సహిత శిల శిథిలమైనప్పుడు అందులోని నిరోధక ఖనిజాలు కొండచాలున కొంతమేర మృత్తికతో కలిసి ఉంటాయి. వీటిని వెంటనే గుర్తించి వాటి జన్మ స్థానమయిన ప్రాథమిక ఖనిజ సిర యొక్క ఉనికిని తెలుసుకోవడమే అన్వేషకుని లక్ష్యము. నదీ ప్రవాహాలలోను, నముద్ర తీరాలలోను రూపొందిన ప్లేసర్ నిక్షేపాలను కనుక్కోవడం సులభము. నదీ చరమ దశలో ఉన్నప్పుడు ఈ ప్లేసర్ ఖనిజాలు నదీ వక్రాలలోవలి భాగములో కేంద్రీకృత మవుతాయి. తీరప్రాంతాలలో నముద్ర కెరట వేగము ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ నదీ ప్రవాహాలు నముద్రంలో కలిసి చోట నదికి ఇరువైపులా గాని, ఏదో ఒక వైపున గాని నముద్ర తీరానా ఈ ప్లేసర్ ఖనిజాలు కేంద్రీకృత మవుతాయి. ఈ విధంగా గోతమీ, గోదావరి, వశిష్ట గోదావరి, నాగావళి, వంశధార నదుల సాగునంగమం వద్ద తీరాన కేంద్రీకృతమై ఉన్న మోనజైట్, మాగ్నెటైట్ నిక్షేపాలు, కేరళ తీరంలో కేంద్రీకృతమై ఉన్న మోనజైట్, ఇల్మినైట్ నిక్షేపాలు ఉదాహరణలుగా చెప్పవచ్చు. నదులలో ప్లేసర్ ఖనిజాలు లాభసాటిగా వెలికి దీసేటంత సాంప్రదించు కరణంతో లేకపోయినప్పటికీ ఈ ప్లేసర్ ఖనిజాల జాడను తెలుసుకొని ఆజాడ వెంబడిపోయి, ప్రాథమిక ఖనిజనిక్షేపాలున్న ప్రదేశాలను కనుక్కోవచ్చు.

ఈ విధంగా వజ్రాలనిశ్చేపాలను, గోల్డ్ నిశ్చేపాల ఉనికిని తెలుసుకోవచ్చు. నదీ ప్లేనర్ ఖనిజాల ఉనికిని తెలుసుకోవడానికి ఈ కింది విషయాలను జాగా గుర్తుంచుకోవలె.



చటము-1 ప్లేనర్ నిక్షేపము

→ జల ప్రవాహము 1. ఖనిజ నిక్షేపము 2. ప్లేనర్ నిక్షేపము


(1) నదీప్రవాహపు రవాణాశక్తి తగ్గినంతచోటా ఈ ప్లేనర్ ఖనిజాలు నిక్షేపితమవుతాయి. నదివెడల్పుయినచో నదీవక్రాలలోపలిభాగంలో, నదిలోయ భూతలప్రక్షేపాలకు చూరం వైపున ఈ ప్లేనర్ ఖనిజాలు కేంద్రీకృతమవుతాయి.

(2) నదీవక్రాలు ముందుకు జరుగుతూ ఉంటాయి. పాతనదీ వక్రాలకు గురించినట్లయితే అక్కడ కేంద్రీకృతమైఉన్న ప్లేనర్ ఖనిజాలను కనుక్కోవచ్చు.

(3) ప్రాథమిక ధాతుఖనిజాలుఉన్న శింలు నదీభూతలంలో బహిర్గతమయితే నీటినుంచి వెలువడిన విలువైన ప్లేనర్ ఖనిజాలు బహిర్గతాలనుంచి ప్రవాహపు దిశకు కొనలుదేరి ఉంటాయి. వీటినిబట్టి ప్రాథమిక ధాతునిశ్చేపాలను కనుక్కోవచ్చు.

(4) ఉపనది ముఖ్యనదితో కలిసేచోట ఈ రెండింటికలయినది దిగువ భాగంలో ముఖ్యనదిలో ఉపనది కలిసే పక్కభాగంలో ప్లేనర్ ఖనిజాలు కేంద్రీకృతమవుతాయి.

నదీప్లేనర్ నిశ్చేపంగా గోల్డ్ మనదేశంలో చాలా నదులలో దొరుకుతుంది. సింగ్ భమ్ జిల్లా (బీహారు)లోని సువర్ణరేఖ, కాశ్మీర్ లోని సింధు, దానిఉపనదులు మధ్యప్రదేశ్ లోని సాన్, ఈబ్, డియోనదులు, కోరాపుట్, నంబాల్ పూర్



పటము 2-నదీజలప్రవాహము-ప్లేనర్ కేంద్రీకరణ
→ ప్రవాహపుదిశ చుక్కలు ప్లేనర్ కేంద్రీకరణను సూచిస్తాయి

జిల్లాలలోని (ఒరిస్సా) చిన్ననదీపాయలు, ఏమోగాజిల్లా (కర్ణాటక)లోని చిన్న నదులు వీటిలో గోల్డ్ ప్లేనర్ లు దొరకవచ్చు. మహానదీఅల్లావియమ్ లోను, ఒరిస్సా రాష్ట్రంలోని సంబాల్ పూర్ వద్ద హిరాకుడ్ (ప్రాంతం)పాలమాజిల్లా (బీహారు)లో సాన్ నది ఉపనది అయిన కోయల్ నది ఇసుకలోను కొంతవరకు ప్లేనర్ ప్రజాలు దొరుకుతాయి.

ఖనిజాన్వేషణకు మార్గదర్శకాలు:—

భూవిజ్ఞానశాస్త్ర పద్ధతిద్వారా ధాతునిశ్చేపాన్వేషణ జరిపేటప్పుడు ధాతు నిశ్చేపాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో మనకు సూచించే కొన్ని మార్గదర్శకాలు ఉన్నాయి.

(guides) వీటిని (అ) నై సర్గిక స్వరూప మార్గదర్శకాలు, (ఆ) ఖనిజ సంబంధ మార్గదర్శకాలు (Mineralogical guides) (ఇ) స్తరాత్మక అశ్మనసంబంధ మార్గదర్శకాలు (Stratigraphical and lithological guides) (ఈ) నిర్మితీయ మార్గదర్శకాలు (Structural guides) అని నాలుగు విధాలుగా చెప్పవచ్చు.

నై సర్గిక స్వరూప మార్గదర్శకాలు : నై సర్గిక స్వరూపపురూపు రేఖలు ధాతునిక్షేపాల ఉనికి ప్రత్యక్ష పరోక్షసాక్ష్యాలుగా పనిచేస్తాయి. భూతలం మీద ధాతుస్వరూపం బహిష్కరణం కావడం ప్రత్యక్షనిదర్శనము. ఒక ప్రదేశం యొక్క నై సర్గిక చరిత్ర సేకరించినట్లయితే అక్కడ ఏవైనై సర్గిక ప్రక్రియలవల్ల ధాతువులు కేంద్రీకృత మయినాయో తెలుసుకోవడానికి వీలుపడుతుంది. అప్పుడు ఆ ప్రదేశంలో ఏవోవోట్ల ధాతు నిక్షేపాన్వేషణ జరిపించవలెనో సులువుగా గ్రహించవచ్చు. నై సర్గిక స్వరూప రూపురేఖలతో స్థలాభృతి ముఖ్యంగా ఐరన్ ధాతునిక్షేపాలకే ఉనికిని తెలుసుకోవడానికి, బాగా పనికి పస్తుంది. ఐరన్ ధాతునిక్షేపాలు లాభసాటి నిక్షేపాలుగా ఉండవలెనంటే అవి పెద్ద పెద్దవిగా ఉండవలె. ఇవి పర్యత శ్రేణులలో ఉన్నప్పుడే ఇది వీలవుతుంది. మనదేశంలోని మేలురకపు ఐరన్ ధాతునిక్షేపాలు పర్యత శ్రేణులతో కలిసి ఉన్నాయి. బీహారు, రాష్ట్రపు సింగ్ భమ్ జిల్లాలోను, ఒరిస్సారాష్ట్రపు కియోరూర్, బొనార్స్ మయూర్ భంజ్ జిల్లాలోను, మధ్య ప్రదేశ్ బైలానిల్లా పర్యత శ్రేణులతోను, కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని బాబాబుడన్ కొండలలోను ఐరన్ ధాతునిక్షేపాలు పర్యత శ్రేణులతో కలిసి ఉన్నాయి. ఇదే విధంగా మాగ్నెటైట్ ధాతునిక్షేపాలు శైలిక్రియకు నిరోధకాలయినందువల్ల ఇవి గుట్టలుగాను, చిన్న చిన్న పర్యత శ్రేణులుగాను నిలిచిపోతాయి. సేలంవద్ద ఉన్న మాగ్నెటైట్ ధాతునిక్షేపాలతో ఉన్న కొండలు ఈ రకానికి చెందినవే. శైలిక్రియను నిరోధించే క్రోమైట్ మొదలైన ధాతు ఖనిజాలున్న శిలలు బహిష్కరణమయినప్పుడు ఆయా ధాతు ఖనిజాలున్న శిలాభాగాలు విడిగా పైకి కనబడతాయి. వీటిని గుర్తించి ఆ ప్రదేశాలలో ఖనిజాన్వేషణ ప్రారంభించవచ్చు.

కొన్ని కొన్ని పరిస్థితులలో నదీప్రవాహ వీధితరవాత ఏర్పడిన తరుణ నిక్షేపాలతో కప్పబడి ఉన్నప్పుడు, ప్రాంత నదీతీరాలను అవరించి ఉన్నప్పుడు భూమివిజ్ఞాన శాస్త్రము, భూనై సర్గిక శాస్త్రము కూడా సహాయకారులుగా ఉంటాయి. ప్రాంత నదీలోయ ఉనికిని ఈ విధంగా గుర్తించిన తరవాత భూభౌతిక శాస్త్రవద్దతుల ద్వారా నిక్షేపాన్వేషణ జరవ వచ్చు.

అవశిష్టనిశ్చేపాలు ఏర్పడటానికి నై సర్గికస్వరూప రూపురేఖలకు చాలా నన్నిహిత సంబంధముంది, జాక్సైడ్ నిశ్చేపాలున్న పరిష్కృత శిఖరాగ్రాలు బల్ల పరువుగా ఉండి ఎంతోదూరం నుంచి కూడా గుర్తుపట్టగలిగేట్లుంటాయి. తమిళ నాడు రాష్ట్రంలోని యార్కాడ్ వద్దను, విశాఖజిల్లా (ఆంధ్రప్రదేశ్)లోని ఆనంత గిరి కొండలలోను, కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని భట్కల్. బైందూర్ల వద్దనుజాక్సైడ్ గా మారిన కొండలు బల్లపరువుగా ఉండటం గమనించదగినది.

అనుకూల నై సర్గికపరిస్థితులు ఉపరిజన్య కావర్నలైట్ నిశ్చేపాలఆధిపత్యం కూడా దోహదంచేస్తాయి.

ఖనిజసంబంధ మార్గదర్శకాలు

ఖనిజాలు, శిలలలో వాటి సాపేక్ష కేంద్రీకరణలు ధాతునిశ్చేపాల ఉనికికి చక్కటి మార్గదర్శకాలుగా పనిచేస్తాయి. శిలలలోను, సిరలలోను, కుద్యశిలలలోను ఖనిజాల అనుపాతాలలోని మార్పులు ధాతునిశ్చేపాన్వేషణకు ఎంతో ఉపయోగ పడతాయి. అదేవిధంగా భూతలంపైఉన్న ఆక్సీకరణ చెందిన ఖనిజాలు కూడా అంతర్భాగంలో ఉన్న ధాతునిశ్చేపాల ఉనికిని సూచిస్తాయి. ఆక్సీకరణను నిరోధించలేని లోహమూల పదార్థాలు మాత్రమే ఉపరితలపు బహిర్గతాలలో ఆక్సీకరణంచెంది, ఆక్సైడ్లు గాను. కార్బోనేట్లుగాను, సిలికేట్లుగాను. బహిర్గతాలలో స్థిరపడి లోతులలోఉన్న ధాతునిశ్చేపాలను సూచింపగలుగుతాయి. ఈ విధంగా గోల్డ్ సిల్వర్. ఆక్సీకరణ చెందవు. ఆక్సీకరణంచెంది సూచికలుగా పనిచేసే ఖనిజాలు కావర్, జింక్., ఐరన్, లెడ్ ఖనిజాలు. పీటిలో కావర్ ముడిలో హంగాను సిలికేట్ బేసిక్ కార్బోనేట్ ఆక్సైడ్లుగాను జింక్ ఖనిజాలు సిలికేట్, కార్బోనేట్లుగాను ఐరన్, సిలికేట్, కార్బోనేట్ ఆక్సైడ్లుగాను లెడ్ కార్బోనేట్ ఆక్సైడ్లుగాను స్థిరపడి సూచికలుగా పనిచేస్తాయి. ఈ విధమైన ఆక్సీకరణం చెందిన ఖనిజాలున్న బహిర్గతాలు “గోసాన్”లతో కప్పబడినవని చెప్పుకొంటాము. యురేనియమ్ ఖనిజాలున్న శిలలు బహిర్గతమైనప్పుడు అవి వసువుపచ్చ నారింజ ఆకుపచ్చరంగులతో ఉన్న రేడియో ధార్మిక ఖనిజాలతో కప్పబడి ఉంటాయి. లెడ్ ఖనిజమైన గెలీనా మిగిలినవాటికన్న తక్కువగా ఆక్సీకరణచెందుతుంది. కనక ఎంతో శక్తిమంతమైన ఆక్సీకరణ క్రియ అయితేనే తప్ప గెలీనావూర్తిగా బహిర్గతాలనుంచి వెడలిపోదు. అందువల్ల అటువంటి ప్రదేశాలలో బహిర్గతాల కింది భాగాలలో ఎక్కువగెలీనా ఉండటానికి అవకాశముంది. ఈ బహిర్గతాలున్న

ప్రదేశాలలో గాడులు తవ్విన తరవాత బహిర్గతశిల లోతుభాగాలలో గెలినా తదితర లెడ్ ఖనిజాలపాళ్లు ఎక్కువగా ఉండకపోతే అటువంటి ప్రదేశాలలో పాథమిక ధాతువులో ఎక్కువగా లెడ్ లేదని యజువు చెనుకోవచ్చు.

జిండు వలెనే కావర్ కూడా ఆక్సీకరణ చెందినప్పుడు అతి త్వరితగతినీ ద్రావణీయమై స్థలాభావం చెందుతుంది. ధాతు ఖనిజాలలో వైరెట్ ఉన్నట్లయితే దానినుంచి ఏర్పడిన నల్ఫ్యూరికామ్లము సహాయంతో కావర్లో చాలా భాగము బహిర్గతాల నుంచి రవాణా అవుతుంది. నల్ఫ్యూరికామ్లాన్ని తటస్థీ కరణం చేసే కార్బోనేట్ ప్రదేశ శిలగా ఉన్నట్లయితే ఈ కావర్లో చాలా భాగము ఉపరితల సమీపాన్నే ఉండిపోతుంది. ఈ కారణంగా సున్నపు రాయి ప్రవేశ శిలగా గాని లేదా కుడ్య శిలగా గాని ఉన్న ప్రదేశాలలో అనంతర సల్ఫైడ్ వృద్ధి జరగదు.

నికెల్ సల్ఫైడ్ ధాతువులున్నప్పుడు వాటి ఆక్సీకరణ వల్ల ద్రావణీయమైన సల్ఫేట్ ఏర్పడుతుంది. అయినప్పటికీ ఒక్కొక్కప్పుడు లేత ఆకువచ్చని రంగు గల మచ్చను శిలమీద ఏర్పరుస్తుంది. ఇటువంటి మచ్చ నికెల్ సిలికేట్ అయిన గార్నియరైట్ వల్ల ఏర్పడినది. అనంతర సల్ఫైడ్ వృద్ధి జరిగినప్పటికీ నికెల్ సల్ఫైడ్లున్న చోట్ల లాభసాటి అయ్యే నిక్షిప్త కేంద్రీకరణ జరగదు. పెరిటాటైట్, సర్పెంటైన్, శిలలతో ఏక కాలంలో ఏర్పడిన నికెల్ ఖనిజాలు ఆ శిలలు ఆక్సీకరణ చెందినప్పుడు ఆ శిలల వై భాగంలో నికెల్ ఖనిజాలు అవశిష్ట నిక్షేపాలుగా నిలిచిపోతాయి.

ప్రాథమిక కోబాల్ట్ ఖనిజాలైన అర్పినై డ్లు, నల్ఫ్యూరినై డ్లు, సల్ఫైడ్లు ఆక్సీకరణం చెందినప్పుడు ఏర్పడిన సల్ఫేట్ నీటిలో కరిగి మరొక చోటికి తీసుకొని పోబడుతుంది. అర్పినేట్ మాత్రం స్థిరంగా ఉండి “కోబాల్ట్ బ్లూమ్” గా మారి కోబాల్ట్ ధాతు నిక్షేపాలకు చాలా అనువైన సూచికగా ఉంటుంది.

మోలిబ్డెనైట్కు, నిరోధక శక్తి హెచ్చయినందునల్ల లెడ్, జింక్, కావర్ సల్ఫైడ్ల వలె ఆక్సీకరణ చెందదు. అందువల్ల బహిర్గతాలలో ఉన్న మోలిబ్డెనైట్ ఆక్సీకరణ మండలంలో చాలా తక్కువగా రవాణా చెంది ఎక్కువ భాగం అవశిష్టంగానే ఉండిపోతుంది. క్రోమియమ్ ధాతు ఖనిజమైన క్రోమైట్ ఆక్సీకరణ పరిస్థితులలో ఏ విధమైన మార్పు చెందక స్థిరంగా ఉండి బహిర్గతాల లోను, ప్లేనర్లలోను కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది. అత్యధికమైన ఆక్సీకరణ పరి


స్థితులలో మూత్రం ద్రావణీయ పదార్థాలుగా మారి ద్రావణాలుగా మరొక చోటికి రవాణా అయి "లిమొనైట్" బాక్స్‌వర్క్ (Box work) ను రూపొందిస్తుంది.

ధాతు నిక్షేపాలకు మార్గ దర్శకాలుగా ధాతు ఖనిజాలు మూత్రమే కాక ఆసార ఖనిజాలు (Gangue) కూడా మార్గ దర్శకాలుగా పనికి వస్తాయి. నల్లైడ్ ధాతు నిక్షేపాలతో బాటు క్వార్ట్జ్, కాలైస్ టెస్ మొదలైన ఆలోహ ఖనిజాలు కూడా ఉంటాయి. వీటి నీరలు బహిష్కృతమైనప్పుడు వాటిలో నల్లైడ్, నల్లైడ్ ధాతు ఖనిజాల కోసం వెదకవలె. ఫ్లోరైట్ సాధారణంగా జింక్ రెడ్ ధాతు ఖనిజాలతో కలిసి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఖనిజపు నీరలున్నచోట జింక్ రెడ్ ధాతు నిక్షేపాల కోసం అన్వేషణ జరిపించవచ్చు.

కుడ్య శిలలలోని ఖనిజ మార్పులు కూడా చాలా చోట్ల మార్గ దర్శకాలుగా పని చేస్తాయి. ఈ ఖనిజ మార్పులు ప్రాథమిక చర్యల వల్ల నయినా ఏర్పడవచ్చు ; లేదా ఉష్ణ జలీయ ద్రావణాల ప్రభావం వల్ల కలిగిన శైథిల్య క్రియవల్ల అనంతర మార్పులుగా ఏర్పడవచ్చు. ఈ విధంగా ఉష్ణజలీయ ద్రావణాల ప్రభావం వల్ల జరిగే శైథిల్య క్రియలో కొత్త ఖనిజ సంఘటన ఏర్పడతాయి. కొన్ని కొత్త ఖనిజాలు కూడా ప్రవేశ పెట్టబడతాయి. ఈ విధంగా ఏర్పడిన శైథిల్య మండలంలో ఉష్ణ జలీయ ద్రావణాల ఉష్ణోగ్రతను బట్టి కొత్త ఖనిజాలు ప్రవేశించడం జరుగుతుంది. చాలా చోట్ల ఫైరైట్ సాధారణమైన ఖనిజము. హైపోథెర్మల్ ఖనిజ కరణ చర్యలో గార్నెట్, టూర్మలైన్, బయోటైట్ మాధ్యమిక ఉష్ణ ఖనిజ కరణ చర్య క్లోరైట్, సెరిసైట్, కార్బోనేట్‌లు సీలికా, ఎపిథైర్మల్ ఖనిజ కరణ చర్యలో కొంత సెరిసైట్, ఎక్కువగా క్లోరైట్, కార్బోనేట్‌లు ఏర్పడతాయి. ఈ విధంగా ఏర్పడిన నూతన ఖనిజ సంఘటనను బట్టి ఉష్ణ జలీయ ద్రావణాలు ఏ ఉష్ణోగ్రతలో ప్రదేశపు శిలలలో ప్రవేశించినాయో గుర్తించి ఆ తరువాత ధాతు నిక్షేపాన్వేషణ జరిపించడం చాలా ఉపయోగము. పైన ఉదహరించిన ఖనిజాలన్నిటి వల్ల గాని, ఏ ఒక్కదాని వల్ల గాని ప్రవేశ శిలలలో ప్రతి స్థాపన జరిగినప్పుడు ఆ విధంగా ప్రతి స్థాపించబడిన శిలా మండలము ధాతు నిక్షేపాల ఉనికికి మార్గ దర్శకంగా ఉంటుంది. బీహారు రాష్ట్రంలోని మొనబోనీ కాపర్ నిక్షేపాలతో ప్రదేశ శిలల ఆర్గిల్లైజేషన్ (Argillisation) ద్వారా ఈ కాపర్ నిక్షేపాల ఉనికిని గ్రహించవచ్చునని డాక్టర్ కె. కామేశ్వరరావు గారి పరిశోధనలో నివరించడం జరిగింది. బహిష్కృతాలయిన "పేంవల్లె నున్నపురాయి"లో నర్మంటిన్ ఖనిజముచే అది స్టియటైట్ నిక్షేపాలకు నూతనగా తీసుకోవచ్చునని

అనంతపురంజిల్లా, ముచ్చుకోట్ల గ్రామం వద్ద ఉన్న స్ట్రీయట్లైట్ నిక్షిప్తాలలో రచయిత జరిపిన పరిశోధనలవల్ల తెలిసింది. “వేంపల్లె సున్నపురాయి మేఖల”లో అంతర్గమ అగ్నిశిల కిరువైపులా ప్రదేశశిలలు సర్పెంటీన్ గా మార్పుచెందిన తరువాత ఆ సర్పెంటీన్ లో కొన్ని చోట్ల స్ట్రీయట్లైట్. మరికొన్ని చోట్ల ఆస్బెస్టాస్ ఏర్పడినాయి. ఇక్కడ స్ట్రీయట్లైట్ గురించిగాని, ఆస్బెస్టాస్ గురించిగాని వెదికేటప్పుడు సున్నపురాతిలోని సర్పెంటీన్ మండలంలోనే వెదకవలె.

కాపర్ నిక్షేపాలలోను లోహ సల్ఫైడ్ ఖనిజనిక్షేప ప్రదేశాలలోను అన్వేషణ



వటము ౩.-శై థిల్యమండలము ఖనిజ కేంద్రీకరణ

1. అగ్నిశిల 2. శై థిల్యమండలము 3. ఖనిజాలు

జరపవలసినప్పుడు ఈ ప్రదేశశిలల శై థిల్యానికి ప్రాముఖ్యమివ్వవలె. అంతే కాకుండా ప్రదేశశిలలలోని ప్రాథమిక ఖనిజాలు ఏవో చోట్ల కేంద్రీకృత మవుతున్నాయో గుర్తించుకొని ఆయా ప్రదేశాలలో అన్వేషణను ద్వైగుణీకృతం చేయవలె.

ప్రాథమిక ఐనిజీకరణలో విలువైన ధాతుఐనిజాన్వేషణ సూచికగా ఉండవచ్చు లేదా ధాతుఐనిజాలలో సమ్మిళితమైన ఇతర ఐనిజాలు కూడా సూచికలుగా ఉపయోగపడతాయి. కావర్, లెడ్, జింక్ ధాతువులు నిశ్చేవితమైన ప్రదేశశిలలలో ఈ లోహపుఐనిజాలే సూచికలుగా ఉంటాయి. లేదా వీటితో సమ్మిళితమై ఉన్న పైరైట్ను గాని, కాలెన్సైడ్నుగాని, క్వార్ట్జ్ను గాని సూచికగా తీసుకోవచ్చు. కొన్ని కొన్ని గోల్డ్నిశ్చేపాలలో కావర్, లెడ్, జింక్ ఐనిజాలు సూచికలుగా పనికివస్తాయి. ఇదేవిధంగా మాగ్నెటైట్ నిశ్చేపాలకు గార్నెట్ సూచికగా పనికివస్తుంది.

స్తరాత్మక అశ్మవిజ్ఞానలోకమార్గదర్శకాలు

ఏదైనా ధాతునిశ్చేపము ఒకేఒక అవశేష శిలలో మాత్రమే ఉన్నట్లయితే ఆ అవశేష శిలను స్తరాత్మక మార్గదర్శకంగా గ్రహించవచ్చు. అటువంటి శిల అవశేషశిలకాక అంతర్గమ శిలగాని, అగ్నిపర్వత ప్రవాహం గాని అయినట్లయితే దీనినే అశ్మనంబంధ మార్గదర్శకమని అనవచ్చు. ఏకకాల జనిత ధాతు నిశ్చేపాల విషయంలో ధాతునిశ్చేపము శిలలో ఒక భాగమే అయినట్లయితే అటువంటి శిలనే ధాతు మార్గదర్శకంగా తీసుకోవచ్చు. ఈవిధమైన స్థానీకరణ (localisation) అవశేష శిలలలో అతिसూక్ష్మంగా ఉంటుంది. ఒకేజాతికి చెందిన అగ్నిశిలలలో కూడా ఈ విధమైన స్థానీకరణ జరగవచ్చు. ధాతు నిశ్చేపము అవశేష విన్యాసంలో ఒకనగమయినట్లయితే, ఆప్రదేశంలోని స్తరానుక్రమాన్ని శిలల నిర్మితిని గుర్తించి ధాతునిశ్చేపపు బహిర్గతము ఏకకాల పుండేదీ చాలా సులువుగా తెలుసుకోవచ్చు. అవశేషశిలలలో ఏర్పడే మాంగనీస్ సంతృప్తరాసు, బంగారాధారు సంతృప్తరాసు, బొగ్గనిశ్చేపాలను ఈ విధంగా చనుక్కొవచ్చు. అగ్నిశిలలలో ఏర్పడిన ఏకకాల జనిత నిశ్చేపాలు పైనచెప్పినంత క్రమంగా ఉండక పోయినప్పటికీ గుర్తించడానికి వీలుగా మాత్రం ఏర్పడతాయి. అతిమౌలిక శిలలలోని క్రోమైట్ ప్రికుంభకాలుగాను, చిన్న చిన్న సంతృప్తాలుగాను కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది. అందువల్ల క్రోమైట్ కోసం వెదికేటప్పుడు అతిమౌలిక శిలలయిన పెరిడోటైట్లోగాని, దానినుంచి ఏర్పడిన నెఫెలైన్ శిలలోగాని, అతిమాఫిక్ శిలలలోగాని వెదకవలె. మనరాష్ట్రంలోని కృష్ణాజిల్లా కొండవల్లి ప్రాంతంలో ఈ క్రోమైట్ అతిమౌలిక పైరాక్సినైట్ లలోను, కర్ణాటక, బీహారు రాష్ట్రాలలో అతిమౌలిక శిలలలోను లభ్యమవుతుంది. పెరిట్, నియోబియం ఐనిజాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ బీహారు, కర్ణాటక రాష్ట్రాలలోని కొన్ని పెగ్మటైట్లలో దొరుకుతాయి.

వజ్రాలు దొరికే అగ్ని పర్వత గ్రీవశీల (Volcanic Pipe Rock) కు వజ్ర కడూరు (ఆండ్రప్రదేశ్), పన్నా (మధ్యప్రదేశ్) ఉదాహరణలుగా తీసుకోవచ్చు. తమిళనాడు రాష్ట్రం సేలం పర్వత, కర్నాటక రాష్ట్రంలోని దొడ్డకనక దొడ్ కటారులపర్వత దొరికే మాగ్నెటైట్ అతిమౌలిక శిలలలో ఏర్పడినదే.

అధోజన్య నిక్షేపాలలోని (Epi-genetic deposits) ధాతు ఖనిజాలు కొన్ని శిలలలోనే ప్రత్యేకంగా కేంద్రీకృతమవుతాయి. కొన్నిచోట్ల ధాతువులు వగు శృను అనునరిస్తాయి. మరికొన్నిచోట్ల అనుకూలప్రదేశ్ శిలలను ప్రతిస్థాపన చేస్తాయి. సంస్తరాలు అనుకూలంగాఉంటే ధాతునిరలు కేంద్రీకృతమవుతాయి. లేదా నిరలు ధాతు ఖనిజాలను సంస్తరాలలో కేంద్రీకరిస్తాయి. అందువల్ల ధాతు నిక్షేపాలకోసం వెదికేటప్పుడు నిరలు ఏర్పడటానికి అనుకూలంగాఉండే ప్రదేశ్ శిలలలోనే వెదకవలె. లేదా కేంద్రీకరణచేసే నిరలకోసం సంస్తరాలను వెదకవచ్చు. అనుకూల సంస్తరాలు అవశేష శిలలే గానక్కరలేదు. ఏవిధమయిన ఆకృతిగల శిల అయినప్పటికీ ధాతునిక్షేప కేంద్రీకరణకు అనుకూలమైనదికావచ్చు. ఇటువంటి అనుకూలత శిలలయొక్క (అ) ప్రవేశయోగ్యత (Permeability), (ఆ) రసాయన ప్రతిచర్యశీలతలమీద ఆధారపడి ఉంటుంది.

సాధారణంగా సున్నపురాయి ధాతునిక్షేపణకు ఎంతో అనుకూలమైనవై నప్పటికీ కొన్ని కొన్ని ధాతు ఖనిజాలు సున్నపురాతిలో నిక్షేపణచెందవు. ఈ సున్నపురాయి లెడ్, జింక్, ధాతు నిక్షేపాలకు అనుకూలమయిన దయినప్పటికీ గోల్డ్ నిక్షేపాలకు మాత్రం అనుకూలమయినది కాదు. స్టేట్ లికంబె క్వార్ట్జైట్ శిలలు కాపర్, జింక్ ధాతునిక్షేపాలకు ఎక్కువ అనుకూలమైనవి.

నిర్మితీయ మార్గదర్శకాలు :

ధాతు ఖనిజాలు మాగ్మానుంచిగాని, ఏ వివిధ ప్రక్రియవల్లగాని ఏర్పడిన తరువాత వివిధ నిర్మితుల సహాయంతో ఈ ధాతుఖనిజాలు మళ్ళీ విస్తరణచెంది ఒక్కొక్కచోట అధికంగా కేంద్రీకృతమవుతాయి. ఈ విధమైన కేంద్రీకరణకు కొన్ని నిర్మితులు చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి. పాతాళ అగ్నిశిలలలోగాని, అంతర్గమాలలోగాని, అగ్నివర్షత శిలలలోగాని ఆయాశిలలు శిలాద్రవస్థితినుంచి చల్లబడి ఘనస్థితికివచ్చేసమయంలో కొన్నివిదరాలుఏర్పడి రాసురాసు అవివేద్యవిగా మారతాయి. ప్రదేశ్ శిలలలో అంతర్గమాలు ఏర్పడి నప్పుడుకూడా ఇటువంటి విదరాలు ఏర్పడతాయి. ఈభాగీ ప్రదేశాలు ధాతుద్రావణాలు ప్రయాణం చేయడానికి ఎంతో వీలుగా ఉంటాయి. చివరకు ఇటువంటి విదరాలలో ధాతుఖనిజాలు

సిరలుగా ఖనిజీకరణ చెందుతాయి. ఇటువంటి సిరలకు, ప్రదేశశిలలకు మధ్యగల స్పర్శలు అనేకచోట్ల స్పష్టంగాను మరికొన్ని క్రమానుగతంగాను (gradual) ఉంటాయి. సంధానము గాని, విడుంగాని ఉన్నచోట శిలలలో చలనం సంభవిస్తే భ్రంశము ఏర్పడుతుంది ఈ భ్రంశాలు అప్రదేశ యోగ్యమైన శిలాపదార్థాలతో సంబంధకపోతే ఇవి ధాతు ద్రావణాల రవాణాకు చాలా అనుకూల మార్గాలు అవుతాయి. రవాణా జరిగిన తరువాత ఈ భ్రంశతలం వెంబడి ధాతునిక్షేపాలు ఏర్పడతాయి. ఈ విధంగాకాక ధాతు ద్రావణాలు ప్రేకివచ్చిన తరువాత భ్రంశ లేర్పడితే ధాతు ఖనిజాల కేంద్రీకరణ వక్రదారులు తీస్తుంది.

వీడన, ప్రతిబల శక్తులకు తట్టుకోలేక పగుళ్ళుబారే శిలలు ధాతునిక్షేపాల కేంద్రీకరణకు చాలా సహాయపడతాయి. ఇటువంటి శక్తుల దాటికి తట్టుకోగలిగి ఉండి పగుళ్ళు చూపని శిలలలో ధాతునిక్షేపాలు చాలా ఆచుడుగా కనిపిస్తాయి. ఈవిధంగా చూసినట్లయితే క్వార్ట్జైట్ స్లేట్. సున్నపురాయి, శిథిలమైన అగ్నిశిలలు గ్రానైట్ శిలలు ధాతు నిక్షేపకేంద్రీకరణకు చాలా అనుకూలమైనవి. దృఢ సంస్తరాలలో సాధారణంగా పగుళ్ళు ఏర్పడకపోయినా, వీడన, ప్రతిబలశక్తులలోంచి విచ్చేదమయినప్పుడు ధాతు ద్రావణరవాణాకు కేంద్రీకరణకు అనువైన పగుళ్ళ సముదాయంగాని ద్రావణాలు ప్రవేశించడానికి అనుకూలమైన బ్రెక్షియాగాని ఏర్పడతాయి.

విభంగ విన్యాసములు :

శిలలలోని విభంగాలు ధాతు ఖనిజ నిక్షేపాల కేంద్రీకరణకు ఎన్నో విధాలుగా సహాయం చేస్తాయి. ధాతు ద్రావణాలు శిలలలోకి ప్రవేశించడానికి విభంగాలు పనికి వస్తాయి. ప్రతి స్థానప్రక్రియ ప్రారంభం కావడానికి ముందుధాతు ద్రావణాలు ఈ విభంగాల ద్వారా శిలలలోనికి చొచ్చుకొని పోయి శిలలలో ధాతు నిక్షేపాలను కేంద్రీకరింప జేస్తాయి. ఈ విధమైన విభంగాలు కాకతాళియంగా ఏర్పడినవి కావు. ఇవి శిలల మీద ప్రతిబల శక్తులు పని చేసినప్పుడు ఆ శిలలు వాటికి లొంగి నప్పుడు ఏర్పడినటువంటివి. ఇవి శిలల బలహీన స్థానాలలో ఎక్కువగా ఏర్పడతాయి. అగ్ని శిలలకూ, అవక్షేప శిలలకూ మధ్య ఉండే స్పర్శలలోను, సంస్తరణ సమ తలాలలోను, పెళుసు శిలలలోను విభంగాలు ఏర్పడతాయి. శిలలలో భేదాలున్న చోట్ల ఒకచోట ఏర్పడిన విభంగాలు మరొక శిలలో ప్రవేశించేటప్పుడు ఆంతర్ధానం కావడం గాని, లేదా విభంగపు కోణము, పరిమాణము

మారడం గాని జరుగుతుంది. విభంగాలలో ఏర్పడిన ధాతు నిక్షేపాలను వెదికే టప్పుడు ఈ విషయాలను గుర్తుంచుకోవలె.


ధాతు నిరలను వెదికేటప్పుడు ఆ ప్రదేశాలలో ఉన్న నిరల విన్యాసాలను బాగా పరిశీలించి అటువంటి విన్యాసాలకు కారణ భూతమైన ప్రతిబల శక్తులు ఏదిక్కునుంచి ఎంత బలంగా వచ్చినాయో వివేచనా శక్తితో విశ్లేషణ చేయవలె. నిరల సమూహాలు సమాంతరంగా ఏర్పడినాయో చతుర్భుజాకారంగా ఏర్పడినాయో లేదా “గ్రైడ్” రూపంలో ఏర్పడినాయో పరిశీలించి ఆయా పరిస్థితులలో ధాతు నిరాన్వేషణను సులువు చేసుకోవలె. ధాతు నిక్షేపాలు ఏ ఏ నిరల ప్రతిచ్ఛేదన స్థానాలలోను, ఎటువంటి నిరలలోను కేంద్రీకృత మవుతాయో ముందుగానే తెలుసుకొని అటువంటి నిరల కోసం ప్రతిచ్ఛేదన స్థానాల కోసం వెదకవలె. ఈ విధమైన అన్వేషణ ఉపరితలం మీదకంటె గురులలో విజయవంతంగా జరిపించవచ్చు.

ధాతు భరితమైన నిరలు రెండు గాని, అంతకు ఎక్కువ గాని చేదించు కొంటున్నప్పుడు, అటువంటి ప్రతిచ్ఛేదన వర్త ధాతు ఖనిజాలు ఎక్కువగా కేంద్రీకృత మవుతాయి. సరిగా ప్రతిచ్ఛేదన వర్త కాకుండా కొన్ని పరిస్థితులలో పరిచ్ఛేదానికి కొంచెం దూరంగా ధాతు ఖనిజాలు కేంద్రీకృత మవుతాయి.

స్పర్శలు :- వివిధ శిలల స్పర్శలు ధాతు నిక్షేపాల కేంద్రీకరణకు చాలా అనుకూల మయినవని అన్వేషకుడు గ్రహించవలె. ఈ స్పర్శలు వివిధ రకాలయిన శిలల మధ్యనే కాక వివిధ భౌమ ప్రక్రియల మధ్య కూడా ఉంటాయి. ఈ స్పర్శలు క్రమానుగతంగా ఉన్న చోట నిక్షేపాల కేంద్రీకరణ ఎక్కువగా ఉండటానికి అవకాశాలున్నాయి. అందువల్ల ఖనిజ అన్వేషకుడు అన్ని విధాలయిన స్పర్శలనూ చాలా శ్రద్ధా నకులతో పరిశీలించవలె.

స్పర్శలు మూడు విధాలు. శిలలు రూపొందినప్పుడే శిలకూ, శిలకూ మధ్య ఏర్పడే స్పర్శ మొదటిది. అగ్నిశిల అంతర్గమనం చెందినప్పుడు ఇటువంటి అంతర్గమనానికి, అది చొచ్చుకొని పోయిన ప్రదేశ శిలకూ మధ్య గల స్పర్శ రెండవది. నిర్మితియ విరూపణ కారణంగా ఏర్పడిన స్పర్శ మూడవది. ఈ మూడు విధాలయిన స్పర్శలూ ధాతు నిక్షేపాల కేంద్రీకరణకు చాలా అనుకూలమైనవి. వీటిలో మొదటి దాని కన్న మిగిలిన రెండు విధాలయిన స్పర్శలు చురింత అనుకూలమైనవి. అవశేష శిలలలో ఒక దానికి, మరొక దానికి మధ్య

ఏర్పడే స్పర్శలలో ఉష్ణ జలీయ ధాతుద్రావణాలు చొచ్చుకొని పోయి ధాతు ఖనిజాలను కేంద్రీకరించడం జరుగుతుంది. ఇటువంటి స్పర్శలలో దుర్బల మండలా లుండటం వల్ల ఇటువంటి కేంద్రీ కరణకు ఎక్కువ అవకాశము ఉంటుంది. అంతర్గమనం జరిగినప్పుడు ఏర్పడిన స్పర్శలలో మాగ్మాటిక్ నిర్గ



వటము-4-గ్రానైట్ స్పర్శఖనిజ కేంద్రీకరణ

1. గ్రానైట్ అంతర్గమనము 2, 3, 4. అవశేషశిలలు
5. స్పర్శవద్ద ఖనిజకేంద్రీకరణ

మాల వల్ల చాలా ఎక్కువ భాగంలో ధాతు ఖనిజ కేంద్రీ కరణ జరుగుతుంది. నిర్మితీయ విరుహణ వల్ల ఏర్పడిన స్పర్శలలో కూడా దుర్బల మండలాలుండటం వల్ల మాగ్మా సంబంధమైన ఉష్ణ జలీయ నిర్గమాల సుంచి వెలువడే ధాతు ద్రావణాలు స్పటికీ కరణ చెంది ధాతు ఖనిజ సముదాయము కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది.

వైన చెప్పిన స్పర్శలలో ధాతుఖనిజ కేంద్రీకరణ జరిగినప్పుడు ఈ ఖనిజాలు ప్రదేశ శిలలలోకి కొంతమేరకు చొచ్చుకొని ఉంటాయి. ఈ విధంగా

ధాతు ఖనిజాలు చొచ్చుకొనిపోయే ప్రదేశ శిలా భాగము ధాతు ద్రావణాల ప్రవేశ శక్తిని బట్టి, ప్రదేశ శిలల సంఘటనను బట్టి, వాటి రేఖ పరిమాణాన్ని బట్టి, ధాతు ద్రావణాలకు ప్రదేశ శిలలకు మధ్య రసాయన ప్రక్రియకు గల అవకాశాన్ని బట్టి ఉంటుంది. అనలైన స్పర్శలు మట్టితోను, చెట్ల తోను కప్పబడి ఉన్నచోట్ల ఈ విధంగా ప్రదేశ శిలలలో విస్తరణ (dissemination) చెందిన ధాతు ఖనిజాల నాధారంగా తీసుకొని స్పర్శల కోసం, ఆ స్పర్శలలో ధాతు ఖనిజ నము దాయం కోసం వెదకితే సత్ఫలితాలు లభిస్తాయి. ప్రదేశ శిలు ప్రతిస్థాపనకు చాలా అనుకూలమైతే ధాతు ద్రావణాలు స్పర్శలలో స్పటికీకరణం చెందడమే కాక ప్రదేశ శిలలను చాలా భాగం ప్రతిస్థాపన చేస్తాయి. ఇటువంటి ప్రతి స్థాపనకు నున్నపు రాయి, డోలమైట్, మాధ్యమిక అగ్ని శిలలు చాలా అనుకూలమైనవి. అగ్ని శిలలు ప్రదేశ శిలలలోకి అంతర్గమనం చెందినప్పుడు అవి ఒక్కచోట కాక అనేక చోట్ల చొచ్చుకోవడానికి కూడా అవకాశముంది. అందువల్ల అగ్నిశిల స్పర్శలలో ధాతు ఖనిజాల ఉనికిని గుర్తించినప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో మరికొన్ని అగ్ని శిలా స్పర్శలకోసం వెదకవలె.

అగ్నిశిల అంతర్గమన సమయంలో ధాతుఖనిజాల కేంద్రీకరణే కాకుండా ప్రదేశశిల అవక్షేపశిల అయితే అదిరూపాంతర ప్రాప్తిచెంది అందువలనకొన్ని అలోహధాతు ఖనిజాలుకూడా ఏర్పడవచ్చు. ఈవిధంగా అగ్నిశిలకు; ప్రదేశశిలలకు గల స్పర్శలు చాలా ముఖ్యమైనవని గమనించవలె. ధాతుద్రావణాల స్పటికీకరణం వల్ల టంగ్‌స్టన్, గోల్డ్‌కావర్, లెడ్, జింక్ మొదలైన లోహధాతువులు, ప్రదేశశిల రూపాంతరప్రాప్తి పొందడంవల్ల స్థియటైట్, అస్సెస్టాస్, గ్రాఫైట్ గార్బెట్ కొరం డమ్ మొదలైన అలోహధాతువులు ఏర్పడతాయి. పెగ్మటైట్ మైకాషిస్ట్ల స్పర్శస్థానాలలో మేలురకం మైకా ఏర్పడుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని నెల్లూరుజిల్లా గూడూరు ప్రాంతంలో లభ్యమయ్యే మైకా ఈవిధంగా కేంద్రీకృతమైనదే. తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని తిరుచిరావల్లి జిల్లా కడవేరేవద్ద పెగ్మటైట్‌లలో లోపల ఉన్న క్వార్ట్జ్‌కు బయటివైపునఉన్న ఫెల్స్పార్‌కు మధ్యఉన్న స్పర్శలలో కొలంబైట్ టాంట్లైట్ ఖనిజాలు కేంద్రీకృతమయినాయి. కడప వ్యవస్థలోగల “వేంపల్లె సున్నపురాయి” విన్యాసంలో మౌలిక శిలలఅంతర్గమనం వల ఏర్పడిన స్థియటైట్, ఆస్సెస్టాస్‌సిల్ శిలల రూపంలో ఉన్నమౌలిక శిలలకూ “వేంపల్లె సున్నపురాయి”కి మధ్యగల స్పర్శలలో కేంద్రీకృతమైఉన్నాయి. ఈ “వేంపల్లె సున్నపురాతిమేఖలలో ఈ అలోహఖనిజాల కోసం అన్వేషణచేసేటప్పుడు ఈస్పర్శల చేరువలోనే

అటువంటి అన్వేషణ జరపవలె. ఆంధ్రలోని ఉభయగోదావరి, ఖమ్మమ్, విశాఖ వట్నం జిల్లాలలో ఖోండ్రైట్ శిలలలో లభించే గ్రాఫైట్ అంతర్గతము మయిన పెగ్మటైట్ లకు ఖోండ్రైట్ లకు మధ్య ఉన్న స్పర్శలలో కేంద్రీకృతమైనది. ఇటువంటి గ్రాఫైట్ నిక్షేపాలు కేరళలోని తిరువనంతపురం, కోయిలమ్ (Quilon), ఎర్నాకులమ్ జిల్లాలలో ఇదేవిధంగా కేంద్రీకృతమునాయి, తమిళనాడు రాష్ట్రంలో శేలం జిల్లాలోని “సిత్తంపుండి ఎనార్థొసైట్ మేఖల”లో లభించే కోరండమ్ ఎనార్థొసైట్ లు, నయనైట్ లకును మధ్యగల స్పర్శలలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. మనదేశంలో వైన ఉదాహరించిన నిక్షేపాలను వెదికేటప్పుడు వైనచెప్పిన స్పర్శలను జాగ్రత్తగా పరిశోధించవలె.

వఖయ:-వశిభవనం చెందిన శిలలలో కొన్నికొన్ని వశిభాగాలు ధాతునిక్షేపాల కేంద్రీకరణకు అనువైన స్థానాలుగా ఉంటాయి. వఖలలోని అవనతి శృంగభాగాలు అభినతిశ్రోణిభాగాలు, లేదా పార్శ్వభాగాలు ఇటువంటి కేంద్రీకరణకు వీలైన స్థానాలు. వీటిలో ధాతునిక్షేపాలు ఏభాగంలో కేంద్రీకరించబడతాయి. అనేది ముడుతలు, ధాతునిక్షేపాలు ఏర్పడే కాలాలను బట్టి ఉంటుంది. ధాతునిక్షేపానికి ముందుగా వఖలు ఏర్పడినాయా లేదా తదనంతరం ఏర్పడినాయా లేదా రెండూ ఇంచుమించు ఒకే కాలంలో ఏర్పడినాయా? అనేనిషయం తెలుసుకొన్నట్లయితే ధాతుకేంద్రీకరణ వఖల ఏ భాగంలో జరుగుతుందో. తెలుసుకోవచ్చు.

ధాతుఖనిజాలు ఏర్పడిన తరువాత శిలలలో వఖలు ఏవిధంగా తీర్చిదిద్ద బడతాయో ఆవిధంగానే ధాతువుకూడా రూపొందుతుంది. ధాతువంతా ఒక అవక్షేప శిలమాదిరిగా ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ధాతునంతటాలోని మార్పులు ఆ ప్రదేశపు అవక్షేప శిలలనంతటాలోని మార్పుల కనుగుణంగా ఉంటాయి. ధాతువు కేంద్రీకృతం కావడంగాని, మందం తగ్గడంగాని జరగదు. ఒకవేళ మందంలో ఏమయినా మార్పున్నట్లయితే ఆమార్పులు అవక్షేప దశలోనివేగాని వఖలవల్ల ఏర్పడినవికావు.

ధాతువు ఏర్పడిన తరువాత రూపొందిన వఖలవల్ల ఇంచుమించు నమనత వఖల వలె బిగువుగా ఉన్నట్లయితే ధాతువు వఖపార్శ్వాలలో పలచబడి వంపులలో మంద మెక్కుతుంది. ఇటువంటి నందర్పాలలో వఖల ఆనతి (Plunge of the folds) వెంబడి మందం ఎక్కువఉన్న ధాతునిక్షేపం లభిస్తుంది. వఖల పార్శ్వాలలో

ఏర్పడిన విదళనాలు (Cleavages) కరణవశులు ప్రధానవశులతో ఎటువంటి సంబంధంకలిగి ఉన్నాయో తెలుసుకొని వశలో సంస్తరాలలో ఏభాగం వశీభవనం చెందే ముందు ఉపరితలంపక్కగా ఉందో తెలుసుకొన్నట్లయితే ఈవిధమైన నిర్మితులను చాలా సులువుగా గ్రహించవచ్చు.

ఉష్ణజలీయ ద్రావణాల ప్రభావంతో డోలమైట్ లోగాని, మేగ్నీషియమ్ భరిత సున్నపురాయి లోగాని సర్పెంటీన్ స్టియడైట్ మొదలైన ఆలోహ ఖనిజాలేర్పడేటప్పుడు, ఆలోహఖనిజంగా మార్చబడిన సంస్తరము వశుల ప్రభావం వల్ల అపసతి శృంగభాగాలలోను, అభినత ద్రోణిభాగాలలోను మంఠంగా ఉండి. పార్శ్వాలలోను, వలచగా ఉంటుంది. ఈవిధమైన మార్పును అనంతపురంజిల్లా ముచ్చుకోటవద్ద ఉన్న స్టియడైట్ నిక్షేపాలలో చూడవచ్చు. వశులలో ఏర్పడిన ధాతు నిక్షేపాలలో చాలా ఎక్కువశాతం ఈ విధంగావశులతోబాటు ఏర్పడినవే. ఇట్లాకాక ధాతువు ఏర్పడిన తరవాత ముడుతలు పడి కొత్తస్థానాలలో ధాతునిక్షేపాల కేంద్రీకరణ జరుగుతుంది. ఈవిధంగా కేంద్రీకరించబడిన ధాతుఖనిజాలు ఏఒక్క సంస్తరానికి చెందిఉండవు.

ధాతునిక్షేపాలు ఏర్పడటానికి ముందుగానే వశులుఏర్పడినట్లయితే ఆవశుల లోకి ధాతుద్రావణాలు చొచ్చుకొనిపోయి ధాతుఖనిజాలను వశులలోనిబలహీన మండలాలలో నిక్షేపించేస్తాయి. ముడుతలు పడినప్పుడు సంస్తరాలలో పగుళ్ళు ఏర్పడతాయి. ఈ పగుళ్ళు ఏవిధంగా ఏర్పడతాయి అనేది ముడుతల ప్రభావమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ముడుతల వంపులలో ఎక్కువగా ఈ పగుళ్ళు ఏర్పడతాయి. ముడుతలలోని పెళుసుశిలలు వంపులలో పగిలి బ్రెక్కియాలుగా మారి ధాతుద్రావణ కేంద్రీకరణకు, ప్రతిస్థాపనక్రియకు సహాయకారులవుతాయి. వశుల వంపులు ఏవిధంగా ధాతునిక్షేపాలకేంద్రీకరణకు అనుకూలంగా ఉంటాయో అదేవిధంగా కొన్నికొన్నిసందర్భాలలో పార్శ్వాల కూడా ధాతుకేంద్రీకరణకు అనుకూలంగా ఉంటాయి.

ప్రతిస్థాపనక్రియవల్ల ఏర్పడిన ధాతుసంస్తరాలుముడుతలు పడినప్రదేశాలలో ధాతునిక్షేపాలను వెదికేటప్పుడు ముడుతలతో బాటు ఏర్పడిన ధాతునిక్షేపాలను వెదకడానికి ఏగుర్తులు ముఖ్యమైనవో అవేగుర్తులను దృష్టిలోఉంచుకొని అన్వేషణ సాగించవలె. ముడుతలు పడిన శిలలలోకి ధాతుద్రావణాలు చొచ్చుకొని పోయేటప్పుడు ఈ ముడుతలు ధాతుద్రావణాల రవాణామీద ప్రభావం కలిగి ఉంటాయి. ధాతుద్రావణాలు ఉపరితలదిశగా ప్రయాణంచేస్తున్నట్లయితే వశుల

అవనతులు ఈ ద్రావణాలను కూడదీసి కేంద్రీకరిస్తాయి. అభినతులు విశ్లేషణ చేస్తాయి. ద్రావణాలు ఉపరితలంనుంచి అదోముఖంగా ప్రయాణం చేస్తుంటే అభినతులు అటువంటి ద్రావణాలను కేంద్రీకరిస్తాయి. అవనతులు విశ్లేషిస్తాయి. ఇటువంటి సందర్భాలలో నిశ్లేపాల అన్వేషణ జరిపించేటప్పుడు ద్రావణాల రవాణా ఏదిశనుంచి ఏదిశకు జరిగిందో తెలుసుకోగలిగినట్లయితే అభినతులలో గాని అవనతులలో గాని అన్వేషణను ఉధృతం చేయవచ్చు.

భ్రంశాలు ధాతునిశ్లేపాల సంధానము :- భ్రంశాలు ధాతు ద్రావణాల కేంద్రీకరణకు ఎంత ఉపయోగమో ఇంతకుముందు చెప్పడం జరిగింది. ధాతు నిశ్లేపాల వినంధానానికి కూడా ఈ భ్రంశాలు ఎంతగానో కారణభూతులవుతున్నాయి. ధాతునిశ్లేపాలు మూడువిధాలుగా వినంధానం చెందుతాయి. వజ్రలవల్లగాని, భ్రంశాల కారణంగాగాని అంతర్గమాలవల్లగాని ఈ వినంధానం జరుగుతుంది. ముడుతలవల్ల ఏ విధమైన మార్పులు వస్తాయో ఇంతకుముందు చెప్పడం జరిగింది. భ్రంశాలు, అంతర్గమాలు ఈవినంధానాన్ని కలగజేసినప్పుడు ధాతు నిశ్లేపాలు ఏ విధంగా మార్పుచెందుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకొందాము. ఈ విజ్ఞానము కొత్తధాతు నిశ్లేపాలకు కనుక్కోవటానికి అంత ఉపయుక్తం కాకపోయినప్పటికీ పాతధాతు నిశ్లేపాలలో నిశ్లేపాల సంస్తరాలు ఏవి దిశలలో ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి చాలా ఉపయోగిస్తుంది. భ్రంశాలు ధాతునిశ్లేపాలలో క్షితిజ సమాంతరంగాను, ఊర్ధ్వంగాను కూడా స్థానభ్రంశాన్ని కలిగిస్తాయి. ఏదైనా గనులో భ్రంశాలమూలంగా ధాతు సంస్తరము వినంధానం చెందినప్పుడు భ్రంశాలకు అవతలిభాగంలో ధాతుసంస్తరపు అవి చ్చిన్నభాగాన్ని కనుక్కోవలెనంటే నిశ్లేపాన్వేషకుడు జ్యోమితి శాస్త్ర సహాయంతో లెక్కలుగట్టి భ్రంశాలవల్ల ఏవి దిక్కులలో ఎంతెంత వినంధానము సంప్రాప్తించినదో తెలుసుకోవలె, అతరవాత ఆ భ్రంశాలకు అవతలి భాగంలో ధాతువు ఏ ప్రాంతంలో ఉందో నులువుగా బోధపడుతుంది. ఈ విధంగా అన్వేషణ కొనసాగించకపోతే గనులలో భ్రంశాలకు అవతలి వైపున ఉన్న ధాతునిశ్లేపాలు మరుగున పడిపోతాయి.

ధాతుసంస్తరము అనోదైర్ఘ్య భ్రంశంవల్లగాని, నతీభ్రంశంవల్లగాని వినంధానం చెందినప్పుడు ఆధాతు సంస్తరాన్ని ఒకవక్రముంచి తొలిచివెలికి తీసేటప్పుడు భ్రంశతలంవద్ద ధాతునిశ్లేపం అంతర్ధానమవుతుంది, అప్పుడు భ్రంశ సమతలాన్ని పరీక్షించి స్థానభ్రంశము భ్రంశ సమతలానికి దిగువ భాగంలో ఉందో,

వైభాగంలో ఉండో నిర్ధారణ చేసుకొని ధాతు నిక్షేప సేకరణను కొనసాగించవలె లేకపోతే భ్రంశనమతలంపకే ధాతునిక్షేపము ఉందన్న పొరపాటు భావంతో భ్రంశానికి అవతలి వైపున ఉన్నవిలువైన ధాతు నిక్షేపాన్ని పదులు కోవలసి వస్తుంది.

భ్రంశ నమతలానికి ఎటువైపున స్థానభ్రంశం జరిగిందో తెలుసుకోవడానికి ముఖ్యమైన కొన్ని విధానాలున్నాయి. మొదటిది భ్రంశమండలానికి ఇరువైపులా ఉన్న కుద్యశిలల పరీక్ష. రెండవది భ్రంశమండలాలలో ఏర్పడిన కర్షణను పరిశీలన చేయడం మూడవది భ్రంశమండలాలలో భ్రంశ కుశ్యం మీద కనిపించే భ్రంశచారల పరిశీలన.

భ్రంశాలు ధాతునిక్షేపణ పూర్వభ్రంశాలని ధాతు నిక్షేపణ అనంతరభ్రంశాలని రెండువిధాలు ధాతునిక్షేపణ పూర్వభ్రంశాలలో ధాతు ద్రావణాలు ధాతువును నిక్షేపించినప్పుడు ఆ భ్రంశాలకు రెండవవైపులా ధాతు నిక్షేపముఉండదు. భ్రంశ నమతలాలలో మాత్రమే ఖనిజీకరణ జరిగిఉంటుంది. భ్రంశానికి ధాతు ఖనిజకేంద్రీకరణ జరుగుతుంది. ధాతు నిక్షేపణ అనంతర భ్రంశాలలో ధాతు సంస్తరాలు భ్రంశాల కిరువైపులా కనిపిస్తాయి. అదువల్ల ఏదైనా ధాతు నిక్షేపంలో భ్రంశాలను కనుక్కొన్నప్పుడు ఆ భ్రంశాలు ధాతు నిక్షేపణకు ముందు కాలానివో లేదా నిక్షేపణ అనంతర సంఘటనలో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యము. నిక్షేపణపూర్వ భ్రంశాల విషయంలో అన్వేషణపైన చెప్పిన విధంగాకాక మరొక విధంగా ఉంటుంది. ధాతు నిక్షేపాన్వేషణ భ్రంశ నమతలం నుంచి సాగించవలె భ్రంశ మండలంలో కూడా ఖనిజీకరణ ఉంటుంది కనక అది ఏరికగా ఉండో పరీక్షిస్తూ ముందుకు పోవలె.

ధాతు నిక్షేపణ అనంతర భ్రంశాలను ధాతువులోని “స్లికెన్ నైడ్ల” వల్లనూ, బ్రెక్కియా వల్లనూ, భ్రంశమండలంలోని కర్షణ ధాతువు వల్లనూ గుర్తించవచ్చు. సీరలు ధాతు సంస్తరాలు భ్రంశాల కిరువైపులా పార్శ్వచలనం చెందుతుంది.

ధాతునిక్షేపాల మీద భ్రంశాల ప్రభావము బొగ్గు నిక్షేపాలలో చూడవచ్చు. ఉష్ణజలీయ ద్రావణాలవల్ల ఏర్పడిన ధాతు నిక్షేపాలలోకూడా విటిప్రభావం కనిపిస్తుంది. ధాతునిక్షేపణ పూర్వభ్రంశాలలో ధాతు కేంద్రీకరణకు ఉదాహరణగా

“వేంవల్ల నున్నపురాతిమేఖల”లోని బెరైట్స్ నిక్షేపాలను తీసుకోవచ్చు. కర్నాటక రాష్ట్రంలోని బళ్ళారి-హాస్ పేట, టుంకూరు-చిత్రదుర్గ, బాబాయిడన్ కోండలలో లభ్యమయ్యే ఐరన్ ఖనిజదాతువు పట్టిత హెమటైట్, చెర్ట్జాస్పర్ క్వార్ట్జ్ జైట్ శిలలనుంచి భ్రంశాలలోను, వళులలోను, విభంగ మండలాలలోను కేంద్రీకృతమైనదే.

సాధారణంగా నిక్షేపాన్నేషకుడు ఉపరితలం మీద పైనవివరించ బడిన నిర్మితుల ఉనికిని తెలుసుకోవడానికి కొంత వ్యవధి వడుతుంది. నిర్మితియ భూవిజ్ఞాన శాస్త్రంలో ప్రావీణ్యమున్నవారికి ఇది సులభమే, ఇతరులకు కొంచెం కష్టసాధ్యము. భూమి ఉపరితలం మీద ఇటువంటి నిర్మితులు అన్నిప్రదేశాలలోను కనిపించవు. ఒకవేళ భూపటల అంతర్భాగంలో అవి ఉన్నప్పటికీ ఉపరితలంపైన ఉన్న మృత్తిక వృక్షజాలాలవల్ల అవి కనుమరుగవుతాయి. వీటి ఉనికిని తెలుసుకోవడం భూ భౌతిక శాస్త్రవద్దతుల వల్లనే సాధ్యమవుతుంది.

భూరసాయన శాస్త్రవిధానాలు

భూవిజ్ఞానశాస్త్రంలో భూరసాయనిక శాస్త్రపద్ధతులకు మూలాధార విజ్ఞాన శాస్త్రాలు భూవిజ్ఞాన శాస్త్రము, రసాయన శాస్త్రము. కొన్నిరసాయనశాస్త్ర సూత్రాలను ఉపయోగించి భూవిజ్ఞానశాస్త్ర సమస్యలను అర్థంచేసుకొని వాటిని సరిఅయిన పద్ధతిలో వినియోగిస్తూ విశ్లేషణ-వర్ణన సాగించడమే భూరసాయన శాస్త్ర భూవిజ్ఞానశాస్త్రం. భూవిజ్ఞానశాస్త్రంలో భూరసాయన శాస్త్రపద్ధతుల ప్రాముఖ్యము ఈ శతాబ్దపు రెండుపాదాలలో అధికమైంది. ఈపద్ధతులద్వారా అలోహవిజ్ఞాన శాస్త్రం కనుగొనబడింది. అలోహముల, ఇంధన భూజాల అన్వేషణకూడా జరుగుతున్నది.

భూరసాయన శాస్త్రపద్ధతుల విశిష్టత భూవిజ్ఞానశాస్త్రంలోని, శిలలలోని మూలకాలను అంచనా వేయడానికి ఉపయోగించే విశ్లేషణ పద్ధతిపేరే అధారపడి ఉంటుంది. ఈ విశ్లేషణ పద్ధతి తక్కువ వ్యయంతో ఎక్కువసంఖ్యలను విశ్లేషించడానికి అతి సూక్ష్మప్రమాణాలలో ఉన్న రసాయనిక ధాతువులను విశ్లేషించడానికి వీలైనదిగాను, అతిసున్నితమైనదిగాను, క్షేత్రంలో కూడా ప్రయోగాలు చేయడానికి పీలు కలిగివున్నదిగాను ఉండవలె. ఈ విధమైన విశ్లేషణ పద్ధతులలో ముఖ్యమైనవి, అందరికీ అందుబాటులో ఉన్నవి ఈ దిగువ పేర్కొనబడినాయి.

- జ్వాలా కాంతి మాపక పద్ధతి.
(Flame-Photometric Method)
- వర్ణ మాపక పద్ధతి
(Colorimetric Method)
- వర్ణ పట కాంతి మాపక పద్ధతి
(Spectrophotometric Method)
- వర్ణ పట లేఖన పద్ధతి
(Spectrographic Method)
- పరమాణు శోషణ వర్ణ పట మాపక పద్ధతి

(Atomic Absorption Spectrophotometric Method)

ఈ వైపద్ధతులలో వర్ణపట లేఖనీ పద్ధతి (Spectrographic Method) ద్వారా తక్కువ వ్యవధిలో ఎక్కువ నమూనాలలో హెచ్చు మూలకాలను అంచనా వేయవచ్చు. భూరసాయన శాస్త్ర ఖనిజాన్వేషణ పద్ధతులు భూమి ఉపరి భాగంలోని ఘన, ద్రవ, వాయు పదార్థాల విశ్లేషణ మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. చాలా సందర్భాలలో ఘన పదార్థపు విశ్లేషణ విషయంలో భూరసాయన శాస్త్ర పద్ధతి అని ద్రవ పదార్థం విషయంలో జల రసాయన శాస్త్ర పద్ధతి అని అనడం పరిపాటి. భూరసాయన, జల రసాయన పద్ధతులు లోహ ధాతు ఖనిజాలను, అలోహ ఖనిజాలను వెదకడానికి, వాయు పద్ధతులు పెట్రోలియమ్ నిక్షేపాలను వెదకడానికి ఉపయోగ పడతాయి.

భూరసాయన శాస్త్ర పద్ధతులద్వారా ఖనిజాన్వేషణ సాగించేటప్పుడు విశ్లేషణ పద్ధతులలో పరిజ్ఞానం మాత్రం చాలదు. ఈ పద్ధతులను ఎటువంటి సందర్భాలలో ఏ విధంగా ఉపయోగించ వలె? ఏ ఏ ఖనిజాలలోను, శిలలలోను ఎటువంటి రసాయన ధాతువులు నమ్మిశీతమయి ఉంటాయి? నమూనాలను ఎక్కడ ఏ విధంగా సేకరించ వలె? వచ్చిన ఫలితాలను ఎటువంటి విధానంలో ఎప్పటికీ రించ వలె? అనే విషయాలను ఖనిజాన్వేషకుడు తుజ్జంగా తెలుసుకోవలె. ఇక్కడ మనము ముఖ్యంగా గమనించ వలసినది ఒక్కటి. భూవిజ్ఞాన శాస్త్ర పద్ధతుల ద్వారా మనకు కనిపించే శిలలలో ఏ ఖనిజాలున్నాయో తెలుసుకోగలము. భూరసాయన శాస్త్ర పద్ధతులద్వారా మనకు కనిపించని శిలలలో కూడా ఏ ఖనిజాలుండటానికి అవకాశముందో తెలుసుకోవచ్చు.

ఈ శాస్త్ర పద్ధతులలో నాలుగు విధాలున్నాయి. బహిర్గత శిలల ఖనిజాల నమూనాలు సేకరించి వాటిని విశ్లేషించి, వాటి విలువలను బట్టి అన్వేషణ ఒరిపించడం మొదటి పద్ధతి. ఎటువంటి శిలా బహిర్గతాలూ లేనప్పుడు అటువంటి ప్రదేశాలలో మృత్తికను విశ్లేషించి ఖనిజాన్వేషణ కావించేది. రెండో పద్ధతి. జలాశయాలు, నదులు, బావులు, అంతర్భాగ జలాలు-వీటి నమూనాలను సేకరించి విశ్లేషించి వాటి ద్వారా ఖనిజాన్వేషణ చేసే పద్ధతి మూడవది. ఒక ప్రదేశంలోని పృథ్వీ సంపత్తిని ఆధారంగా చేసుకొని పృథ్వీ వివిధ భాగాలను విశ్లేషించి వాటి విలువలను ఖనిజాన్వేషణకు ఉపయోగించడం నాలుగవ పద్ధతి. వీటిలో మొదటి రెండింటినీ భూరసాయన శాస్త్ర పద్ధతి గానే పరిగణిస్తూంటారు. మూడవది

జలరసాయన పద్ధతి అని పరిగణించడం జరుగుతుంది. నాలుగవ పద్ధతిలో రెండు విధానాలున్నాయి. మొదటిది జీవ భూరసాయన శాస్త్ర పద్ధతి (Biogeochemical Method) : రెండవది భూవిజ్ఞాన-పుష్క శాస్త్ర పద్ధతి (Geobotanical Method) ఒకే ప్రదేశంలో పెరుగుతున్న ఒకే జాతి మొక్క వివిధ భాగాలను వేర్వేరుగా విశ్లేషణ చేసి ఆ ఫలితాలను ఖనిజాన్వేషణకు ఉపయోగించుకోవడం జీవ భూరసాయన శాస్త్ర పద్ధతి అవుతుంది. ఏ ఏ ప్రదేశాలలో ఏ జాతి మొక్కలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయో సకాంతంగా తెలుసుకోని ఆ ఫలితాలను ఖనిజాన్వేషణకు ఉపయోగించుకోవడం భూవిజ్ఞాన-పుష్క శాస్త్ర పద్ధతి ఈ పైన పేర్కొన్న వాటి నన్నింటినీ “భూరసాయన శాస్త్ర పద్ధతులు” అని సాధారణంగా అంటారు. బహిర్గత శిలలు లేని చోట్ల చేసే భూరసాయన ఖనిజాన్వేషణ ఎక్కువ ఉపయోగ కరంగా ఉంటుంది.

భూరసాయన సూచికలు (Geochemical Indicators)

భూరసాయన శాస్త్ర పద్ధతులలో సూచికల ప్రాధాన్యము హెచ్చుగా ఉంటుంది. ఖనిజ కేంద్రీకరణ స్థానం వద్దను, దానికి సమీపంలో ఈ కింది పేర్కొనబడిన మూడు విధాలయిన మూల ద్రవ్యాలను గుర్తించ వచ్చు.

(అ) ఖనిజాలలోని ప్రధాన మూలకాలు (Principal Elements)

(ఆ) ఖనిజ కేంద్రీకరణకు సంబంధించిన మూలకాలు

(ఇ) సూచిక మూలకాలు (Indicator elements)

అగ్ని శిలలలోను, అవక్షేప శిలలలోను, మృత్తి కలోను, జలాశయాల్లో ఉన్న ఒక కచ్చితమైన నిష్పత్తిలో ఉన్న మూలకాల మిశ్రమాలు భూరసాయన సూచికలుగా శిలల వుట్టుకను గురించి, ఖనిజాల వుట్టుక గురించి ఎన్నో విషయాలు విపులీకరిస్తూ ఖనిజాన్వేషణకు దోహద కారులుగా ఉంటాయి. ఉదాహరణకు వైరైట్ మిశిత శిలా బహిర్గతాల వైనా, అల మౌలిక శిలా బహిర్గతాలవైనా ఏర్పడిన గోసాన్లలో మూలక మిశ్రమంలో తేడా ఉంటుంది. ఈ రెండు గోసాన్లలోని $Ni : Co$ నిష్పత్తులను కనుక్కోవడం ద్వారా, చీట్లతో బాటు సిల్వర్ ధాతువుకూడా మిశితమై ఉందా ? లేదా ? అని తెలుసుకోవడంలోను ఈ సమన్యవరి ప్రాధురమవుతుంది. ఏ విధంగానో తెలుసుకొందాము : అల మౌలిక శిలల ఏర్పడిన గోసాన్లలో కోబాల్ట్ కన్ను నికెల్ అధికంగా ఉంటుంది. సిల్వర్

అనలు ఉండదు. వైరెట్ మిశిత శీలల మీద ఏర్పడిన గోసానులలో నికెల్ కన్న కోబాల్ట్ హెచ్చుగా ఉంటుంది. దీనితోబాటు సిల్వర్ కూడా ఉంటుంది. ఇదే విధంగా ఉష్ణ జలీయ భినిజాలను అవక్షేప భినిజాల నుంచి గుర్తించేటప్పుడు $Ba : Sr$ నిష్పత్తి చాలా ఉపయోగ పడుతుంది. ఉష్ణ జలీయ భినిజాలలో బేరియమ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అవక్షేప భినిజాలలో స్ట్రాన్షియమ్ హెచ్చుగా ఉంటుంది. భినిజ స్వరూపానికి సమీపంలో చిన్న రింబి ఉన్న ఓనిజీ కృతి మండలంలోని కొన్ని మూలకాలు భూరసాయన సూచికలుగా పని చేస్తాయి. ఇటువంటి సూచికగా మెర్క్యురీ చాలా ప్రాముఖ్యం వహిస్తుంది. మెర్క్యురీ ధాతువు మెర్క్యురీ ఓనిజీ కరణ మండలానికే గాక తదితర లోహ ఓనిజీ కరణ మండలాలకు కూడా సూచికగా వర్తిస్తుంది. మెర్క్యురీ ధాతు సూచిక సహాయంతో మనము నిర్ణయించ గలిగేవి ముఖ్యంగా లోహ సత్పైదీ నిక్షేపాలు. ఇదే విధంగా ఆర్సెనిక్ ధాతువు, ఆర్సెనిక్ భినిజాలు కూడా సూచికలుగా ఉపయోగ పడతాయి. బోరాన్ పరొక ముఖ్యమైన భూరసాయన సూచిక. మృత్తికలో, జలాశయాల లోను ఉన్న మోలిబ్డినమ్, కాపర్, ధాతువులు కాపర్ నిక్షేపాల ఉనికిని తెలియ జేస్తాయి. ఫ్లోరీన్, బోరాన్, వెనేడియమ్, బేరియమ్, స్ట్రాన్షియమ్ మొదలైన మూలకాలు ఉష్ణ జలీయ భినిజ మండలాన్వేషణలో సూచికలుగా ఉపయోగపడతాయి. సున్నపు రాతిలోను, చలువ రాతిలోను, డోలొమైట్లోను ఉష్ణ జలీయ భినిజీ కరణం వల్ల ఏర్పడిన గ్రాఫైట్ బహు లోహ భినిజ మండలానికి చక్కటి సూచిక. కాని ఇది భినిజ సూచికగానే పరిగణించ బడుతుంది. గాని భూరసాయన సూచికగా మాత్రం కాదు.

ప్రకృతి జలాలలోని లోహపు పిలువలను బట్టి నమూనాలను సేకరించిన పరిసరాలకు ఎంత దూరంలో ఏ దిశలో, లోహ నిక్షేపాలున్నాయో కనుక్కోవచ్చు. బయోటైడ్, వైరెట్ మొదలైన కొన్ని భినిజాలలో నిబిడి కృతమై ఉన్న లోహ మూలకాలు (Metalic Element) భూ అంతర్భాగంలోని నిక్షేపాలను సూచించ వచ్చు. కార్బైడ్లోను, ఫ్లోరైడ్లోను కేంద్రీ కృతమై ఉన్న మెర్క్యురీ ధాతువు మెర్క్యురీ నిక్షేపాన్వేషణకు పనికి వస్తుంది.

లోహ ధాతువులే కాకుండా భినిజాలు కూడా భూరసాయన సూచికలుగా ఉపయోగపడతాయి. భినిజం గాని భినిజ నమూనాయం గాని ఏ భౌమ పరిస్థితులలో ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద రూపొందిందో మనము తెలుసుకొన్నట్లయితే అటువంటి పరిస్థితులలో ఆయా భినిజాలను వెదకడం అవసరమా ? లేదా ? అనేది తెలుస్తుంది.

ఈ విధమైన సూచికలుగా ఖనిజాల కంటే ఖనిజ మిశ్రమాలు ఎక్కువ ఉపయోగ కరిగి ఉంటాయి. ఒక నిక్షేపం గాని, ఒక ఖనిజ సముదాయం గాని ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఏర్పడిందో తెలుసుకోవడానికి ఆండులోనియా-క్వార్ట్జ్, బెక్వార్ట్జ్, ముడి బిస్మత్, అకంటైట్, వర్ట్జైట్, స్పేలరైట్, ఫైరైట్ మొదలైన ఖనిజాలు ఉపయోగ పడతాయి. ఇదే విధంగా ఖనిజాలలోని $Fe^{2+} + Fe^{3+}$ నిష్పత్తులు ఉపయోగ పడతాయి. అరుదైన ఖనిజాలను వెదకడంలో ఖనిజ సూచికలు ఎక్కువ సహాయ కారులుగా ఉంటాయి.

భూరసాయన సూచికల ఎన్నిక : మూలకాలలో వేటిని మనము భూరసాయన సూచికలుగా ఎన్నుకోవలె అనేది చాలాముఖ్యమైన ప్రశ్న, అన్వేషణ ఏ ఖనిజ నిక్షేపం కోసం సాగుతున్నది? ఈ నిక్షేపం ఏభౌమ్యప్రక్రియ వల్ల ఏర్పడుతుంది? సూచికలుగా ఎన్నుకోవలసిన మూలకాలు నిక్షేపాన్వేషణ జరిప దలచిన శిలలలో ఎంతవరకు కేంద్రీకరింప బడటానికి అవకాశముంది? అనే వాటిమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మొదటి ప్రశ్నకు జవాబు అతిమౌలిక శిలలకు సంబంధించిన ఖనిజ నిక్షేపాలను వెదకేటప్పుడు ఒకరకమైన మూలకాలను, గ్రానైట్ శిలలకు సంబంధించిన ఖనిజ నిక్షేపాలను వెదకేటప్పుడు మరొక రకపు మూలద్రవ్యాలను ఎంచుకోవలె. ఇదేవిధంగా ఇతర భౌమప్రక్రియలవల్ల ఏర్పడిన నిక్షేపాలను వెదకేటప్పుడు ఆయా భౌమప్రక్రియలకు సంబంధించిన మూలకాలనే సూచికలుగా ఎన్నిక చేసుకోవలె. కొన్ని మూలకాలను సహసంబంధీకరించి

అగ్నిశిలలు, అవక్షేపశిలలు వాటినిర్మాణంలో ఏ అంతర్దశకు చెందినవో తనిఖీచేయవచ్చు. ఈవిధమైన విజ్ఞానము ఖనిజనిక్షేపాన్వేషణకు ఎంతో సహాయకారిగా ఉంటుంది.

అగ్నిశిలలోగాని, అవక్షేపశిలలోగాని, రూపాంతరప్రాప్త శిలలలోగాని మూలకాలు కొన్ని భూరసాయన నియమాల ననుసరించి, శిలలు వాతావరణాన్నిబట్టి కేంద్రీకృతమవుతాయి. ఈ శిలలలోని ఖనిజనిక్షేపాలను వెదకేటప్పుడు దిగువ చూపిన కార్యక్రమాన్ని అనుసరించవలె.

1) ఏ ఏమూలకాలు ఎంతెంత పరిమాణాలలో ఉన్నాయో తెలుసుకోవలె.

2) వివిధ మూలకాలు శిలలలో కొన్నికొన్నిచోట్ల ఎక్కువగా లేదా తక్కువగా కేంద్రీకరణ చెంది జరిగి ఉన్నాయో పరిశోధించవలె.

2) ఈ విధమైన మూలకాల కేంద్రీకరణలోని మార్పులు భూనిజాన్వేషణకు సంబంధించినవేమో కనుక్కోవాలి.

శిలలలోని భూనిజ నిక్షేపపు ఉద్భవ ప్రక్రియకు సంబంధించిన మూలకాల పరిమాణాలలో మార్పులు కనిపిస్తుంటాయి. ఈ మార్పులు సాధారణంగా భూనిజనిక్షేపాలకు చేరువలో హెచ్చుగా కనిపిస్తుంటాయి. ఈ విధంగా వివిధ శిలలలో కొన్ని కొన్ని మూలకాలు వాటి సగటు పరిమాణంకంటే హెచ్చుగా గాని తక్కువగా గాని కేంద్రీకరింపబడిఉంటే అటువంటి ప్రదేశాలను “పరివేషాలు” అని అంటారు. హెచ్చుగా ఉన్నవాటిని “ధన పరివేషాలు” తక్కువగా ఉన్నవాటిని “ఋణ పరివేషాలు” అని అంటారు. భూనిజనిక్షేపానికి చుట్టూ కొన్ని మూలకాలు హెచ్చు పరిమాణంలో ఉండి నిక్షేపానికి దూరం హెచ్చవునున్న కొద్ది తగ్గుతుంటాయి. ఈ విధమైన పరివేషాలను “విక్షిప్త పరివేషాలు” అంటారు. ఇవి భూనిజ నిక్షేపాన్వేషణకు చాలా సహాయపడతాయి.

విశేష పరివేషాల ఉనికి, విస్తృత అంశాలు శిలాస్వరూపాన్నిబట్టి, భూనిజ సముదాయాన్నిబట్టి, మూలకాల చలన శక్తిని (mobility) బట్టి ఉంటుంది. చలనశక్తి కొన్ని మూలకాలకు హెచ్చుగాను, మరికొన్నింటికి తక్కువగాను ఉంటుంది. ఉదాహరణకు లెడ్, జింక్, కాపర్ మొదలైన లోహమూలకాల చలన శక్తి బిస్, టంగ్స్టనం చలనశక్తి కన్న హెచ్చుగా ఉంటుంది. ఈవిధమైన చలనశక్తి ఉష్ణజలీయ ప్రక్రియతో ఏర్పడిన భూనిజనిక్షేపాలను వెనకడంలో బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అతిత్వరితగరించి భాష్పశీలమయ్యే (volatile) మూలకాలైన ఆర్గెనిక్, అంటిమోనీ, సెలెనియం, టెలూరియం, మెర్క్యురీ బిస్మత్ ల విక్షిప్త పరివేషాల మరిశోధనలో ఎక్కువ శ్రద్ధమాపవలసి ఉంటుంది.

విక్షిప్త పరివేషాలు రెండురకాలు ప్రాథమిక ప్రక్రియలవల్ల ఏర్పడిన ప్రాథమిక విక్షిప్త పరివేషాలు, అనంతర ప్రక్రియలవల్ల ఏర్పడిన అనంతర విక్షిప్త పరివేషాలు ఈ పరివేషాల సరిహద్దులు అతిధీయ శిల సంఘటనల మీద, భూమిమీద ఆధారపడి ఉంటాయి. భూనిజవృద్ధికి అవసరమైన వడపోత, వినరణ ప్రక్రియలు భూనిజ నిక్షేపాన్ని గుర్తించిన శిలలమీద చాలామీద ఆధారపడి ఉంటాయి. ఉదాహరణకు భూనిజీకృత పరివేషాలను ఆధారంగా చేసుకొని అంతర్భాగంలోని భూనిజ నిక్షేపాల ఉనికి, ఆకృతి, నిర్మితులను అంచనా వేయవచ్చు. విక్షిప్త పరివేషాలు కొన్నిశిలలలో హెచ్చుగాను, మరికొన్నింటిలో తక్కువగాను

ఉన్నట్లు ఏ ఆధారంతో చెప్పవచ్చునో చూద్దాము. ఏదైనా ఒక రకపు శిలలోని లోహ ఖనిజాలు ఒక స్థాయిలో ఒకే తీరుగా విస్తరించి ఉన్నాయి. ఈ విధమైన క్రమ విస్తరింపు చెందిన సాంధ్రీకరణను పృష్ఠభూమి (background) అంటారు. దీనిని ఆధారంగా తీసుకొని మూలకాల విక్షిప్త పరివేషాలను పోల్చవచ్చు. ఈ పృష్ఠభూమి సాంధ్రీకరణ ఒక్కొక్క శిలలో ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు అతిమౌలిక శిలలలోని క్రోమియం పృష్ఠభూమి సాంధ్రీకరణ గ్రానైట్ శిలలలో కన్నుచూపుగా ఉంటుంది. కఠిన శిలలలోని లోహ మూలకాల పృష్ఠభూమి సాంధ్రీకరణ శిలల ఉచ్ఛస్థ సమయంలో ఏర్పడి ఒక స్థానంలో ఒకే పరిమాణంలో ఉంటుంది. మృత్తిక పొరలలోని పృష్ఠభూమి సాంధ్రీకరణ స్థల వాతావరణాన్ని బట్టి కూడా మారుతుంటుంది.

విక్షిప్త పరివేషాలు ప్రాథమికంగా ఏర్పడేటప్పుడు ప్రాథమిక భౌమ ప్రక్రియలవల్ల ఏర్పడి ఆ శిలలతో ఏకకాల జన్మలుగా ఉంటాయి. అనంతర విక్షిప్త పరివేషాలు శిల ఏర్పడిన తరువాతి భౌమ ప్రక్రియలవల్ల ఏర్పడతాయి. ఏదైనా ఒక ఖనిజ నిక్షేపాన్ని వెలికితీస్తున్నప్పుడు ఆ ఖనిజము ఏ రకమైన భౌమ ప్రక్రియలవల్ల ఏర్పడిందో ముందుగా గ్రహించి ఆ భౌమ ప్రక్రియ ఎటువంటి పరివేషాలను ఏర్పరుస్తుందో తెలుసుకొని పరివేషాలను మాన చిత్రీకరణ నిక్షిప్తాన్వేషణ కొనసాగించవలె. ఉత్తరజాత మార్పులవల్ల (Epigenetic Changes) కొన్ని మూలకాలు ఇతర ప్రదేశాల నుంచిగాని, ఇతర ద్రావణాల నుంచిగాని కొనిరాబడవచ్చు. లేదా అదే శిలలో తదనంతర రూపాంతరంవల్ల కేంద్రీకరింప బడవచ్చు.

ఖనిజ నిక్షేపాన్వేషణకోసం ఆధారశిలలను భూరసాయనికంగా పరీక్షించేటప్పుడు ఖనిజనిక్షేపపు మూలకం ఏ ఖనిజాలలో నిబిడికృతమై ఉంటుందో ఆ ఖనిజాలన్నింటిని మానచిత్రణ చేయడం అవసరము. ఆమూలకము ఖనిజీకరణ విసరణస్థితిలో (Dispersed state of Mineralisation) ఉన్నట్లయితే అది ఏ రకాల జన్యమా? లేదా ఉత్తరజాతమా? అనికూడ తెలుసుకోవలె. లోహము ఏ రకాల జన్య-విసరణస్థితిలో (Syngenetic dispersed state) శిలలోని ప్రతిభాగాన్ని ఆక్రమిస్తుంది. ఉత్తరజాతస్థితిలో ఆవిధంగా కాకుండా కొంతమేర పరకు మాత్రమే ఆక్రమిస్తుంది. ఖనిజీకరణలో ఉత్తరజాత విసరణ నిర్మితి అంశాలకు, విరూపణచెందిన మండలాలకు, స్ఫులికు నిరలకు, బ్రెక్చియామండలాలకు చేరువలో ఉంటుంది. ఖనిజీకరణ విసరణ మండలంలోని లోహపు పరిమాణాన్ని

కనుక్కోవడానికి ఆ మండలంలోని అల్పఖనిజీకృత ప్రదేశపు లోహపు విలువను విగ్రహిస్తున్నాము, స్వతంత్రఖనిజాలుగా లోహకేంద్రీకరణ జరిగినచోట్ల ఎగువ హద్దుగాను, గుర్తింపులోకి తీసుకోవాలి. ఈహద్దులు ఒక్కొక్క లోహానికి ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటాయి. ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలోని లోహపు విలువ మామూలు ఖనిజీకరణవిసరణ లోహపు విలువ కంటే హెచ్చుగా ఉన్నట్లయితే దానిని ధనికృత మండలంగా వర్గీకరిస్తాము. ఈ విధంగా ధనికృతమండలము ఉన్నంత మాత్రాన అది ఖనిజోత్పత్తికి లాభదాయకమని భావించడానికి వీలులేదు.

ఖనిజీకృత పాతాళంలో ఉష్ణజలీయ ప్రక్రియ వల్ల ఏర్పడే పరివేషాలు, ఖనిజీకృతపు చుక్కలు, పట్టీలు (bands) ముఖ్యమూలకాల కేంద్రీకరణవల్లనే కాకుండా అనుబంధమూలకాల మూలంగా కూడా ఏర్పడతాయి. ఈవిధంగా పైరైట్ ఆర్సెనోపైరైట్ రోటైట్ క్వార్ట్జ్-కార్బోనేట్ శిలలు, క్లార్కైట్ మొదలైన అనుబంధ ఖనిజాలు ఖనిజనిశేపానికి అన్నివైపులా వెడల్పైన పొడవైన ఖనిజీకృత పట్టీలుగా ఏర్పడతాయి. ఖనిజీకృతప్రదేశాల విస్తరణ ఖనిజీకృత ప్రక్రియస్వభావం మీద ఆధారపడినది నిర్ణయించవలసి, వయస్సు, సమీకరణాలమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ద్రావణాలు చుట్టూకొనిపోయిన కారణంగా ఖనిజీకరణ జరిగినట్లయితే ఖనిజీకృతమండలము ఖనిజీకృతప్రదేశాలలోని విడదాలకు (cracks) దరిదాపులలో ఉంటుంది. విస్తరణ, రసాయన ప్రతిస్థాపన ప్రక్రియల కారణంగా ఖనిజాలు ఏర్పడినట్లయితే అటువంటి ఖనిజనిశేప కేంద్రీకరణ శిలలసంఘటన, వయస్సు, సచ్చిద్రవ (Porosity) ల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. వివిధరీతులుగా అభివృద్ధిచెందిన రసాయన ప్రతిస్థాపన ప్రక్రియల మూలంగా నిశేపాకారము ప్రమరహితంగా ఉండి ఒక గూడువలె ఉంటుంది. విస్తరణ ప్రక్రియ ప్రధానంగా ఉన్నచోట్ల క్వార్ట్జ్ జైట్ శిలలు సిలికాఫెంట్ శిలలు (Silicified Rocks) ఈ ప్రక్రియకు అవరోధాలుగా ఉంటాయి. దీనికి వ్యతిరేకంగా ఇసుకరాయి, టుఫ్ మొదలైన శిలలు విస్తరణకు మరింత సహాయకారులుగా ఉంటాయి. విస్తరణ ప్రక్రియ ఖనిజ నిశేపానికి ఇరువైపులా కొంత మేరవరకు చాలా ఎత్తుగా కనిపిస్తుంది. ఈ విస్తరణ నిశేపపు పొడవుతక్కుం వైపు హెచ్చుగా ఉండి లంబమాన కుచ్చంవైపున తక్కువగా ఉంటుంది. బీటలు బారిన క్వార్ట్జ్ జైట్ శిలలు, ముక్కలుగా చీలిపోయిన ఇతర శిలలలోని దట్టమైన భాగాలు లోహ సంబంధ ద్రావణాలతో నింపబడి ఉంటాయి. ఇటువంటి చోట్ల విస్తరణకు అవకాశము ఉండదు. కార్బోనేట్ శిలలలో విస్తరణ ఆ శిలల సచ్చి

ద్రవ మీద రసాయన ప్రతిస్థాపన ప్రక్రియకు గల అవకాశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కార్బోనేట్ శిలలలోని విదరాలలో లోహ ధాతు ద్రావణాలు ఎక్కువగా నిక్షేపణ చెందుతాయి. కాబట్టి ఈ శిలలలో వినరణ తక్కువగా ఉంటుంది. సచ్చిద్రవ హెచ్చుగా ఉన్న గ్రానైట్, దాని కుటుంబానికి చెందిన ఇతర శిలలలో వినరణ ప్రక్రియ హెచ్చుగా కనిపిస్తుంది. అదే విధంగా ఇనక రాయిలో కూడా వినరణ హెచ్చుగా ఉంటుంది. అతిమౌలిక శిలులు వినరణ ప్రక్రియకు అనుకూలంగా ఉండవు. వివిధ కాలైన శిలా ధర్మాలను బట్టి వినరణ చెందిన భవిష్య నిక్షేప స్వరూపాలలో భేదాలు ఉంటాయి.

అవక్షేప శిలులు - లోహ కేంద్రీకరణ

అవక్షేప శిలలతో ఏక కాల జన్యాలయిన భవిష్య నిక్షేపాలు కేంద్రీకరణ జరగడం వూర్తిగా అవక్షేపం లక్షణాలమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. భవిష్య నిక్షేప కేంద్రీకరణకు యాంత్రికాంశాలే (mechanical factors) కాకుండా, రసాయన, జీవ జన్య అంశాలు కూడా కారణాలు. ఈ విధంగా అవక్షేప శిలలలో భవిష్య నిక్షేపాలు యాంత్రికంగాను, రసాయనికంగాను, జీవ రసాయనికంగాను కేంద్రీకరింప బడతాయి. కేంద్రీకరింప బడిన భవిష్య నిక్షేప స్వరూప, స్వభావాలు ప్రప్రథమంగా అవక్షేప శిలా పదార్థము ఏ అగ్ని శిలులు శిథిలం కావడం వల్ల వచ్చిందో ఆ అగ్ని శిలు స్వరూప, స్వభావం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అవక్షేప శిలలలో భవిష్య నిక్షేపాన్వేషణ జరిపించేవిప్పుడు మనము వెదక బోయే భవిష్యము యాంత్రిక కేంద్రీకరణ? లేదా రసాయనిక కేంద్రీకరణ? లేదా జీవ రసాయనిక కేంద్రీకరణ అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవలె. ఉదాహరణకు క్రోమైట్ గాని, మోనజైట్ గాని, ఇల్మానైట్ గాని మన లక్ష్యమైనప్పుడు పీట్రో-యాంత్రిక ప్రక్రియల వల్ల ఏర్పడిన శిలా స్థావరాలలో వెదకవలె. సల్ఫర్, మాంగనీస్, ఐరన్-పిటి కోసం రసాయనిక ప్రక్రియలవల్ల ఏర్పడిన శిలా స్థావరాలలో గాని జీవ రసాయనిక ప్రక్రియల వల్ల ఏర్పడిన శిలా స్థావరాలలో గాని అన్వేషణ కొనసాగించవలె.

ఆధార శిలులు - నిక్షేపాన్వేషణ

ఆధార శిలలలో నిక్షేపాన్వేషణ రెండు విధాలుగా ఉంటుంది. ఆధార శిలులు బహిర్గతమైనప్పుడు చేసే భవిష్యాన్వేషణ మొదటిది. ఆధార శిలా బహిర్గతాలు లేనప్పుడు చేసేవి రెండవది. ఆధార శిలా ప్రాంతాలలో భూరసాయన-నిక్షేప

పాస్త్రాక్షణ చాలా విజయవంతమైన ఫలితాల నిస్తుంది. ఆధార శిలలలో అన్నేషించే ఖనిజ స్వరూపాన్ని బట్టి భూరసాయన సూచికలను ఎన్నుకోవలె. అన్నేషించే ఖనిజము ఆధార శిలలలో ఏ రీతిగా విస్తరణ చెందడానికి అవకాశముందో ఊహించుకొని దానికి తగిన విధంగా అన్నేషణ పద్ధతిని నిర్ణయించుకోవలె. ఆధార శిలలలో ఏకకాల జన్మ నిక్షేపాలు, రూపాంతరం చెందిన నిక్షేపాలు, ఉష్ణ జలీయ నిక్షేపాలు ఉంటాయి. వీటిలో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క విధమైన భూరసాయన నిక్షేపాన్నేషణ పద్ధతిని అవలంబించవలె. ఏ పద్ధతి అవలంబించవలసి వచ్చినా అది చాలా శాస్త్రోక్తంగా ఉంచవలెనని మనము గుర్తుంచుకోవలె.

ఆధార శిలులు ఏర్పడిన తరువాత అవి అనేక భౌమ ప్రక్రియలకు లోనై వివిధ మార్పులు చెందుతాయి. ఈ మార్పుల వల్ల వీటిలో ఉన్న ఖనిజ నిక్షేపాలు కూడా మార్పులు చెందుతాయి. భూరసాయన సర్వేక్షణ ప్రారంభించే ముందు ఆధార శిలులు, వాటిలోని నిక్షేపాలు ఎటువంటి భౌమ ప్రక్రియలవల్ల మార్పులు చెందినాయో పరీక్షించి తెలుసుకోవడం చాలా అవసరము. ఉపరితల భౌమ ప్రక్రియల వల్ల ఆధార శిలలలోని కొన్ని లోహాల పరిమాణంలో మార్పులు సంభవిస్తాయి. కొన్ని లోహాల పరిమాణము హెచ్చవుతుంది. మరి కొన్ని లోహాల పరిమాణము తగ్గుతుంది. రసాయనిక నిరోధక శక్తి హెచ్చుగా ఉన్న కొన్ని లోహాల పరిమాణంలో ఏ మూత్రం మార్పు ఉండదు. బహిర్గతాల లయన ఆధార శిలలలో ఏ లోహ ముయో మిగిలిన వాటితో పోల్చి నప్పుడు కొంత హెచ్చు పరిమాణంలో ఉంటే అటువంటి ఆధార శిల భూరసాయన ఖనిజ నిక్షేపాన్నేషణకు వీలయినవిగా గుర్తించవలె. ఉపరి తలపు మాంగనీస్ పటలంలోని లెడ్ పరిమాణము, అక్సి కరణ చెందిన శిలలలోని కాపర్ కార్బోనేట్ మచ్చలు మేలైతే అజురైట్ ల వల్ల ఏర్పడిన మచ్చలు), భూ రసాయన సూచికలుగా ఉపయోగపడతాయి.

ఆధార శిలలలో ఖనిజ నిక్షేపాలు కేంద్రీకృతమైనప్పుడు ఖనిజనిక్షేపాలలోని ముఖ్యలోహము, దానికి అనుబంధించి ఉన్న మిగిలిన లోహాల పరిమాణాలు నిక్షేపానికి మారము హెచ్చవుతున్న కొద్దీ తగ్గుతుంటాయి. నిక్షేపంలోగాని దీనిని కేంద్రీకరించుకొన్న ఆధారశిలలలోగాని నిక్షేపపు కేంద్రీకరణ తరవాత జరిగిన భౌమ ప్రక్రియల వల్ల సంభవించే మార్పులను బట్టి ఈ భూ రసాయనిక పరివేషంలో కూడా మార్పు వస్తుంది. అటువంటి మార్పులు లేకపోతే ఖనిజ కేంద్రీకరణ సమయంలో ఏ విధంగా ఉందో అదే మాదిరిగా ఉండిపోతుంది.

తదనంతర భౌమ్య ప్రక్రియల వల్ల మార్పులు వచ్చినదీ లేనిదీ పరీక్షించి ఈ భూ రసాయనిక పరివేషాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. భౌమ ప్రక్రియల వల్ల మార్పులు సంభవించి ఉంటే దానికి తగిన విధంగా సవరణలు చేసుకోవాలి.

ప్రాథమిక భౌమ ప్రక్రియల సందర్భంలో జరిగే లోహ విస్తరణ విస్తరణ ప్రక్రియను (Diffusin Process) పోలి ఉంటుంది. భూ రసాయనిక పరివేషాలు ఏ జన్యాలయినా కావచ్చును ; లేదా ఉత్తర జన్యాలయినా కావచ్చును. ఏక జన్యాలయినప్పటికీ పరివేషాల విస్తరణ నిక్షేపం పరిమాణాన్నిబట్టి, నిక్షేపం కేంద్రీకరణ సమయంలో గల ఉష్ణోగ్రతను బట్టి, లోహ ధర్మాలను బట్టి ఉంటుంది. ఉత్తర జన్య భూ రసాయనిక పరివేషాలు ఈ పైన చెప్పిన పరిస్థితుల మీదనే కాక ఆతిథేయ శిలల భౌతిక, రసాయనిక ధర్మాలను బట్టి, కూడా ఉంటుంది. ఖనిజ కేంద్రీకరణ సమయంలో ద్రవ రూపంలో ఉన్న లోహాలు విస్తరణ చెందే దూరము ఖనిజ ద్రావణంలోని ఈ లోహాల నిష్పత్తి పైన మాత్రమే ఆధారపడి ఉండదు. కొన్ని పరిస్థితులలో ఖనిజ ద్రావణంలోని ముఖ్య లోహాల కన్న అనుబంధ లోహాలు ఎక్కువ దూరంగా విస్తరణ చెందుతాయి. ముఖ్య లోహాల నిక్షేపాస్వేషణ సమయంలో అనుబంధలోహ మూల ద్రవ్యాల పరివేషాలు కూడా ఎంతో ఉపకరిస్తాయి. ఏ ఏ ముఖ్య లోహాలకు ఏ ఏ లోహాలు అనుబంధాలుగా ఉంటాయో భూ రసాయనిక విజ్ఞానం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. లెడ్, జింక్ ఖనిజ నిక్షేప ప్రాంతాలలో లెడ్ల మాదిరిగానే మాంగనీస్, బేరియమ్ కూడా సిల్వర్ నిక్షేప ప్రాంతాలలో ఆర్సెనిక్, జింక్ ఎక్కువ దూరం విస్తరణ చెందుతాయి.

ఉత్తరజన్య వాతావరణ పరిస్థితులలో వివిధ లోహాలు వివిధ రీతులలో రవాణా చేయబడి విస్తరణ చెందుతాయని ఇంతకు ముందే తెలుసు కొన్నాము. లోహ సమృద్ధుల ద్రావణీయతను బట్టి, ఈ విస్తరణ దూరము ఆధారపడి ఉంటుంది. లోహ విస్తరణ అక్షీకరణ క్రియలో ఏర్పడిన సంయోగ పదార్థాల మీదా, విస్తరణ కావించే ద్రావణపు సంఘటన మీదా ఆధారపడి ఉంటుంది. జింక్ లోహము సల్ఫేట్ గా మారితే అది ఎక్కువ దూరం విస్తరింప బడటానికి అవకాశ ముంటుంది. అదే జింక్ సల్ఫేట్ కార్బానిక్ ఆసిడ్ యానకం ద్వారా విస్తరించ బడినప్పుడు తక్కువ దూరం విస్తరణ చెందుతుంది. దీనికి విరుద్ధమైనది లెడ్ సల్ఫేట్. దీని ద్రావణీయత తక్కువ కాబట్టి ఎక్కువ దూరం రవాణా

చేయబడును. సిల్వర్ విషయం చూసినట్లయితే అది సల్ఫేట్ గా మారినప్పుడు హెచ్చు మారం విస్తరించ బడుతుంది. సిల్వర్ కార్బోనేట్ ద్రావణీయత తక్కువ కావడం వల్ల కార్బోనేట్ గా మారిన సిల్వర్ ఎక్కువ మారం విస్తరణ చెందదు. ఆర్కినేడ్ గాను, క్లోరైడ్ గాను మారిన సిల్వర్ చాలా తక్కువగా విస్తరణ చెందు తుంది. కాపర్ నిక్షేప ప్రాంతాలలో గాని, లేదా కాపర్ కలిసి ఉన్న ఇతర లోహ నిక్షేప ప్రాంతాలలో గాని నీరి, ఆకుపచ్చ రంగు మచ్చలు ఉపరితలం మీద కనిపిస్తాయి. కాపర్ లోహము కార్బోనేట్ గా మారినందు వల్ల ఈ రకపు మచ్చలు వచ్చినవి. కార్బోనేట్ గా మారిన కాపర్ యొక్క ద్రావణీయత చాలా తక్కువ కాబట్టి ఈ పదార్థము ప్రకృతి జలంలో ద్రావణీయమై ప్రవేశించక ఆద్రావణీయపరిష్టంగా మచ్చలుగా ఏర్పడుతుంది. ఈ విధమైన లోహ నమ్మేళనాలు విస్తరణ చెందకుండా అవశేషపరిష్టాలుగా నిక్షేపం సామీప్యంలో నిలిచి పోవడం వల్ల మనము నిక్షేపం ఉనికిని సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. జింక్ కాపర్, ఇటువంటి అవశేషాలుగా సున్నపురాతి ప్రాంతాలలో కనిపిస్తుంటాయి.

ఆధారశిలలో నిక్షేప కేంద్రీకరణ ఉపరితలం వరకు ఉన్నప్పుడు, అటువంటి నిక్షేపము ఉత్తర జన్య భౌమ ప్రక్రియలకు లోనైనప్పుడు ద్వైగుణీకృత ఘనిజ కేంద్రీకరణ జరిగిన పరివేషాలు ఉపరితలం మీదనే సాధారణంగా కనిపిస్తాయి. అట్లా కాకుండా ఆధారశిలలో ఘనిజ కేంద్రీకరణ లోతైన స్థానాలలో సంభవించినప్పుడు ఘనిజ విస్తరణ ఉపరితలం మీద చాలా కొద్దిగా ఉంటుంది. ఈ రెండు సందర్భాలలోనూ భూరసాయనిక నిక్షేపాన్వేషణ చాలా సులువైనది. ఆధారశిలలోని పరివేషాలు ప్రాథమిక పరివేషాలా? లేదా అనంతర పరివేషాలా? అని ముందుగానే తెలుసుకొని వాటికి తగిన సవరణలను చేసుకోవలెనని ఇంతకుముందే చెప్పడంజరిగింది. ప్రాథమిక పరివేషాలను పరిక్షించేప్పుడు ముఖ్యంగా శిల సంఘటన శిలలోని వివిధ భౌతిక, రసాయన మార్పులను దృష్ట్యా ఉంచుకొని వాటికి తగిన సవరణలను చేసుకోవలె. కింద అటువంటి కొన్ని సందర్భాలను పొందు పరచడం జరిగింది.

1. మాగ్మాటిక్ అంగ విభజన వల్ల ఘనిజ నిక్షేప కేంద్రీకరణ జరిగినప్పుడు భూరసాయనిక పరివేషాలను అగ్ని శిలలో మాత్రమే పరిక్షించవలె. ఏ సందర్భంలోనయినా ఇటువంటి అగ్ని శిల మరొక శిలలోకి (అగ్ని శిల గాని అవశేష శిల గాని లేదా రూపాంతర శిల గాని) చొచ్చుకొని ఉన్నప్పుడు,

మాత్రమే ఈ పరివేషాల ప్రభావము మిగిలిన శిలలకు కూడా వర్తిస్తుంది. అటువంటి సందర్భాలలో పరివేషాలను ఖనిజ కేంద్రీకరణ జరిగిన అన్ని శిలలలోనే కాకుండా చుట్టూ ఉన్న శిలలలో కూడా పరీక్షించవలె.

2. ఖనిజము పైన వివరించబడినట్లు ఏక జన్యం కాకుండా ఉత్తర జన్యమైనట్లయితే (అంటే ఉత్తరజన్య ప్రక్రియల వల్ల ఆధారశిలలలో ఏర్పడినట్లయితే) భూరసాయనిక పరివేషాలను ఆ స్థానంలోని అన్ని శిలలలోనూ పరీక్షించవలె.

అనంతర భూరసాయనిక పరివేషాలను పరీక్షించేప్పుడు శిల సంఘటననే కాకుండా ఉపరితలం మీద ఎటువంటి ఉత్తరజాత భౌమ ప్రక్రియలకు అవకాశముంది? అనే విషయం మీద దృష్టిని కేంద్రీకరించవలె. ఇదికాక శిలలలోని భ్రంశాలు, వళులు, వగుళ్ళు, సందానాలు - వీటిని కూడా పరీక్షించి అనంతర పరివేషాలమీద వీటి ప్రభావము ఏ విధంగా ఉంటుందో బాగా గమనించి అప్పుడు పరివేషాలను అర్థం చేసుకోవలె. ఉపరితలం మీద విదరా లేర్పడినట్లయితే అవి ఖనిజ కేంద్రీకరణకు చాలా అనువుగా ఉంటాయి. ఆక్సీకరణ జరగడానికి, అనంతర భూరసాయనిక పరివేషాలేర్పడటానికి వాతావరణ పరిస్థితుల ప్రాబల్యము చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అతి శీతల హిమానీనద ప్రాంతాలలో ఆక్సీకరణకు అవకాశాలు చాలా తక్కువ కాబట్టి ఇటువంటి ప్రదేశాలలో అనంతర పరివేషాలు ఎంతో దూరానికి విస్తరణ చెందవు. తేమ ప్రదేశాలలో ఆక్సీకరణకు ఎక్కువ అవకాశాలుండటం వల్లనూ, ఆమ్ల జనిత సమ్మేళనాలు నీటిలో కరిగి ద్రావణ రూపంగా చాలా దూరాలకు రవాణా చేయబడటం వల్లనూ ఖనిజ కేంద్రీకృత స్థానాలలో అటువంటి లోహ పదార్థాలు లోపిస్తాయి. సులభ ద్రావణీయాలు గాని ఆక్సైడ్లు, మరి ఇతర ఆమ్ల జనిత సంయోగ పదార్థాలు అవక్షేపావశిష్టాలుగా ఖనిజీకృత స్థావరం వద్దనే నిలిచి పోతాయి. ఈ విధంగా నిలిచిపోయిన ఖనిజ సంయోగ పదార్థాలు భూరసాయనిక నిక్షేపాన్వేషణకు ఎంతో సహాయకారులుగా ఉంటాయి. ఈ విధమైన సూచికలలో ఐరన్, మాంగనీస్ ఆక్సైడ్లు, హైడ్రాక్సైడ్లు, కాపర్ కార్బోనేట్లు, కోబాల్ట్, నికెల్ సమ్మేళనాలు ముఖ్యమైనవి. వర్షపాతము మితంగా ఉండి వాతావరణంలో తేమ హెచ్చుగా ఉన్నట్లయితే ఆక్సీకరణం చెందిన లోహములు ఎక్కువ దూరము రవాణా చేయబడక ఖనిజ నిక్షేప కేంద్రానికి దగ్గరలోనే కేంద్రీకరింప బడ

తాయి. వృషాతము అమితంగా ఉన్న చోట్ల ద్రావణీయత హెచ్చుగా ఉన్న లోహ సమ్మేళనాలు ప్రకృతి జలాల ద్వారా చాలా మారం వరకు రవాణా చేయబడతాయి. ఆ విధంగా రవాణా చేయబడిన పదార్థాల మూలంగానే జల భూవిజ్ఞాన రసాయనిక నిక్షేపాన్వేషణకు పీలు పడుతుంది.

ఆవక్షేప శిలలు - భూరసాయనిక నిక్షేపాన్వేషణ.

ఆవక్షేప శిలలు కూడా ఆధారశిలలుగా ఉండవచ్చునని ఇంతకు ముందే చెప్పడం జరిగింది. ఆవక్షేప శిలలలో భూరసాయనిక నిక్షేపాన్వేషణ మిగిలిన శిలలలో కన్న కొంచెం కష్టతరమైనది. ఈ శిలలలో భూరసాయనిక పద్ధతిలో నిక్షేపాన్వేషణ జరిపే ముందు వివిధ ఆవక్షేప శిలల ఉత్పత్తి ప్రారంభ దశ నుంచి తుది దశ వరకు సంభవించే భూరసాయనిక మార్పులను అర్థం చేసుకోవాలి. షేల్ శిలలలో నిక్షేపాన్వేషణ పద్ధతి, క్వార్ట్జైట్ లలోని పద్ధతి, అవశిష్ట నిక్షేపాలలోని పద్ధతి ఎంతో భిన్నంగా ఉంటాయి. షేల్, క్వార్ట్జైట్, ఇనకరాయి, సిలికామిత సున్నపు రాయి మొదలైన ఆధారశిలలలో నిక్షేపాన్వేషణకు భూనిజ సంబంధ పరీక్షలు, భూరసాయనిక పరీక్షలు కూడా జరిపించవలె. భూనిజ సంబంధ పరీక్షలు శిలా సంఘటన, రేణు పరిమాణము, ముఖ్య లోహాలు ఏరేలు పరిమాణంలో కేంద్రీకృతమవుతున్నవి అనే అంశాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇటువంటి పరిస్థితులలో భూరసాయనిక పద్ధతులు వదార విశ్లేషణకు మూత్రం పరిమితమై ఉంటాయి. ఆవక్షేప శిలలలో ఐరన్, మాంగనీస్, అల్యూమినియమ్, ట్రైటానియమ్ మరియు కొన్ని అనుబంధ లోహాలను విశ్లేషణం పద్ధతులతో కనుక్కొని భూనిజ సంబంధ, భూరసాయనిక సంబంధ విలువలతో నిక్షేపాన్వేషణ చేయవచ్చు. ఆవక్షేప శిలలలో విశ్లేషణ చేయవలసిన లోహమూలకాలు మూడు రకాలు. అవి : (1) నిక్షేపపు కేంద్రీకరణకు కావలసిన ముఖ్యలోహాలు : ఐరన్, మాంగనీస్, అల్యూమినియమ్, ట్రైటానియమ్ మొదలైనవి ; (2) ఆవక్షేప శిలల ఉత్పత్తి స్థానాన్ని తెలియజేసేవి : ఔలియమ్, లిథియమ్, జిర్కొనియమ్, కావర్, జింక్, లెడ్, నికెల్, కోబాల్ట్ మొదలైనవి ; (3) ఆవక్షేప శిలల ఉద్భవంలో ఏర్పడిన మూలకాలు : ఫాస్ఫరస్ వెనెడియమ్, అర్సెనిక్, నికెల్, మాంగనీస్, జింక్ మొదలైనవి.

రూపాంతర ప్రాప్త శిలలు—నిక్షేపాన్వేషణ

రూపాంతర ప్రాప్త శిలలలో నిక్షేపాన్వేషణ ప్రారంభించే ముందు ఆ శిలలలో మూల ద్రవ్యాలు ఏ రూపాంతర ప్రాప్త దశలో ఏ విధంగా పరిణామం

చెందుతాయో తుష్టంగా తెలుసుకోవలె. రూపాంతర ప్రాప్త శిలలు సంఘటనను బట్టి, అవి ఏర్పడిన ఉష్ణోగ్రత, పీడనలను బట్టిస్టేట్, క్వార్ట్జైట్, సున్నపు రాంబు, పాలరాంబు, క్విట్స్, గ్రైస్ మొదలైన వానిగా విభజితమైనాయని పాఠకులకు తెలిసినదే. క్విట్స్, గ్రైస్ లలో సంఘటన అనేక విధాలుగా మారుతుంది. ఈ శిలల సంఘటనను బట్టి, అవి ఏర్పడిన రూపాంతర ప్రాప్తి పరిస్థితులను బట్టి, ఈ శిలలలో ఏ మూలకాలు కేంద్రీకరింప బడటానికి వీలుగా ఉందో భూమిసాయనికంగా ముందే తెలుసుకోవలె.

ప్రాథమిక చర్యల వల్ల శిలలలో గుర్త పరచబడిన మూలకాలు శిలలు రూపాంతర ప్రాప్తి చెందే సమయాలలో రసాయనిక మార్పు చెందిగాని చెందకుండా గాని ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి రవాణా చేయబడతాయి. తక్కువ ఉష్ణోగ్రతవద్ద రూపాంతర ప్రాప్తి చెందిన శిలలలోని ముఖ్య మూలకాలలోగాని, ఆను బంధ మూలకాలలో గాని, మార్పు ఉండదు. ఉష్ణోగ్రత పీడనలు హెచ్చుగా ఉన్న పరిస్థితులలో రూపాంతర ప్రాప్తి చెందే శిలలలోని మూలకాలకు కవచ ఏర్పడి రసాయనికంగా మార్పులు చెంది స్థాన ప్రదేశం చెందుతాయి. శిలలు రూపాంతర ప్రాప్తి చెందేటప్పుడు రసాయన ప్రతి స్థాపక మార్పులన్నట్లయితే శిలలలోని ముఖ్య, ఆనుబంధ మూలకాలలో చాలా మార్పులు కనిపిస్తాయి. వీటి చలన శక్తి కూడా హెచ్చయి ఒకచోటి నుంచి మరొకచోటికి రవాణా అవుతాయి. ఈ చలనశక్తి రూపాంతర ప్రాప్తి సమయంలో ఉన్న చర్యలను బట్టి ఉంటుంది. ఇది కాకుండా రసాయనిక ప్రతిస్థాపన క్రియవల్ల నూతన మూలకాలు, కొన్ని ద్రావణాలు శిలాంతర్భాగానికి చేర్చ బడతాయి. ఈ విధంగా చేరిన మూలకాలు, ద్రావణాలు శిలలలో కొన్ని రసాయనిక మార్పులను కలిగించి మూలకాల చలన శక్తిని బలపరుచింప జేస్తాయి. ఈ కారణంగా శిలలు రసాయనిక ప్రతి స్థాపన క్రియతో కూడిన రూపాంతర ప్రాప్తి పొందిన సందర్భాలలో భూరసాయనిక నిక్షేపాన్వేషణ జరిపించేటప్పుడు వైన పేర్కొన్న వాటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని అన్వేషణ కొనసాగించవలె.

బహిష్కృతాలు లేని ప్రదేశాలలో నిక్షేపాన్వేషణ

బహిష్కృత శిలలు లేనట్టి ప్రదేశాలు మూడు విధాలని చెప్పకోవచ్చు. క్వార్టరరీ నిక్షేపాలతో గాని, ఇటీవలి నిక్షేపాలతో గాని కప్పబడి ఉన్న ప్రదేశము ; అవశేష శిలలతో కప్పబడిన ప్రదేశము లేదా అనిజము అవశేష శిల

లలో నిబిడికృతమై ఉన్న నందర్బాలు. (3) అగ్నిశిల, రూపాంతర ప్రాప్తశిల-ఆధారశిలలు బహిర్గతము గానట్టి నందర్బాలు వీటిని కింద వివరించినాము.

(1) వదులైన (unconsolidated) శిలా పదార్థాలతో కప్పబడిన పదే శాలలో ఖనిజ నిక్షేపాలు ఎక్కువ లోతులో ఉండని పక్షాన భూరసాయనిక పద్ధతుల ద్వారా అన్వేషణ సాగించ వచ్చు. ఖనిజ నిక్షేపము 10 మీటర్ల కన్న హెచ్చు లోతులో ఉన్నట్లయితే ఖద్రూ రంధ్రాల ద్వారా పదార్థాన్ని పరీక్ష చేసి తరువాత నిక్షేపాన్వేషణ కొనసాగించవలె. కాని ఇది అంత లాభదాయకం కాదు. ఉపరితలాన్ని కప్పి ఉన్న శిలా పదార్థము ఏ వాతావరణ పరిస్థితులలో ఏర్పడిందో తెలుసుకొని భూరసాయనిక పద్ధతులతో బాటు భూభౌతిక శాస్త్ర పద్ధతులు, జల రసాయనిక పద్ధతులు, అవసరమైతే భూవృక్ష శాస్త్ర పద్ధతులు ఉపయోగించి నిక్షేపాన్వేషణ కొనసాగించ వలె. అయస్కాంత పద్ధతుల ద్వారా మేగ్నెటైట్, నికెల్, క్రోమియమ్, బ్రెటానియమ్, ఖనిజాల ఉనికిని తెలుసుకోవచ్చు. జల రసాయనిక పద్ధతులను ఉపయోగించి ముఖ్య మూలకాలనే కాకుండా అనుబంధ మూలకాలను కూడా అన్వేషించ వలె. కొన్ని నందర్బాలలో ఎయిర్ సర్వేక్షణ, వృక్ష సంబంధ సర్వేక్షణల కలయికవల్ల వృక్షాలలో కప్పబడిన ప్రాంతాలలోని శిలలను, వాటి నిర్మితిని అవగాహన చేసుకోవచ్చు.

(2) అవక్షేప శిలలలో నిబిడి కృతమై ఉన్న ఖనిజ నిక్షేపాలను వెదకడానికి భూ రసాయనిక మాన చిత్రాలను తయారు చేసి వీటి ద్వారా ఏ ఏ ప్రాంతాలలో ఎటువంటి అవక్షేప శిలలున్నాయో తెలుసుకొని వాటి రేణు పరిమాణ మాన చిత్రాల ద్వారా నిక్షేపాన్వేషణ జరిపించవచ్చు. బహిర్గత శిలలు మృత్త కతో కప్పబడి ఉన్న ప్రాంతాలలో నిక్షేపాన్వేషణ భూరసాయనిక పరివేషాల పరీక్షద్వారా జరుగుతుంది. ప్రాథమిక పరివేషాల ప్రసక్తే ఇక్కడ లేనందు వల్ల సర్వేక్షణ అనంతర పరివేషాల పైననే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ అనంతర పరివేషాలు ఏర్పడటానికి, విస్తరించడానికి కొన్ని అనుకూల పరిస్థితులు కావలెనని ఇది వరలో తెలుసుకొన్నాము. ముఖ్యంగా అనంతర పరివేషాలు ఏర్పడటం ఆధార శిల ఎంత వరకు శైథిల్య క్రియకు అనుకూలమైనది అనే విషయం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. శైథిల్య క్రియా నిరోధక శక్తి హెచ్చుగా ఉన్న అతిమౌలిక అగ్ని శిలలలో ఈ అనంతర పరివేషాలు ఏర్పడటానికి, విస్తరణ చెందడానికి చాలా కాలం పడుతుంది. శైథిల్య క్రియకు ఎక్కువ అను

కూలంగా ఉన్న సున్నపురాయి, ఇసుకరాయి, ప్లీస్ట్, గ్రానైట్ మొదలైనవి ఆధార శిలలుగా ఉన్న ప్రాంతాలలో ఈ అనంతర పరివేషాలు ఏర్పడటానికి, విస్తరణ చెందడానికి చాలా తక్కువ వ్యవధి కావలసి ఉంటుంది.

(3) బహిర్గత శిలలు లేని ప్రదేశాలలో దృఢీ భవనం చెందని రేణువుల కింద దాగి ఉన్న భూమి శిలా విన్యాసాలేమిటో ఉపరితలం మీద ఉన్న రేణువుల పరీక్ష ద్వారా కొంత తెలుసుకోవచ్చు. ఆ శిలా విన్యాసాలేమిటో తెలుసుకోవలసిన అవశ్యకత కలిగి నప్పుడు భూభౌతిక పద్ధతుల ద్వారా ఆ శిలా విన్యాసాల నమ్మకనీయమేమిటో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అనంతర శిలా పదార్థాల చేత కప్పబడిన శిలా విన్యాసాలను గురించి ఈ విధంగా సేకరించిన విజ్ఞానం ఆధారంగా చేసుకొని ఏ నిశ్చేపాలను వెదకడానికి ఉపక్రమించవలెనో ముందుగా తెలుసుకొని దానికి తగినట్లుగా ముఖ్యమైన మూలకాల, అనుబంధ మూలకాల పరివేషాలను నిర్ణయించ వలె.

నిర్మితి అంశాలు (Structural Factors)

నిశ్చేపాన్వేషణ : నిర్మితి అంశాలు చాలా సందర్భాలలో నిశ్చేపపు కేంద్రీకరణకు ఉపకరిస్తాయని మనము ఇప్పటికే తెలుసుకొన్నాము. అనంతర పరివేషాల విస్తరణ మీద నిర్మితి అంశాల ప్రభావము చాలా హెచ్చుగా ఉంటుంది. ఈ నిర్మితి అంశాల విదాలు, విదర సిరలు, భ్రంశాలు, భ్రంశ మండలాలు, ఖనిజీకరణ మండలాలు, వివిధ రకాలైన సిరలు మొదలైనవి ముఖ్యమైనవి. అనంతర పరివేషాల విస్తరణకివి నిరోధకాలుగా ఉన్న కారణాల చాలా సందర్భాలలో ముఖ్యమైన, అనుబంధ మూలకాలు ఈ నిర్మితుల కొక పక్క కేంద్రీకరించ బడతాయి. ఖనిజీకరణ మండలాలున్న ప్రదేశాలలో ముఖ్య ఖనిజ నిశ్చేపపు భూరసాయనిక పరివేషాలకు ఖనిజీకరణ మండల పరివేషాలు కూడా చేర్చబడతాయి. రసక ఇటువంటి సందర్భాలలో పరివేషాలను గుర్తించి విస్తరించేటప్పుడు పరివేషాల మీద ప్రభావం చూపే అంశాలను కూడా చర్చలోకి తీసుకోవలె. నిర్మితుల వద్ద పరివేషాలను చాలా శ్రద్ధగా పరిశీలించి అర్థం చేసుకోవలె.

బహిర్గతాలు లేని చోట్ల ఖనిజ నిశ్చేపాలు ఉష్ణ జలీయ ప్రక్రియల వలన అనంతర ప్రక్రియల వల్ల మార్పులు చెందినట్లుంటే అటువంటి పరివర్తన మండలాల" (Zones alteration) భూరసాయనిక మార్పుల సహాయంతో నిశ్చే

పాన్వేషణ గావించవచ్చు. ఐనిజ నిక్షేపము ఉపరి తలానికి తక్కువ లోతులో ఉన్నట్లయితే భూరసాయనిక, ఐనిజ సంబంధ సూచనలు హెచ్చుగా ఉంటాయి. లోతు హెచ్చయ్యే కొద్దీ ఇటువంటి సూచనలు తగ్గతూ ఉంటాయి. ఉష్ణజలీయ ప్రక్రియల వల్ల కలిగే మార్పులు నిక్షేపానికి చాలా దూరంగా కూడా ఉంటాయి. ఎందు వల్లనంటే ఉష్ణజలీయ ద్రావణాలు భూ అంతర్భాగం నుండి రవాణా చేయబడి నిక్షేపకేంద్రం మీదుగా ఉపరి తలానికి వచ్చేటప్పుడు నిక్షేపంలోని కొన్ని ముఖ్యమైన మరియు అనుబంధ మూలకాలను ఉపరి తలానికి చేర పేసే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ. అనంతర ప్రక్రియలవల్ల నిక్షేపపు కేంద్రం నుంచి వక్క భాగాలకు దిగువ భాగాలకు మాత్రమే ఈ విధమైన రవాణాకు అవకాశాలున్నాయి. నిక్షేపం మీద ఉష్ణజలీయ ద్రావణాల ప్రభావమున్నట్లయితే అవి భూరసాయనిక నిక్షేపాన్వేషణకు ఎక్కువగా తోడ్పడుతుంది. నిక్షేపపు కేంద్రాలు బహిర్గతాలయినా, కాకపోయినా ఇటువంటి ఉష్ణజలీయ భూరసాయనిక పరీక్ష వల్ల ఐనిజ నిక్షేపం ఉనికిని తసుక్కోవచ్చు. కయొలిన్ జేషన్, నెరిసిటైజేషన్, ఎపిగైజేషన్, క్లోరిటైజేషన్ మొదలైన ప్రక్రియలు ఉష్ణజలీయ శ్రావణాల వల్ల సంభవించేవే. ఈ ప్రక్రియల వల్ల వచ్చిన మార్పులను కూడా భూరసాయనిక ప్రభావ మండలంగా పరిగణించ వచ్చు.

ఉష్ణజల జనిత నిక్షేపాన్వేషణ సంస్కారాలలో పరివేషాలను నిర్ణయించే టప్పుడు పరివేషాల మీద ప్రభావం చూపే నిర్మిత, ఉపరితల జనిత ఆక్సీకరణ మార్పులు, ఉష్ణజల దశలు, నిక్షేపంలోని ప్రాథమిక మండలీ కరణ (primary zoning) ఆధారిత శీలం ఉనికి, వాటి ప్రత్యేక ధర్మాలు క్రమశ్చయ తలపు స్థానాలను గురించి మనము తెలుసుకో వలె. (Positions of Erosion Surface)

బహిర్గతాలు లేని ప్రదేశాలలో నిక్షేపాన్వేషణ ప్రారంభించే ముందు నిక్షేపంలో మొట్ట మొదట ఏర్పడిన మండలీ కరణకు (zoning) చాలా ప్రాధాన్యమివ్వవలె. ఈ విధమైన మండలీ కరణాలు సల్ఫర్ నిక్షేపాలలో కనిపిస్తుంటాయి, కావర్ నిక్షేపాలన్న కొన్ని ప్రదేశాలలో దిగువ నుంచి పై భాగానికి ఈ దిగువ నూలించిన మండలీ కరణను గుర్తించ వచ్చు. (1) కావర్ ఖనిజీ కరణ, (2) జింక్ లెడల్ సమ్మేళనము (3) బెరైట్-లెడ్ ఖనిజీ కరణ, (4) సిల్వర్ ఖనిజీ కరణ, (5) బెరైట్ ఖనిజీ కరణ. ఈ మండలీ కరణ కావర్ నిక్షేపం కేంద్రం నుంచి వక్కలకు, పై భాగాలకూ వ్యాపిస్తుంది. ఉపరి తలం మీది

భూరసాయనిక పరివేషాలను గురించి పరిశోధించేటప్పుడు ఇటువంటి మండలి కరణాలను దృష్టిలో ఉంచుకొన్నట్లయితే పరివేషాల విస్తరణను గురించి నిశ్చితమైన అభిప్రాయాలను ఏర్పరచుకోవచ్చు. మండలి కరణాలను దృష్టిలో పెట్టుకొనే పక్షంలో పరివేషాలు ఆధారంగా చేసిన వివరణలు తప్పు దారి తీస్తాయి. కొన్ని చోట్ల కావర్ నిక్షేపం కేంద్ర మండలానికి ఆసుకొని బైరెట్-పిర్సైజెట్ ఖనిజ మండలము, దాని తరువాత కార్నెట్ గాని బైరెట్ గాని లేదా రెండూ గాని ఉంటాయి కొన్ని మండలి కరణాలలో చిట్టచివరి దశలో క్వార్ట్జ్ కూడా ఏర్పడుతుంది. ఇటువంటి మండలి కరణను గుర్తించి మైనురు (కర్ణాటక) రాష్ట్రంలోని ఇంగల్ థాల్ (చిత్రదుర్గ జిల్లా) వద్ద ఉన్న కావర్ నిక్షేపాల ఉనికిని కనుక్కన్నారు. మొనబోసీ (బీహారు) వద్ద ఉన్న కావర్ నిక్షేపాలలో కయోలిన్ జేషన్, క్లోరిటైజేషన్, మొదలైన వాటిని భూరసాయనిక సూచికలుగా ఎన్నుకోవచ్చునని ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలోని భూవిజ్ఞాన శాస్త్ర విభాగంలో పనిచేస్తున్న డాక్టరు కె. కామేశ్వర రావు గారి పరిశోధనల ద్వారా తెలిసింది.

ఖనిజ నిక్షేపము అనేకదశలలో ఏర్పడుతుంది. ప్రతిదశలోను ఖనిజ నిక్షేప ప్రక్రియతో కొన్నికొన్ని లోహమూలకాలు సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. ఒక్కొక్కదశలో ఖనిజనిక్షేపపు ద్రావణాలనుంచి ఖనిజాలు, ఖనిజేతల వదార్థాలు ఘనీభవించేటప్పుడు ఈ లోహమూలకాలుకూడా ఆ సమయాలలో కొన్ని ఖనిజాలలో చొచ్చుకొనిపోయి ఘనీభవిస్తాయి. కనుక నిక్షేపాస్తోషణకు ముందు ఏ లోహ మూలకాలు ఏ ఖనిజ నిక్షేప ప్రక్రియదశకు చెందినవో వివరణచేసుకొని ఏమూలకాలు ఖనిజ నిక్షేపంలోబాటు ఘనీభవనం చెందినవో కనుక్కోవాలి. ఇటువంటి మూలకాల పరివేషాలను పరిశీలించి, అవగాహన చేసుకొని, అనలైన నిక్షేపము ఏక్కడ కేంద్రీకృతమై ఉందో తెలుసుకోవచ్చు.

భూరసాయనిక పరివేషాలను పరిశీలించేటప్పుడు లోహఖనిజాలతో నన్ని పాతంగా ఉన్న మూలకాల పరివేషాల మీదదృష్టి కేంద్రీకరించవలె. ఎందువల్ల నంటే లోహఖనిజాలతో నన్నిపాతంగా ఉన్న మూలకాలే ఎక్కువ విజయవంతమైన ఫలితాల నిస్తాయి. ఖనిజనిక్షేపం ఏర్పడేదశలో ఏమి మూలకాలుంటాయో తెలుసుకొని వాటి పరివేషాలను గురించి పరిశోధనలు సాగిస్తే నిక్షేపఉనికి మనకు త్వరగా తెలుస్తుంది. ఈ మూలకాలలో కొన్ని నిక్షేపపు కేంద్రీకరణకు పూర్వానివే, మరికొన్ని నిక్షేపపు కేంద్రీకరణకు అనంతరమైనవి. కొన్ని నిక్షేపపు కేంద్రీకరణ

కాలానికి చెందినవి. కొన్నికొన్ని సందర్భాలలో ఒకేఒక మూలకము వివిధదశలలో వివిధసమ్మేళనాలలో ఉంటుంది, ఉదాహరణకు: కాపర్, ఆర్సెనిక్, కాపర్, బిస్మత్ ఆర్సెనిక్, కాపర్, సిల్వర్, కాపర్, బిస్మత్, జింక్, ఆర్సెనిక్ 'కాపర్'. మొత్తము మొదలైనవి భూరసాయనిక పరివేషాన్ని గురించి వివరణ జరిగేటప్పుడు వైన చెప్పిన సంఘటనల వంటివి దృష్టిలో ఉంచుకోవలె.

నిశ్చేపపు కుష్మాలు లోహప్రవర్తన

ఋణిజనిశ్చేపము ఉపరితలంపై బహిర్గతం కాకుండా లోతుగా ఉన్నప్పుడు నిశ్చేపం ఉనికి నిశ్చేపంయొక్క లంబరూప కుశ్యంలోను, పాదకుశ్యంలోను వివక్షగా తెలుస్తుంది. ఋణిజనిశ్చేపం ఏర్పడే సమయంలో ఋణిజద్రావణాలనుంచి వెలువడిన లోహాలు, వివిధ మూలద్రవ్యాలతో సమ్మిశ్రితమైన వాయువులు నిశ్చేపం స్థానానికి ఎగువగా ఉన్న శిశుపదార్థాలలోకి చొచ్చుకొని పోతాయి. ఈ శిలలు కేంద్రాన్నితమి ఉండి ప్రతిస్థాపనక్రియకు అనుకూలమై ఉన్నట్లయితే నిశ్చేపం నుంచి వెలువడేవాయి, ద్రవస్వరూపాలు శిలలలో ఆనుగుణమైన మార్పులు తెస్తాయి. ఈ మార్పులు భౌతికం కావచ్చు; రసాయనికం కావచ్చు; లేదా రెండూ కావచ్చు. ఈ విధంగా మార్పులను తెచ్చే మూలకాలు, ద్రావణాలు నిశ్చేపపు మూలకాలు కాకుండా ఋణిజకరణ ద్రావణాలలో వృద్ధిపొందుతూ నిశ్చేపంనుంచి వెలుగుచివబడిన వాయురూప ద్రవరూప పదార్థాలైనా కావచ్చును. ఋణిజనిశ్చేపం ఏర్పడేటప్పుడు ఋణిజద్రావణాల నుంచి వైకి వెళ్లబదార్థాలలో మెర్క్యూరీ, ఆర్సెనిక్, ఆంటిమోని, బిస్మత్, సిల్వర్, సెలినియమ్, టెటారియమ్ మొదలైన ఋణిజ మూలకాలే కాకుండా ఫ్లోరీన్, బోరాన్, కాల్షియం, ఆక్సైడ్, హైడ్రోజన్ నల్ఫైడ్, సిలికా, బేరియమ్ స్ట్రోంషియం కూడా ఉంటాయి. ఈ విధంగా నిశ్చేపం కేంద్రం నుంచి ద్రవ, వాయుపదార్థాలు బయటకు వచ్చేటప్పుడు లంబరూప కుశ్యంలోని శిలలలో కొన్ని ఋణిజపదార్థాలు ఘనీభవించడానికి అవకాశాలున్నాయి. ఇవి కాకుండా ఉష్ణజలీయ ద్రావణాలవల్ల రలిగే మార్పులు ఈ శిలలలో కనిపించ వచ్చు. ఉపరితలం మీద ఋణిజపదార్థాల గుర్తులు, లేదా ఉష్ణజలీయ మార్పులు కనిపించినట్లయితే అటువంటి ప్రదేశాలలో భూరసాయనిక నిశ్చేపాన్వేషణ ప్రారంభించవచ్చు.

ఋణిజనిశ్చేపం ఏర్పడేటప్పుడు వెలువడే ద్రవ, వాయురూప పదార్థాలు నిశ్చేపం కేంద్రంనుంచి ఎగువకు, పక్కలకు ఎంతదూరం ప్రవాహించే బడతాయి.

అనేది ఆయాపదార్థాల చలనశక్తి మీద రవాణాకు పీలుగాఉండే శిల సచ్చిద్రవ మీదా పదార్థాలు బయటకు విడుదల చేసేటప్పుడు వాటికున్న వీడన, ఉష్ణోగ్రతల మీదా ఆధారపడి ఉంటుంది. కేవలం చలనశక్తి తారతమ్యాలవల్ల ఒకేకేంద్రం నుంచి వెలువడే ద్రవ, వాయురూపపదార్థాలు రవాణాచేయబడే దూరాలలో మూర్ఖులుంటాయి. అంతర్వేశ నిక్షేపాలలో (Inclusion Ores) ఆర్సెనిక్, మోలిబ్డెనమ్, నిక్షేపానికి ఎగువ 170 మీటర్ల వరకు, సిల్వర్ 190 మీటర్ల వరకు బిస్మత్ జింక్ 225 మీటర్ల వరకు, బేరియమ్, లెడ్ 65 మీటర్ల వరకు, కావర్ 100 మీటర్ల వరకు రవాణాచేయబడతాయి. ముద్దరూపంలో ఉన్న నిక్షేపపు కేంద్రాలలో లెడ్, బేరియమ్ కావర్ ధాతువులు నిక్షేపానికి ఎగువగా 5 మీటర్లు దాటవు. జింక్, బిస్మత్, ఆర్సెనిక్ 210 మీటర్ల వరకు ఎగువకు రవాణాచేయబడతాయి. నిక్షేపానికి దిగువభాగంలో ఆర్సెనిక్ ఉండక పోవడం గమనించవలసిన విషయము నిక్షేపం కేంద్రాన్ని కప్పిఉన్న శిలా పదార్థము ఎక్కువ రంధ్రాలతో ఉన్నట్లయితే యిలాహ్ మూలకాలు చాలా హెచ్చు దూరం వరకు రవాణాచేయబడతాయి. అదేకాకుండా రంధ్రాన్నిత శిలాపదార్థాలలో ముఖ్య, అనుబంధ ఖనిజాలు కొద్దిమేరకు నిక్షేపితం అవుతాయి. రంధ్రాన్నిత శిలాపదార్థాలద్వారానే కాకుండా ఒకదానికొకటి అనుబంధంగాఉన్న (connected) విదరాల ద్వారాను, నిక్షేపాలచే నింపబడిన విదరాలద్వారా ఖనిజద్రావణాలు రవాణాచేయబడతాయి. వినరణ ప్రక్రియ మూలంగా కూడా మూలకాలు రవాణా చేయబడతాయి. దీనివల్ల కలిగే రవాణా ఖనిజనిక్షేపానికి దగ్గరలోనే జరుగుతుంది కాని దూరంగా మూత్రంకాదు. ద్రావణ, వాయురూపంలో నుంచి పరివేషాల నేర్పరిచే ముఖ్య, అనుబంధ మూలకాలు వినరణ ప్రక్రియలకన్న విదరపూరితమై రంధ్రాన్నితమై ఉన్న శిలలలో హెచ్చుదూరం వ్యాప్తి చెందుతాయి. భూరసాయనిక పద్ధతులలో నిక్షేపాన్నేషణ జరిపించేటప్పుడు విదరాలు, రంధ్రాలు, ఎక్కువగా ఉన్న శిలలలో పరివేషాలను హెచ్చుదూరం వరకు పరిశోధించవలె ఖనిజనిక్షేపం కేంద్రం నుంచి వ్యాపించే ద్రవ, వాయురూప మూలపదార్థాలు శిలాంతర్యాగంలోని రంధ్రాలలో మనీభవిస్తాయి ఇదికాకుండా శిలలలో అంతకుముందున్న ఖనిజాలతో ఈ మూలపదార్థాలు కలుస్తాయి. ఈ విధంగా సర్పైడ్, అస్సినైడ్, ఖనిజాలలోను, పైరైట్ లోను కొన్నిముఖ్యమైన అనుబంధ మూలకాలు కేంద్రీకరించబడి ఉంటాయి. అందువల్ల నిక్షేపాన్నేషణ సమయంలో ఖనిజాలలోఉన్న మూలకాలను గుర్తించి

వాటి పరిమాణాలలోని హద్దులను పరిశీలించడం ఒక ముఖ్యమైన అంశము. వినయ ప్రక్రియవల్ల మూలకాలు చాలా తక్కువదూరం వ్యాపిస్తాయి. ప్రాథమిక పరివేషాలున్నట్లయితే అవి నిక్షేపాన్వేషణకు అంత సహాయకారులుగా ఉండవు. విదరాలు హెచ్చుగా ఉన్న శిలలలో ఖనిజీకృతస్థానము (area of Mineralisation) చాలా హెచ్చుదూరం వరకు ఉంటుంది. భూసాంస్యనిక పరివేషాలలోని నిక్షేపాలు విదరాలు, సంక్రమిత శిల తగ్గుహెచ్చుతో సహజాంతరంగా ఉంటాయి.

ఐహార్గకాలు లేని ప్రదేశాలు-నిక్షేపాలకు సూచికలు

లోహాలతో కూడిన శిలారీతులు దగ్గర దగ్గరగానే ఉన్నట్లయితే ఆప్రాంతం లోకొంత లోతున నిక్షేపాలు కేంద్రీకృతమై ఉన్నట్లు భావించవచ్చు. ఈ లోహాలలో ముఖ్యంగా సూచికలుగా పనికివచ్చేవి సిల్వర్, జింక్, లెడ్, బిస్మత్, కాపర్, మెర్క్యురీ మొదలైనవి. గోల్డ్ సిల్వర్ల నిక్షేపాల కొన్ని స్వల్పముతలవైరెట్ నిక్షేపాలలో హెచ్చుగా ఉంటుంది. బేరియమ్ మెర్క్యురీ చాలా రకాలయిన నిక్షేపాలకు సూచికలుగా పనికివస్తాయి. కనకభూసాంస్యనిక సర్వేక్షణలో ఈరెండింటి పరిమాణాలలోని హెచ్చుతగ్గులు జాగ్రత్తగా పరిశీలించవలె. బేరియమ్, మెర్క్యురీ పరివేషాల మీద సోవియట్ యూనియన్ లో చాలా పరిశోధనలు జరిపినారు. బేరియమ్ కు మెర్క్యురీకి అంతర సంబంధముందని సోవియట్ శాస్త్రజ్ఞులు కనుక్కొన్నారు మెర్క్యురీ చలనము ద్రావణరూపంలో యుక్తంగాను, సల్ఫైడ్ ఆక్సీకరణ మంచలంలో భాష్పీకరణ వలనూ కలుగుతుంది. భాష్పీకరణము చెందిన మెర్క్యురీ ఐరన్ మాంగనీస్ హైడ్రాక్సైడ్ లతో పొందుపరుపబడుతుంది. ఆక్సీకరణమండలంలో ఐరన్ సల్ఫైడ్ ఉంటే మెర్క్యురీ చలనము రెండింతలవుతుంది. పాదరసపు పరివేషము చాలారకాలైన నిక్షేపాలనుట్టా ఏర్పడుతుంది. ఇదే విధంగా సైడెరైట్ సింగ్ ఉనికిని కనుక్కువడానికి మాంగనీస్ పరివేషాలు ఉపయోగపడతాయి. మాంగనీస్ పరివేషాలు ఇటువంటి సందర్భాలలో 100 మీటర్ల వరకు వ్యాపిస్తాయి రెడ్-జింక్ సైడెరైట్ నిరలను వెదికేటప్పుడు కూడా ఈ మాంగనీస్ పరివేషాలు ఉపయోగంగా ఉంటాయి.

ఐహార్గకాలు లేని ప్రదేశాలలో భూసాంస్యనిక సర్వేక్షణ ప్రారంభించడానికి ముచ్చటపడే విధంగా సేకరించవలెననేది ముందుగానే నిశితంగా పరిశీలించి ఒక నిర్ణీతాభిప్రాయానికిరావలె. సర్వేక్షణలోని ఫలితాలన్నీ ఈ సమూహాలు సేకరించే వద్దతిమీద ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుంది. సమూహాలు సేకరించేటప్పుడు

ఆ ప్రదేశంలోని భూస్వరూప నిర్మితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని అనంతర వరి వేషాలమీద ఈ నిర్మితుల ప్రభావము ఎట్లా ఉంటుందో అర్థం చేసుకొని సముదాయన సేకరించవలె.

భూరసాయనిక సర్వేక్షణ సహాయంతో ఖనిజాల విశ్లేషణము (dispersion), వాటి కేంద్రీకరణ ఎక్కడెక్కడ సంభవించడానికి అవకాశముందో తెలుసుకోవచ్చు. అంత మాత్రం చేత ఆయా ప్రదేశాలలో తప్పకుండా ఖనిజ నిక్షేపాలుంటాయని మనము ఊహించ కూడదు. భూరసాయనిక సర్వేక్షణతో బాటు నిర్మితి సర్వేక్షణ, భూసర్వేక్షణ కలవీనట్లయితే నిక్షేపాలు ఎక్కడ కేంద్రీకృతమై ఉన్నవో తెలుసుకోగలము. అంతకు ముందే విశదమై ఉన్న నిక్షేపం కేంద్రపు అవిచ్ఛిన్నతను, విస్తృతిని కనుక్కోవడానికి భూరసాయనిక సర్వేక్షణ చాలా అనుకూలము. బహిర్గతాలు లేని ప్రదేశాలలో వివిధ మూలకాల చలనాన్ని, (ప్రవాహాలను వివిధభాగాలకు), ప్రవర్తనను నూచించే భూరసాయనిక మాన చిత్రాలను (Maps) ముందుగానే తయారు చేసుకొని స్థానపు నిర్మితులు అశ్రు విజ్ఞాన రూపు రేఖల దృష్ట్యా ఈ మూలకాల ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉందో అర్థం చేసుకొన్నట్లయితే నిక్షేపాన్వేషణను సరిగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. బహిర్గతాలు లేని చోట్ల భూ సర్వేక్షణ, నిర్మితి సర్వేక్షణలకు అవకాశం లేదు. కాబట్టి అటు వంటి చోట, గోతులు తీసి శిలా స్వరూపాలను తెలుసుకొని భౌమమాన చిత్రాలను, నిర్మితి మాన చిత్రాలను తయారు చేసుకొని భూరసాయనిక సర్వేక్షణ జరవడం వల్ల నత్పలితాలు త్వరితంగా లభిస్తాయి. ఇటువంటి చోట్ల భౌమ వృక్ష శాస్త్ర నూచికలు కూడా చాలా సహాయ కారులుగా ఉంటాయి. ఈ ప్రదేశాలలో శిలా స్వరూపాలను తెలుసుకోవడానికి భూ భౌతిక పద్ధతులలోని అయస్కాంత వర్ధతిని, విద్యుత్ పద్ధతిని ఉపయోగించుకోవచ్చు. భూరసాయనిక సర్వేక్షణ ద్వారా విక్షిప్త వ్యవస్థలో ఉన్న (dispersed state) ఖనిజీ కృత స్థానాలను మాత్రమే కనుక్కోవడం వల్ల అంత లాభం ఉండదు. ధనికృత (enriched) ఖనిజ కేంద్రాలను కనిపెట్టినప్పుడే సర్వేక్షణ లాభసాటి కాగలదు. విక్షిప్త వ్యవస్థగాని, ధనికృత వ్యవస్థగాని సరిగా ఖనిజీ కృత కేంద్రాలకు ప్రభాగంలోను, వక్రాలలోను, ఉంటుందను కోవడం పొరపాటు. ఈ వ్యవస్థలు ఖనిజ నిక్షేపాలకు కొన్ని మీటర్లల దూరంలో ఉండవచ్చు. ఈ వ్యవస్థలు ఎక్కడ ఏర్పడతాయి. అనేది ఖనిజ సేవేవపు స్వరూపాన్ని బట్టి, దాని స్థాయి (pitch) ని బట్టి, ఆవిధేయ శిలలతో ఖనిజ రాశి స్వరూపం బట్టి, ఏయే రకం

వివరాల విస్తరణను బట్టి, ఉంటుంది. ఉపరితలం మీద కనబడే ఖనిజీ కరణ మండలాన్ని అంతర్భాగపు ఖనిజ నిక్షేపానికి సూచనగా తీసుకొని అసలైన నిక్షేపం ఎక్కడ ఉందో మిగిలిన సర్వేక్షణల ద్వారా తెలుసుకోవలె.

ఖనిజాలు లేని ప్రదేశాలలో నిక్షేపంతో బాటు ఈ విగ్రహ సూచించిన ప్రక్రియలకు కూడా శ్రద్ధ వహించవలె.

ఖనిజ నిక్షేపానికి సమీపంలో సంభవించిన మార్పులు : ఆల్ఫైట్రైజేషన్, క్లోరిట్రైజేషన్, సెరిసిట్రైజేషన్, సినిసిఫికేషన్, హోలోమిట్రైజేషన్, కాల్క్లైట్రైజేషన్, బెరైట్రైజేషన్ మొదలైన మార్పులు సంభవించిన శిలలలో నిక్షేపపు మూలకాలనే కాకుండా కొన్ని సందర్భాలలో ఆర్సెనిక్, ఆంటిమోని, మెర్క్యురీ, బేరియమ్, స్ట్రోంషియమ్, బరన్, బూంగస్టన్ మొదలైన వాటి కోసం కూడా శిలల నమూనాలను పరీక్షించవలె.

(2) నిక్షేపం ప్రాంతంలో నిర్మితి పరిశోధనలు, విరూప కారక సంచలనాలు (విదరాలు, అవసరి అట్రాక్షిఫాలు, తిర్యక్ వక్రాలు మొదలైనవి)

(3) ఖనిజీకృత స్థావరాల వద్ద, డైక్లు, స్పర్శల వద్ద ఖనిజ-శిలా పరిశీలనాత్మక పరిశోధనలు.

(4) ఖనిజీకృత స్థావరాల వద్ద ఉన్న శిలలలో రసాయనిక మార్పులు.

ఖనిజపు మూలకాలతో సహాసంబంధమున్న మూలకాలు ఉపరితలంమీద సూచకలుగా కనబడితే అంతర్భాగంలో ఖనిజ నిక్షేపాలు ఉన్నాయనడానికి నిర్ణయము. ఇటువంటి సందర్భాలలో ఈ సహసంబంధ మూలకాలు ఏ ఏ ఖనిజాలలో ఇమిడి ఉన్నాయో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యము. ఏ ప్రాంతంలో అయితే నిక్షేపాన్వేషణ జరపడానికి నిశ్చయించుకున్నామో ఆ ప్రాంతపు శిలా విన్యాసాలకు తుల్యమై, నిక్షేపం ఉనికి తెలిసి ఉన్న మరొక ప్రాంతంలోని అంతర్భాగపు శిలల నమూనాలను విశ్లేషించి ఆ ఫలితాలను అన్వేషణ జరిగే ప్రాంతంతో పోల్చి చూడటం నిక్షేపాన్వేషణకు చాలా సహాయంగా ఉంటుంది. బోరు హోల్స్ లను తవ్వి, అందులోని మూలకాల మార్పులు, పరిమాణాలు సూచించే రసాయనిక భేదాన్ని (geochemical section) తయారు చేసుకోవలె. ఇదే భేదంలో అన్ని రకాలైన వివరాలనూ సూచించవలె. "బోరు హోల్స్" లలో సేకరించిన విషయాల నన్నింటినీ సమకూర్చుకొని అన్వేషణ సాగించే ప్రాంతానికి ఒక భారసాయనిక పార్ఫైల్ రేఖాకృతి (geochemical profile)ని

తయారు చేసుకోవాలి. ఈ పార్శ్వ రేఖాకృతులతో అశ్మవిజ్ఞాన, విరూప కారక సాక్ష్యాలను జోడించి పరిశీలించినట్లయితే నిక్షేపాన్వేషణ సాగించడానికి వటిష్టమైన ప్రమాణాలు (criteria) లభిస్తాయి ఇంతే కాకుండా నిక్షేపాలు అంతర్భాగంలో ఏ విధంగా మూర్తులు చెందుతాయో తెలు తెల్లమవుతుంది. భూరసాయనిక మాన చిత్రాలను (Geochemical Maps) బోరు హోల్ పార్శ్వ రేఖాకృతులతోను (Bore hole Profiles), నిర్మిత మాన చిత్రాలతోను (Structural Maps) కలిపి పరిశీలించినట్లయితే ఖనిజ నిక్షేపం ఉపరితలం నుంచి అంతర్భాగంలోనికి ఏ విధమైన రీతిలో ఉందో సులభంగా అవగాహన చేసుకోవచ్చు.

అదృఢీభూత పదార్థాలు (Unconsolidated Materials)-

లోహ కేంద్రీకరణ వినరణ పరివేషాలు,

ఆధారశిలలలో ఏక జన్యాలయిన ఖనిజ మండలాలున్న ప్రదేశాలను ఖనిజీకృత మండలాలని అంటారు. ఆధార శిలలలో నిక్షేపాలు కేంద్రీకృతమైనప్పుడు నిక్షేపం చుట్టూ ఆధార శిలలలో కొంతమేర వరకు ఖనిజీకరణ కనిపిస్తుంది. ఈ విధంగా ఆధార శిలలలో నిక్షేపానికి నలుదెసలా వ్యాప్తి చెందిన ఖనిజ మండలాన్ని “వినరణ పరివేషము” అంటారు. అక్షీకరణ చెంది, శిలాకృతులను కోల్పోయి వదులైన మృత్తిక పదార్థంతో కప్పబడిన ప్రాంతాలలో నిక్షేపం కేంద్రం చుట్టూ నిక్షేపానికి చెందిన ముఖ్య మూలకాలు, అనుబంధ మూలకాలు వినరణజేంది పరివేషాలేర్పడతాయి. పీఠిని కూడా “వినరణ పరివేష” అంటారు. ఆధారశిలలలోని వినరణ పరివేషాలకూ వదులైన మృత్తికపదార్థాలలోని పరివేషాలకూ తేడా కనిపించేవిధంగా మొదట చెప్పినవాటిని ఖనిజీకృతమండలాలని చెప్పుకోవచ్చు. అప్పుడు వదులైన మృత్తికపదార్థాలలో పరివేషాలు మాత్రం “వినరణ పరివేష” లవుతాయి. ఆధారశిలలలోని ఖనిజీకృత మండలాలు ప్రాథమిక ప్రక్రియవల్ల మాత్రమే ఏర్పడతాయి, మృత్తిక పోరలలో ఏర్పడిన పరివేషాలు ప్రాథమిక ప్రక్రియవల్ల ఏర్పడిన తరవాత అనంతర ప్రక్రియవల్ల వివిధమూర్తులుచెంది. “అనంతర పరివేషాలుగా” రూపొందుతాయి. ఈ విధమైన అనంతర పరివేషాలమీద ప్రాంతీయ వాతావరణము, శిలారీతులు, నైసర్గిక స్వరూపాల ప్రభావము చాలామటుకు ఉంటుంది. ఈ కారకాల నన్నింటినీ భూరసాయనిక భూవృశ్యము (Geochemical landscape) అనిచెప్పుకోవచ్చు.

విసరణ పరివేషాలు-కారకాలు-ప్రక్రియలు

1. ప్రవృత్తమంగా విసరణ పరివేషాలు ఏర్పడటానికి ప్రాథమిక ప్రక్రియలవల్ల ఏర్పడిన నిక్షేపంలో ఏవోహేమాలుకము ఎంతెంత పరిమాణంలో ఉన్నదో అనేది మూలాధారము. ఆధారశిలలలో కేంద్రీకృతమై ఉన్న ఖనిజనిక్షేపంతో అనుబంధించిఉన్న మూలకాలు ఆధారశిలలతోబాటు నిక్షేపంకూడా శైథిల్యం చెందినప్పుడు ద్రావణ రూపంలోనూ, మరి ఇతరరూపాలలోను నిక్షేపానికి నాలుగు నైపులా విసరణ చెందుతాయి. ఈ విధంగా ఈ మూలకాల పరివేషాలేర్పడతాయి.

2. ఆధారశిలలు, వాటిలోని నిక్షేపాలు రసాయనికంగా మార్పులు చెందడానికి వీలైన ఉత్తరకత కారకాలు (కార్బానిక్ ఆసిడ్, ఆక్సిజన్, వ్యూత సముదాయము మొదలైనవి.)

3. ప్రాంతీయ వాతావరణము, నై నర్గికస్వరూపము వీటివల్ల శైథిల్య ప్రక్రియలో అనేకమార్పులు వస్తాయి.

4. జలభౌమిక వాతావరణము శైథిల్యంచెందే నిక్షేపాలమీద శైథిల్య క్రియానంతరం నిక్షేపంనుంచి, ఆధారశిలలనుంచి విడుదలచేసిన వివిధ మూలకాల రవాణామీద చాలాపెచ్చుప్రభావము చూపుతుంది,

5. శైథిల్యస్థాయి. శైథిల్యక్రియానంతరం శిలావదార్థము ఎంతవరకు పటుత్వంతప్పి దారుఢ్యాన్ని కోల్పోయిందో దానిమీదకూడా పరివేషాలేర్పడే ప్రక్రియ ఆధారపడి ఉంటుంది.

6. నిక్షేపంలోను, ఆ తిథేయ ఆధారశిలలలోను ఉన్న ముఖ్యమూలకాల, అనుబంధమూలకాల చలనశక్తి, ఈ చలనశక్తి జలద్రావణస్థితిలో ఒక విధంగాను ఇతరద్రావణస్థితులలో మరిఒక విధంగాను ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఆర్గానిక్ పదార్థాలతో కలిసినప్పుడున్న చలనశక్తి అది లేనప్పుడున్నదానికి భిన్నంగా ఉంటుంది.

7. ద్రావణస్థితిలో చలనంలో ఉన్నపరివేషాలు ఏర్పరచే ముఖ్యమూలకాలను, అనుబంధమూలకాలను ద్రావణస్థితినుంచి అవక్షేపస్థితికి తీసుకొనిరాగల రసాయనిక పదార్థాల ఉనికి పరివేషాల తీరుతెన్నులమీద చాలా ప్రభావంకలిగి ఉంటుంది. నిక్షేపంలోగాని, ఆధారశిలతోగాని సున్నపురాయి మొదలైనవి అనుబంధంగా ఉన్నట్లయితే మూలకాలుపెచ్చుదూరం రవాణాచేయజడకుండా సున్నపురాయి సహాయంతో అవక్షేపాలవుతాయి.

8. ఎత్తువల్లాలు, లోయలు, వాలులు మొదలైన భౌమరూపురేఖలు (features) పరివేషాలేర్పడటం మీదను, అవి విసరణ చెందడం మీదను హెచ్చు ప్రభావం కలిగి ఉంటాయి.

9. శైథిల్యం చెందిన శిలావదార్థంలోని సున్నితవిభాగం సంఘటన: పరివేషాలేర్పరిచే మూలకాలు రవాణాచేయబడినప్పుడు శైథిల్యశిలావదార్థంలోని మరికొన్ని మూలకాలతో రసాయన సంయోగం చెందే అవకాశాలు శిలావదార్థం సున్నితంగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఇదీకాక పదార్థము ఎంత శోషణసామర్థ్యం కలిగి ఉంటుందో దానిమీదకూడా పరివేషాలు ఆధారపడిఉంటాయి.

10. నిక్షేపాన్ని, నిక్షేపంఉన్న ఆధారశిలను కప్పిఉన్న శైథిల్యశిలా వదార్థపు మందము, సంఘటన ఏర్పడినతీరు ఈ పరివేషాలు ఏర్పడటంమీద, విసరణ చెందడం మీద హెచ్చుప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి.

ఈ వైకారకాలను బట్టి పరివేషాలు ఏర్పడటానికి అనువైన ప్రక్రియలలో చాలాభేదాలుంటాయి. ఈ పరివేషాలేర్పడటానికి ముఖ్యమైన ప్రక్రియలను కింద ఉదహరించడం జరిగింది.

(1) నూతన పురాతన శైథిల్య ప్రక్రియలు

(2) ద్రావణాలను వృక్షసంపత్తి పీల్చేవేయడం

(3) భూమిమీద మృత్తికపొరలలోని నీరుకేశనాశికా చర్య (Capillary action) వల్ల ఉపరితలం మీదకు రవాణాచేయబడి సూర్యరశ్మి ప్రభావంతో ఆవిరిరూపం దాల్చడం.

(4) నిక్షేపాలలోని నల్లైడ్ భవిజాలు అవ్లజనీకరణం చెందడం. కొన్నిలోహాలు హెచ్చువేలెన్నీ స్థితిలోకి ఆక్సీకరణచెందడం కొన్నిలోహమూలకాలు హెచ్చు సంయోజక స్థితిలో ఎక్కువ ద్రావణీయత కలిగి ఉంటాయి. అందువల్ల హెచ్చుసంయోజక స్థితిలోఉన్న ఈ లోహాలు ఎక్కువదూరం రవాణాఅవుతాయి. ఈ తెగకు చెందిన లోహాలు టైటానియమ్, వెనెడియమ్, ఫాస్ఫరస్ మొదలైనవి. హెచ్చుసంయోజక స్థితిలోకి లోహమూలకాల చలనశక్తి హెచ్చుగాఉండి పరివేషాలు నిక్షేపాలకు చాలాదూరంగా కూడా ఏర్పడటానికి అవకాశముంది.

(5) యాత్రికంగాను, వాయుసహాయంతోను భూమ్యాకర్షణ వల్లను శైథిల్య శిలావదార్థాలు రవాణా చేయబడుతుంటాయి, ఈవిధంగా పరివేషాలు నిక్షేపానికి

ఎక్కువ దూరంలో ఏర్పడుతుంటాయి. రసాయనిక నిరోధక శక్తి హెచ్చుగా ఉన్న ఋణిజాలు మాత్రమే ఈ విధంగా పరివేషాలను ఏర్పరుస్తాయి. ఉ: క్రోమైట్, మాగ్నెటైట్, ఇల్మినైట్, జిర్కాన్, రూటైల్, కానిటరైట్, మోనజైట్ మొదలైనవి.

(6) విడరాలద్వారా మరియు ఇతర మార్గల ద్వారా లోహద్రావణాలు అంత ర్భృష్ట జలతలాన్ని (Ground water table) చేరుకొని అక్కడనుంచి అంత ర్భాగ ఉపరితల జలమార్గాలద్వారా అనేకచోట్లకు విస్తరణ చెందుతాయి.

(7) చలనస్థితిలో ఉన్న లోహద్రావణాలు విరూపణ చెందని తాజా శిలల తోను శైథిల్యావస్థలో ఉన్న శిలలతోను అంతర్భృష్ట సుషేవపు సమూహంతోను రసాయనికంగా ప్రతిక్రియ చెంది విస్తరణ పరివేషాలను ఏర్పరుస్తాయి.

(8) శోషణ (Sorption) విశోషణ (Desorption) ప్రక్రియలవల్ల లోహఆర్గానిక్ (Metal organic) సంయోగపదార్థాలు తయారవుతాయి. వీటివల్ల లోహాల చలనశక్తి హెచ్చవుతుంది.

(9) అవశేషప్రక్రియ, స్కందన (coagulation) ప్రక్రియలవల్ల పరివేషాల దూరము నిరీతమవుతుంది.

(10) లోహ, లోహేతర ద్రావణాలు అనేకవిధాలుగా విస్తరణ చెందుతాయి.

శైథిల్యము అనంతరపరివేశాలు

అనంతర భూరసాయనిక పరివేషాలేర్పడటానికి ముఖ్యంగా శైథిల్యప్రక్రియ మూలకారణమని మనకు తెలిసినదే. ఈ శైథిల్య ప్రక్రియలో అన్ని ఋణిజాలు ఒకే రీతిగా శిథిలం చెందవని కూడా మనకు తెలుసు. శైథిల్యక్రియా నిరోధకాలైన ఋణిజాలు యధారూపంలో భౌతిక శక్తుల సహాయంతో చలనం చెందుతాయి. శిథిలం చెందిన ఋణిజాలలో కొన్ని ద్రావణీయాలు గాను, మరికొన్ని అద్రావణీయాలు గాను మారతాయి. ద్రావణీయాలు నీటితో కలిసి వివిధ రీతుల చలనం చెంది దూర ప్రదేశాలలో పరివేషాలను ఏర్పరుస్తాయి. ఇవి ఉపరితలం జల మార్గాల ద్వారా రవాణా చేయబడి జల భూరసాయనిక నిశేపాన్వేషణకు వీలు కలిగిస్తాయి. అద్రావణీయాలు కుళ్ళిన పుక్ష పదార్థంతో మిశ్రమం చెంది ఉపరితలం మీద మృత్తిక పొరలుగా ఏర్పడతాయి. ఈ మృత్తిక పొరల మందము, సంఘటన ఆ ప్రాంతపు శిలలను బట్టి, వాతావరణాన్నిబట్టి, పుష్క

నంపత్తినిబట్టి, ఆధారపడి ఉంటుంది. హెచ్చు వర్షపాతము, తక్కువ బాష్పీభవనమున్న ప్రదేశాలలో ఈ మృత్తిక పొరమందము హెచ్చుగా ఉంటుంది. తక్కువ వర్షము, హెచ్చు బాష్పీభవనముఉన్న ప్రదేశాలలో ఈ పొర పలుచగా ఉంటుంది. మృత్తిక పొరనుబట్టి ఒక ప్రాంతంలో PH లో మార్పులు కలుగుతుంటాయి. ఈ PH లో మార్పులను బట్టి వివిధ మూలకాల చలనము ఉంటుంది. అల్లుపు PH, హెచ్చు వర్షపాతము ఉన్న ప్రదేశాలలో మూలకాలు ఎక్కువ భాగం ద్రావణీయ మవుతాయి. ఊరపు PH, తక్కువ వర్షపాతము ఉన్న ప్రాంతాలలో మూలకాలు అద్రావణీయముగా ఉండి వాటి జనన స్థానాలకు సమీపంగానే కేంద్రీకృత మవుతాయి.

లోహాలు వాటి అనుబంధ మూలకాలు మృత్తిక పొరలో అనేక రకాలుగా ఇమిడి ఉంటాయి. శైథిల్యక్రియా సమయంలో అన్ని ఖనిజ మూలద్రవ్యాలకు నిశ్చలత్వము (Stability) ఒకే పరిమాణంలో ఉండదు. నిశ్చలత్వము ఈ కింద చూపిన విధంగా తగ్గుతుంది.



శీలలో లోహాలు, అనుబంధ మూలకాలే కాకుండా కణమాత్ర మూలకాలు (trace elements) కూడా ఉంటాయి. శీలలో ఇవి హెచ్చు పరిమాణంలో ఉన్నట్లయితే అటువంటి శైథిల్యం చెందిన తరవాత ఏర్పడిన మృత్తిక పొరలో ఈ కణమాత్ర మూలద్రవ్యాలు హెచ్చుగా ఉంటాయి. పుత్ర నంపత్తి దట్టంగా ఉన్న ప్రదేశాలలో మృత్తిక పొరలోని కణమాత్ర మూలకాలు వృక్షాల వివిధ భాగాలకు చేర్చబడటం వల్ల మృత్తిక పొరలోని వాటి పరిమాణం తగ్గుతుంది. ఉపరితలఅంతర్భాగ జలాల ప్రభావము హెచ్చుగా ఉన్న ప్రాంతాలలో మృత్తిక పొరలోని ఈ కణమాత్ర మూలకాలు రవాణా చెందటం వల్ల పరిమాణం తగ్గుతుంది. ఈ కణమాత్ర మూలకాలు ద్రావణీయాలైన సంయోగ పదార్థాలుగా మార్పుచెందినప్పుడు ఎక్కువగా రవాణా చేయబడటం కారణంగా మృత్తిక పొరలలోని వాటి పరిమాణం తగ్గుతుంది.

లోహ సంయోగ పదార్థాల ద్రావణీయత, లోహాల వేలెన్సీ మారడం, అవి ద్రావణీయ సంయోగ పదార్థాలుగా మారడం మృత్తిక పొరలలోని PH, Eh విలువల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.

కొన్ని మూలకాలు ద్రావణీయాలుగా మారి రవాణా చేయబడడం వల్లనూ, మరికొన్ని వృశాలలో కేంద్రీకృతం కావడం వల్లనూ మృత్తిక పొరలోని మిగిలిన మూలకాలు ధనికృతం(enrichment) అవుతాయి. ఇటువంటి సందర్భాలలో ఈ మృత్తిక పొరలోని కొన్ని మూలకాలు దిగువ భాగంలోని శిలలలో కన్న అధిక శాతం ఉంటాయి. ఎడారి ప్రాంతాలలోను, వర్షపాతము తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలలో మృత్తికలో సంయోగ పదార్థాలుగా మారిన మూలకాల శాతం, కిందిభాగపు తాజా శిలలలోని మూలకాల శాతం సరిసమానంగా ఉంటుంది.

శిలా శైథిల్య ప్రక్రియవల్ల ఏర్పడిన మృత్తిక పొరలో ఉపరితలం నుంచి తాజా శిల వరకు లోహ మూలకాల శాతం ఒక్కొక్క మండలంలో ఒక్కొక్క మాదిరిగా ఉంటుంది. భూరసాయనిక నిశ్చేపాన్వేషణ కోసం సమూహాలను సేకరించేటప్పుడు మృత్తిక పొరలోని ఏ మండలం నుంచి ఉపరితలం నుంచి ఎంత లోతున—సేకరిస్తున్నదీ విశదంగా వ్రాసి ఉంచుకోవాలి.

శిలాశైథిల్య ప్రక్రియ భోమ కాలమానంలో అన్ని యుగాలలోను సంభవిస్తూనే ఉందని మనకు తెలిసిన విషయమే. పురాతన యుగాలలోని శైథిల్య ప్రక్రియానంతరం ఆ శిథిల మండలం తదనంతరపు మహా యుగపు నిశ్చేపాలతో కప్పబడుతుంది ఆ విధంగా కప్పబడిన పురాతన శైథిల్య మండలాలలో కూడా వినరణ పరివేషాలను కనుక్కోవచ్చు. వైన కప్పి ఉన్న తదనంతర శిలలు కూడా శిథిలం చెందినప్పుడు వీటి దిగువ ఉన్న పురాతన శిథిల మండలం బహిర్గత మవుతుంది. అవీ కాకుండా ఉపరితలపు శిథిల మండలంలో బాటు పురాతన శిథిల మండలం కూడా అంతర్ జలాలకు, వృశాలకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

సున్నపురాయి, స్కార్న్లు, (Skarns) డైక్ లు, క్వార్ట్జ్ సీరలు-వీటి స్వరూప వద్ద విభుజన క్రియ హెచ్చుగా ఉంటుంది. పురాతన శిథిలమండలంలో కూడా పరివేషాలు ఖనిజీ కరణ చెందిన ప్రాంతపు విస్తీర్ణం వైనా, అధారశిలవైనా ఆధారపడి ఉంటాయి. వినరణ పరివేషాల మందము అవి ఏర్పడి ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితులవైనా అవి భద్రవరచబడిన పరిస్థితులవైనా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ మందము ఎల్లవేళలా ఒకే రీతిగా ఉండదు. పురాతన శిథిల వలలలో ఏర్పడి అవశేష శిలలతో కప్పబడిన పరివేషాలు వాటి జనన స్థానాల వద్దనే ఉండవచ్చు. లేదా స్థల మార్పు చెందవచ్చు. వీటి మందము కొన్ని సెంటీమీటర్ల

నుంచి రెండు లేదా మూడు మీటర్ల వరకు ఉండవచ్చు. స్థల మార్పు చెందిన పరివేషాల మందము ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క విధంగా ఉండి అది మొదట ఏర్పడిన పరివేషపు మందం మీదా, ఉపరితలపు వాలు మీదా, సహాకృతి మీదా, నిక్షేపపు సంఘటన మీదా ఆధారపడి ఉంటుంది. అవశేష శిలా నిక్షేపాల దిగువను అగాధపు లోతులలో ఉన్న పరివేషాల మందం అంత హెచ్చుగా ఉండదు. మందం ఒకటి నుంచి ఏడు మీటర్ల వరకు ఉండి పురాతన యుగంలో శిలా శైలిల ప్రక్రియకు లోనైన పటల మండలము, ఆక్సికరణ మండలాలు ఎంత వరకు క్రమక్షయం పొందినాయో దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అగాధపు లోతులలో ఉన్న పరివేషాలను గురించి తెలుసుకొనేటప్పుడు పురాతన యుగపు శిథిల పటలాలను గుర్తుపట్టడం, వాటి పార్శ్వకృతులను గురించి తెలుసుకోవడం చాలా అవసరము. అవశిష్ట పురాతన శిథిల పటలాన్ని పునర్నిక్షిప్తమైన దాని నుంచి, స్థానికమైన దానిని స్థల మార్పు చెందినదాని నుంచి గుర్తించ గలిగి ఉండటం చాలా ముఖ్యము. శిథిల పటలాలను ఆక్సికరణ మండలాల నుంచి గుర్తించ గలిగి ఉండటం మరో ముఖ్య విషయము. ఎందువలనంటే భూరసాయనిక నర్వేక్షణలు ఈ రెండు ప్రాంతాలలోను ఒకే మాదిరిగా ఉండక భిన్నంగా ఉంటాయి. శైలిల ప్రక్రియవల్ల ధనీకృతమైన నికెల్, క్రోమైట్, మాగ్నెటైట్, ఇల్మెనైట్ నిక్షేపాల కోసం చేసే భూరసాయనిక నర్వేక్షణ ఆక్సికరణం పొందిన కావర్, పైరైట్ జింక్, నికెల్ మొదలైన వాటి నిక్షేపాల కోసం చేసే నర్వేక్షణకు భిన్నంగా ఉంటుంది. ఈ ఆక్సికరణ మండలాన్ని భూరసాయనికంగా పరిక్షింపనప్పుడు మనకు అందులో ఉన్న ముఖ్యమూలకాలు ఎంతవెదికినా దొరకవు. ఎందువల్లనంటే తవనంతర ప్రక్రియలవల్ల అవి ద్రావణీయాలగా మారి అక్కడనుంచి వెళు చేయబడతాయి. ఈ ముఖ్యమూలకాలు లేనంతమాత్రాన మనము ఆ ప్రాంతంలో వీటి నిక్షేపాలు లేవనుకోవడం చాలా పెద్ద పొరబాటు అవుతుంది. ఇటువంటి సందర్భాలలో ఆక్సికరణ మండలాలలో ముఖ్యమూలకాలకు బదులు కొన్ని టైపో మార్పిక్ (Typo-morphic) మూలకాలకోసం అన్వేషణ సాగించడం ఉత్తమోత్తమము. అదేవిధంగా ఉపరితలంమీద శైలిల ప్రక్రియవల్ల ధనీకృతమైన మూలకాలున్నంతమాత్రాన ఆ ప్రాంతంలో ఆయా నిక్షేపాలున్నాయనుకోవడం కూడా పొరబాటు. ఇక్కడకూడా టైపోమార్పిక్ మూలకాలను గురించి అన్వేషించి వాటి సహాయంతో నర్వేక్షణ ఫలితాలను విపులీకరించుకోవలె.

ఎలూవియల్ లోహనిక్షేపాలు (Eluvial deposits) శైలిస్థితికియవల్ల ఏర్పడతాయి. అతిమౌలిక శిలలు శిథిలం చెందిన కారణంగా నికెల్ కోబాల్ట్ నిక్షేపాలు ఏర్పడతాయని తెలుసుకొన్నాము గదా! ఇదేవిధంగా మాంగనీస్ జాన్సోల వినంధాన క్రియవల్ల మాంగనీస్ నిక్షిప్తాలేర్పడతాయి. ఆక్సికరణం చెందిన మండలాలలో నిక్షిప్తము వృద్ధి పొందడం గమనార్హము. ఈ విధమైన వృద్ధి (ధనీకృతము) ఎక్కువగా బహులోహ నిక్షిప్తాలలో కనిపిస్తుంది. ఇటువంటి సంవృద్ధి నిక్షేపానికి సరిగా పైన సంభవించవచ్చు; లేదా నిక్షేపానికి కొంచెం దూరంలో సంభవించవచ్చు. ఈ ధనీకృత స్థానాలకు దిగువను ఆర్థికంగా లాభం కలిగించే ఖనిజీకృత మండలాలు ఉండనూ వచ్చు; లేక పోనూవచ్చును. ఉపరితలంమీద భూరసాయనిక నిక్షేపాన్వేషణ ఒరిపించేటప్పుడు ఇటువంటి ధనీకృత స్థానాలవద్ద పరివేషాలను చూసి విపులీకరించు కోవడంలో తొందరపడక అన్వేషణకోసం తీసుకొనే గిని త్రవ్వకాలు మొదలైన చ్యుల సహాయంతో లోతులలో లాభసాటిఅయిన ఖనిజీకృత మండలము ఉందో లేదో తెలుసుకొని అప్పుడు భూరసాయనిక సర్వేక్షణ ఫలితాలను విపులీకరించు కోవాలి. కాని ఈవిధమైన పద్ధతికి చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అందువల్ల మనము భూరసాయనిక పరివేషాలను వెదికి కనుక్కోవడమే కాకుండా, వాటి ఆర్థికవిలువలు ఎటువంటివో అంచనా వేయడం కూడా చేయవలె.

ఖనిజ నిక్షేపంగాని, నిక్షేపపు నిలలుగాని శిథిలప్రదేశాలలో నిక్షేపంలోని ముఖ్యమైన, అనుబంధ మూలకాలు మృత్తిక పొరలో ఉంటాయని చెప్పడం జరిగింది ఇటువంటి ప్రాంతాలలో వృక్షనంపద ఉన్నట్లయితే వృక్షాల వేళ్లద్వారా కొన్ని మూలకాలు వృక్షభాగాలలో కేంద్రీకృతమైనప్పుడు మరికొన్ని మూలకాలు మృత్తిక పొరలో హెచ్చు విలువలను సూచిస్తాయి భూరసాయనిక సర్వేక్షణలో లోహపు హెచ్చువిలువలను కనుక్కోవడం ఈ వృక్షనంపద యొక్క మూలకాల గ్రహణ శక్తిమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎడారి ప్రాంతాలలో చెట్లవేళ్లు చాలాలోతుకు పోతాయి. ఒక్కొక్కరకపు చెట్లవేళ్లు ఒక్కొక్క పరిమితమైన లోతుకు చొచ్చు కొనిపోతాయి ఎక్కువగా చెట్లవేళ్లు మృత్తికపొరలలో వైభాగంలోనే (0-40 cm) ఉంటాయి. లోతు భాగాలకు పోయే వేళ్ళనంఖ్య చాలా తక్కువ.

శిలలలో మూలకాలు ఎంత హెచ్చు పరిమాణంలో ఉంటే చెట్లు వాటిని అంత ఎక్కువ పరిమాణంలో తీసుకొంటాయి. ఒక్కొక్కరకపు చెట్లు

ఒక్కొక్క విధంగా మూలద్రవ్యాల పీఠినుకొంటుంది. చెట్లు ఎండిపోయిన తరువాత ఖనిజాలు కేంద్రీకరించబడిన భాగాలన్నీ మృత్తికలో కలిసిపోవడంతో ఆ మృత్తిక పొర లోహమూలకాలతో ధనీకృతమవుతుంది.

కేశనాళికా చర్యవల్ల భూపటలపు అడుగుపొరలనుంచి లోహద్రావణాలు పైకివచ్చి ఆవిరిఅయి లోహమూలకాలను ఉపరితలానికి సమీపంగా కేంద్రీకరించడం భూరసాయనిక సర్వేక్షణలో తెలుసుకోవలసిన చాలాముఖ్యమైన విషయము. ఈవిధమైన కేంద్రీకరణ ఎడారిప్రాంతంలో ఇంకా ముఖ్యమైనది. మృత్తికపొర లోని రేణువులు ఎంత ముతకగా ఉంటే భూమి ఉపరితలానికి అంత చేరువలో ఈ లోహాలు కేంద్రీకృతమవుతాయి. కేశనాళికాచర్యవల్ల ద్రావణాలు ఉపరితలానికి చేరుకొనే వేగము ద్రావణాల సాంద్రీకరణమీద, వాటి రసాయనిక సంఘటనమీద, ఆధారపడి ఉంటుంది. ద్రావణాల సాంద్రీకరణ హెచ్చుగా ఉంటే వేగము తక్కువగా ఉంటుంది. ఏలోహాలాలేని నీరు ఉపరితలాన్ని ఆమితవేగంతో చేరుకొంటుంది. మృత్తికపొరలో జిప్సమ్ గాని, సున్నముగాని కలిసి ఉన్నప్పుడు ఈ కేశనాళికాచర్య వేగం హెచ్చవుతుంది. సున్నపురాశినేలలో బహులోహసల్ఫైడ్ నిక్షేపాలను వెదికేటప్పుడు ఈ సత్యాన్ని బాగా గుర్తుంచుకోవలె. ఈ విధమైన కేశనాళికా ఆరోహణవల్ల భూపటలపు అడుగుపొరలనుంచి లవణాలు పైపొరకు రవాణాచేయబడి ఉపరితలంమీదగాని, దానికి కొంచెం దిగువభాగంలోగాని లవణపు పరివేషాలేర్పడతాయి. అంతర్భూమి జలపు పై అంచు ఎక్కువ లోతులోలేని సందర్భాలలో ఈ లవణ పరివేషాలు ఉపరితలంమీదనే ఏర్పడతాయి. లేకపోతే ఇవి కొంచెం లోతులో ఏర్పడతాయి. ఉపరితలపు పరివేషాలు పుష్కలద్రావాలు మృత్తికపొరలో కలిసిపోయినందువల్లనూ, లోహద్రావణాల కేశనాళికా ఆరోహణవల్లనూ, మృత్తికపొర పైకివస్తున్న లోహ ద్రావణాల లోని లోహాలను పీల్చుకొన్నందువల్లనూ ఏర్పడతాయి. ఒక్కొక్కప్పుడు ఉపరితలం నుంచి కిందికిపోయే ద్రావణాలు, లోతుభాగాలనుంచి పైకివచ్చే ద్రావణాలు కలుసుకొని అవక్షేపాలేర్పరిచినప్పుడు కూడా ఈ పరివేషాలేర్పడతాయి. నమూనాలను ఎంతలోతులో పీనుకోవలెనో నిర్ణయించేటప్పుడు ఈ వైవిధ్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకోవలె. విదరాలులేని ప్రదేశాలలో సుదృఢమధ్య క్షే పొరలుంటే కేశనాళికా ఆరోహణకు అంతరాయం కలుగుతుంది.

చమురు, వాయునిక్షేపాలు (Oil and Gas deposits) భూరసాయనిక, జీవప్రక్రియలమీద కొంత ప్రభావాన్ని కలిగిఉంటాయి. ఈ ప్రభావము మృత్తిక

పొలాలలోను, అంతర్జలాలలో ఉన్న ఉపవహదార్థాలలోను, ఆక్సీకరణ-క్షయకరణ శక్త్యం (Oxidation - Reduction Potential) లోను కనిపిస్తుంది. చమురు నిక్షేపాలలోని కొన్ని పదార్థాల తీవ్రచలనశక్తివల్లను, చమురువాయువుల దీర్ఘకాలపు విసరణ (Prolonged diffusion) వల్లను, నిర్మితియ కలశాల (structural dome) లోని విదరాలు, నూత్నవిదరాల వల్లను, హైడ్రోకార్బన్ల ప్రవాహము ఏర్పడుతుంది. ఈ ప్రవాహంతోబాటు కార్బానిక్ ఆమ్లము. స్థానికంగా హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ కూడా ఏర్పడతాయి. ఈ వాయువులు ప్రెకిరావడానికి నూత్నవిదరాలు, సచ్చిద్రత ప్లిస్టోసిటి దోహదం చేస్తాయి. ప్లేటఫామ్ (Platform) వలా వరణంలో ఈవాయువులు అంతర్భ్రమ్య జలంతోను, ఆర్టిజియన్ జలాల (artesian waters) తోను సమ్మిళితమయి మృత్తికపొరలలో కలిసిపోతాయి. వీటిలో కార్బన్ డై ఆక్సైడ్, హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ మొదలైనవి అనుకూలపరిస్థితులలో తక్కువలోతులో కూడా ఏర్పడతాయి.

భూపటలంలోని ఉష్ణోగ్రతాభేదాలవల్ల అంతర్భాగం నుంచి ఉపరితలానికి రవాణాచేయబడే వాయుమిశ్రమము పొరలు పొరలుగా విభజితమవుతుంది. లోతైన స్థావరాలలో భూనిజనిక్షేపమున్న ప్రాంతాలలో విదరాలు, భ్రంశాలు ఎక్కువగా ఉండి, శిలల సచ్చిద్రత హెచ్చుగా ఉన్నట్లయితే ఆరోహణజలాలు (ascending waters), ఆర్టిజియన్ జలాలు ఏర్పడటానికి చాలా అవకాశముంది. ఫ్లోరీన్ గాని, రెడియోధార్మిక మూలకాలు, ద్రావణీయాలైన లోహపులవణాలు భూనిజనిక్షేపంలోగాని, అతిథేయ శిలలలోగాని ఉన్నట్లయితే వీటిలో కొంతభాగం ఈ జలాలలో కరిగిపోతాయి. ఇటువంటి ద్రావణాలు ప్రెకివచ్చిన తరువాత భూజలాలతో మిశ్రమించెంది ఉపరితలానికి సమీపంలో ఉన్న మృత్తికపొరల సంఘటనలతో మార్పులు తెస్తాయి.


సల్ఫైడ్ నిక్షేపాలు బహిర్గతమైనచోట్ల అవి ఆక్సీకరణం చెంది సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లము తయారవుతుంది. ఈ ఆమ్లము అతిథేయ శిలలపైనా, వాటిలోని కార్బోనేట్లపైనా పని చేసి ఉపరితలం మీద అనంతర కార్బోనేట్లను ఏర్పరుస్తుంది. ఇవి కాక ఉపరితలం మీద ఫ్లోరీన్, బోరాన్, భూనిజాలు కూడా ఏర్పడతాయి.

అంతర్భాగపు నిక్షేపం మీద అంతర్ భూనిజాలు పనిచేసి అందులోని కొన్ని మూలకాలను, వాటి లవణాలుగా మార్చి ద్రావణీయాలగా ఉపరితల భాగానికి చేరుస్తాయని చెప్పకొన్నాము. ఈ విధంగా ఏర్పడిన ఉపరితల పరివేషాలు ఎక్కువ భాగం శిలల నిర్మితియ కారకాలమీద ఆధారపడి ఉంటాయి. అంతర్


జలాలు వైకి రావడానికి అనువుగా ఉన్న విదరాలు. భ్రంశాలు మొదలైన వాటి గుండా ద్రావణీయ లవణాలతో కూడిన జలాలువైకి వచ్చి ద్రావణీయ లవణాలను ఉపరితలం మీద విడుస్తాయి. ఈ లవణాలు అనంతర ప్రక్రియల వల్ల తిరిగి విసరణ చెంది అనలైన పరివేషాలుగా తీర్చిదిద్దబడతాయి.

ఆక్సీకరణ: ఆక్సీకరణ ప్రక్రియ ముఖ్యంగా సల్ఫైడ్ నిక్షేపాలకు, తక్కువ సంయోజక రోహసంయోగ పదార్థాలకు వర్తిస్తుంది. ఆక్సీకరణ ప్రక్రియవల్ల మాగ్నెటైట్ ఆక్సీకరణం చెంది, మార్బైట్, హెమటైట్, గోటైట్లుగాను, సైడరైట్, హెమటైట్ ఐరన్ హైడ్రాక్సైడ్లుగాను రోహసైట్, రోటోక్రోసైట్ సిలోమలేను, పైరోలుసైట్, మాంగనీస్ హైడ్రాక్సైడ్లుగాను మరి భూరసాయనిక ఖనిజ నిక్షేపాన్వేషణకు ఎంతో సహాయకారులుగా ఉంటాయి. వైన ఉదాహరించిన ఆక్సైడ్లు, హైడ్రాక్సైడ్లు శిలలోని ఐరన్ మాంగనీస్ ఖనిజాలనుంచి కూడా ఏర్పడగల అవకాశముంది. అందువల్ల ఇవి ఉపరితలంమీద ఉన్నప్పుడు పిటి జననస్థానము సల్ఫైడ్ నిక్షేపాలా? లేదా శిలలా అనేవిషయం గుర్తించవలె. ఈ ఆక్సైడ్లు, హైడ్రాక్సైడ్లతో బాటు సల్ఫైడ్ నిక్షేపపు అవశేష ఖనిజాలేమైనా ఉన్నాయేమో పరిశీలించవలె. అదీకాకుండా సల్ఫైడ్ నిక్షేపపు ప్రైపోహార్మిక్ మూలకాలు (As, Ag, Sb, Bi, Ba, Co, Ni,) ఈ సంయోగ ప్రవ్యాలలో ఉన్నవేమో పరిశీలించవలె. ఈ రెండూ పీటితో కలిసిలేని పక్షాన రోహపు ఆక్సైడ్లు హైడ్రాక్సైడ్లను సల్ఫైడ్ నిక్షేపాలకు సూచికలుగా తీసుకోరాదు. పీటిని శిలా శైలిల్యావశేషాలు గానే గుర్తించవలె.

నిక్షేపాలలోని సల్ఫైడ్ సంఘటన అతిథీయ శిలలోని ఖనిజసంఘటన ఆక్సీకరణ క్రియలో చాలాముఖ్యమైన పాత్రవహిస్తాయి. నిక్షేపాలలో వైరైట్ చాల్కోవైరైట్ ఆర్సినోవైరైట్ మొదలైన సల్ఫైడ్లున్నట్లయితే ఆక్సీకరణవల్ల సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లము జనిస్తుంది. ఈ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లపుప్రసారంవల్ల సల్ఫైడ్లు, బేసిక్ లవణాలు ఏర్పడతాయి. ఇవి ఏర్పడటం, జలవిశ్లేషణ (Hydrolysis) చెందడం వాతావరణ పరిస్థితులవైనా భూస్వరూప పరిస్థితులవైనా బ్రధానపడి ఉంటాయి. జలవిశ్లేషణ ప్రక్రియ అన్ని అక్షాంశాలవైన ఒక్కమాదిరిగా ఉండదు. అదేవిధంగా వర్షతప్రాంతాలలో ఒకమాదిరిగాను, మైదానాల మీద మరిఒక మాదిరిగాను. ఉంటుంది. ఆక్సీకరణచెందే వైరైట్, చాల్కోవైరైట్ మొదలైన ఖనిజాల పరిమాణము చాలా ముఖ్యమైన కారకము. ఆక్సీకరణంవల్ల నీటిలో




పటము-5
పర్వత వాగుచదిగిన భాగాలో భూనిజ కేంద్రీకరణ
1. భూనిజనీర 2. ఆ తీధేయశిల 3. త్రిమక్షయతలము



వ.మ.ర.

- అవశిష్ట అంశ: షాళపములో నీనపు సంఘటన
1. మృత్తక పొర 2. బొగ్గపేద 3. బొగ్గపేద 4. క్వార్ట్జైట్లు
 5. క్వార్ట్జైట్ ఇసుకరాయి 6. రెడ్ ఖనిజ నిక్షేపణలు



పటము-7

పటంలో ఆక్సికరణము చెందిన నీనము సేగంధకరముల కేంద్రీకరణ
1. మృత్తక పాఠ 2. టోలమైడ్ సున్నపు రాలు 3. చెట్ ఖనిజపు నీరలు

సులభంగా కరిగే లవణాలేర్పడినట్లుంటే జలపరివేషాలేర్పడతాయి. ఈజలపరివేషాలేర్పడటానికి తగినతేమ, ఎత్తువల్లాలు హెచ్చుగా ఉన్న ఉపరితలము దోహదం చేస్తాయి. ఈ జలపరివేషాలు వర్షపాతపు వీతాన్ని చేరుకొనే ఉపరితలం జలప్రవాహ రూపంలో ఉంటాయి. వర్షపాతం తక్కువగా ఉన్న బల్యవర్షపు ప్రదేశాలలో లవణ భింజి పరివేషాలేర్పడతాయి.

ఉపరితలపు స్థలాకృతి పరివేషాల విసరణ మీద ఎటువంటి ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుందో చూపిన వటంద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.

పురాతన యుగపు శైలిల్యక్రియా వాతావరణము ఈనాటివాతావరణానికి భిన్నమైనది. పురాతన శిథిల శిలలలో విశ్లేషాన్వేషణ జరిపించేటప్పుడు ఆ శైలిల్యక్రియ జరిగిన నాడు వాతావరణము ఎటువంటిదో ముందుగానే తెలుసుకొని అప్పుడు విశ్లేషపు ఆక్సీకరణ మండలాన్ని పరిశోధించవలె.

విరంజిత మండలాలు (Bleached zones)

సల్ఫైడ్ భింజాలు కలిసేఉన్న నిక్షేపాలలోని ఐరన్ హైడ్రాక్సైడ్ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లంతో విడుదల చేయబడినచోట్ల ఈ మండలాలు ఏర్పడతాయి. అన్ని కాలయిన శిలలూ శిథిలమయి ఆతరవాత మాంట్ మెరిలోనైట్ (Mantmorillonite) కయెలిన్ (Kaolinite) ఏర్పడే సందర్భాలలో కూడా ఈ విరంజిత మండలాలు ఏర్పడతాయి. ఇటువంటి మండలాలు ఏర్పడటానికి గలవారణమేమిటో భూరసాయనిక సర్వేక్షణ ఫలితాలను వివరణ చేసుకొనేముందు తెలుసుకోవలె.

విసరణరీతి ధాతునిక్షేపాలున్న (disseminated ore) శిలలలో ఈవిరంజిత మండలాలు హెచ్చుగా ఏర్పడతాయి. ఆక్సీకరణంజెందుతున్న నిక్షేపానికి, విరంజిత మండలానికి ఉన్న సంబంధము అన్నిచోట్లా కనిపించదు. ఈవిరంజితమండలాలు సాధారణంగా నిక్షేపాలకు 500 మీటర్లకన్న దూరంగా ఉండవు. విశాలంగాఉన్న విరంజిత మండలాలు విసరణరీతి సల్ఫైడ్ భింజికరణకు సంబంధించినవని గ్రహించవలె.

ఆక్సీకరణ మండలాలు : భింజి సంఘటన : గోసాయిలు

ఆక్సీకరణజెందిన సల్ఫైడ్ మండలాలలో లోహాలు కింగ్డియాపాలలో ఉంటాయి (1) అవశిష్ట సల్ఫైడ్లు (2) ఆద్రావణ బేసిక్ సల్ఫైడ్లు, ఆప్సినేట్లు, వెస్టెట్లు, మోలిబ్డేట్లు, క్రోమేట్లు, ఫాస్ఫేట్లు, హైడ్రోసిలికేట్లు, (3) కార్బోనేట్లు,

బేసిక్ కార్బోనేట్లు, (Cu, Pb, Zn) (4) “క్లే” భువిజ్ఞాలు - ముఖ్యంగా మాంట్ షెరిటానైట్-వీడిలో కావర్, జింక్, మొదలైన లోహాలు పీల్చబడి ఉంటాయి.-(5) సరళమైన క్లిష్టమైన (Simple and complex) ఆక్సైడ్లు (6) ఓవర్, చార్నిటోసి, క్వార్ట్జ్ (7) ఇతరభువిజ్ఞాలు.

ఆక్సికరణ మండలంలోని భువిజ్ఞాలు స్థూలరేణుపరిమాణంలోను, సూక్ష్మ రేణుపరిమాణంలో కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి సమానాలను స్థూల సూక్ష్మ రేణు పరిమాణాలతో తీసుకోవలె.

ఆక్సికరణం చెందిన భువిజ్ఞపదార్థాలు ముఖ్యనిక్షేపం గుంచి వేరుఅయి వర్గతవువాలుల మీద యాంత్రిక భువిజ్ఞపరివేషాలు (Mechanical mineral halos) ఏర్పరుస్తాయి. సల్ఫైడ్ భువిజ్ఞాలకు వ శాతంలో ఉన్న నిక్షేపాలచుట్టూ “అప్లు పరివేషాలు” ఏర్పడతాయి. వీటి సరిహద్దులను PH సూచిక సహాయంతో ఏర్పరచు కోవచ్చు. కార్బోనేట్లు లేని పక్షాన గోసానోల చుట్టూ కనుక్కోవడానికి సులభమైన సల్ఫైడ్ పరివేషాలేర్పడతాయి. కార్బోనేట్ శిలలున్న చోట్ల సెరుస్సైట్ (serussite) స్మిత్సోనైట్ (Smithsonite) మలకైట్ (Malachite) అజురైట్ (azurite) మొదలైన భువిజ్ఞపరివేషాలేర్పడతాయి.

శిథిలపటలాలు, ఆక్సికరణ మండలాల క్రమక్షయము

శిథిలమండలాలు, ఆక్సికరణమండలాలు ఎన్నడూ మొత్తంగా భద్రమై ఉండవు. వాటి వైభాగాలు, మధ్యభాగాలు వేరుచేయబడతాయి. స్థిరమైన వీటి దిగువ భాగాలు శిథిలం చెందినచోటనే తాజాశిలలతోబాటు ఉంటాయి. శైలిల్య ప్రక్రియవల్ల తయారయిన భువిజ్ఞాలు, ఉత్పాదితాలు శిథిలం గాని ప్రాథమిక భువిజ్ఞ వశిష్టాలు కొండపాలుల గుండా ఉపరితలజలాలద్వారా రవాణాచేయబడి నదీ ప్రవాహాలలో కలుస్తాయి. ఇవి నదీ ప్రవాహాలలో వేర్పాటు చేయబడి అనువైన స్థానాలలో కేంద్రీకరింప బడతాయి. తేలికగా ఉండి భువిజ్ఞాలలో “క్లే” భువిజ్ఞాలు చాలా స్థిరమై ఉండి చాలా హెచ్చుదూరం రవాణా చేయబడతాయి. క్వార్ట్జ్, మాంగనీస్, (స్ట్రాంషియమ్ సల్ఫైడ్లు, క్వార్ట్జ్, మెగ్నీషియమ్ కార్బోనేట్లు హెచ్చుద్రావణీయత కారణంగా అస్థిరమైనవి. “క్లే” భువిజ్ఞాలకు, తీవ్రసంబంధ పదార్థాలకు అనుబంధంగా ఉన్నందువల్ల ఎక్కువ దూరం రవాణాచేయబడే కావర్, జింక్, వెనేడియమ్, లెడ్, ఐరన్, మాంగనీస్, ట్రెటానియమ్లనుకూడా

గుర్తుంచుకోవలె. కొలాయిడ్ విలంబనాలుగా రవాణా అయ్యే బిల్, ఆల్బూమిన్ యివి. మాంగనీస్, టైటానియంల ప్రాద్రాప్సెడ్లు కూడా హెచ్చుమార్పు రవాణాను తట్టుకోగలుగుతాయి.

కఠినత హెచ్చుగా ఉన్న ఖనిజాలు యాంత్రికంగా ఎక్కువమొత్తం రవాణా అవుతాయి. యాంత్రిక స్థిరత్వాన్ని బట్టి ఖనిజాలు నాలుగు విధాలు: అస్థిరాలు (బ్రూకైట్, రూటైల్, టూస్టలైట్, కొరండమ్, గార్ట్, స్టాటనైట్, రత్నాలు), స్థిరాలు (ఇల్మినైట్, హెమటైట్, స్పీస్, మోనజైట్, కొరండైట్, కానికైట్); అస్థిరాలు (గార్నెట్, ఉల్ట్రామైట్, షీలైట్, బెరైట్); అస్థిరాలు (చార్నోక్లైట్, స్పీలరైట్, వైరైట్, సినిబార్ ఇతర సరైట్లు).

బాహ్యప్రదేశాలలో యాంత్రికంగా రవాణా పవనాలద్వారా జరుగుతుంది. పదే పదే ఈవిధంగా జరిగిన తరువాత కొత్త స్థలంలో ఖనిజపరివేషాలేర్పడి శైథిల్య క్రియజరిగిన శిలలవద్ద ఉన్న ప్రదేశము ఖనిజసంపదలో హీనత చెందుతుంది. కొత్తప్రదేశం ధనీకృతమవుతుంది. ఈవిధంగా ప్రాథమిక పరివేషంలో మార్పులు పవనాల సహాయంతో సంభవిస్తాయి.

ఏలూవియల్ విసరణ పరివేషాలు (Eluvial disseminated halos) నదీలోయలోనికి బస్టిలేషన్ జరిగినప్పుడు విసరణప్రవాహాలేర్పడతాయి. ఈవిధమైన పరివేషాలు ప్రాథమిక పరివేషాలకు ఎక్కువ స్థానాన్ని ఆక్రమించుకొని నిక్షేపా న్నైషణకు సహాయపడతాయి.

పర్వతవాలులలో ఖనిజసింఠుంచే పీఠిలో లోహపు పరిమాణము ఎగువ వాలులోని పరివేషాలలో తక్కువగా ఉండి దిగువ వాలులోని పరివేషాలలో హెచ్చుగా ఉంటుంది. ఖనిజనిరకు శిరోభాగంలోగాని, దానికి దగ్గరగా గాని లోహపు విలువ చాలా హెచ్చుగా ఉండి వాలుదిగువ భాగానికి తగ్గతూ వస్తుంది. వాలుగా ఉన్న స్థలంలో పరివేషము అసౌష్టవంగా ఉంటుంది. లోయలో పరివేషపు తీవ్రత హెచ్చుగా ఉండి ఉపరితలంమీద దాని వైశాల్యము హెచ్చుగా ఉంటుంది. ఎత్తుప్రదేశాలలో ఆక్సికరణ మండలాలుంటే యాంత్రిక పరివేషాలేర్పడటానికి సుకరంగా ఉంటుంది.

శిలలు శైథిల్యం చెందినచోట శైథిల్యపరిష్కారంలో లోహపు ఖనిజాలు కలిసి ఉన్నప్పుడు సాధారణ విసరణ పరివేషము ఏర్పడుతుంది శైథిల్యం చెందిన ప్రదేశంనుంచి శైథిల్య ఉత్పాదితాలు మరొక చోటికి బస్టిలేషన్ జరిగినప్పుడు

మరొక విధమైన పరివేషమేర్పడుతుంది. బదిలీచేయబడిన ఉత్పాదనాలు అవి వేటి నుంచి విడుదల అయినాయో ఆ ప్రాథమిక నిక్షేపాలను స్పృశిస్తూ ఉండవచ్చును; లేదా మరొక సూతన శిలాపదార్థ స్పర్శలోనైనా ఉండవచ్చును. అక్వీకరణ నిరోధక ఋణిజాలు ప్లేనర్ నిక్షేపాలుగా ఏర్పడతాయని తెలుసుకొన్నాముగదా! సున్నితరేణుపరిమాణంలో ఉన్న అక్వీకరణ నిరోధక ఋణిజాలు, అద్రావణీయ ఉత్పాదనాలు, క్లే ఋణిజాలకు అనుబంధంగా ఉన్న ఉత్పాదనాలు బదిలీఅవుతాయి.

నదీ ముఖద్వారం నుంచి ఎగువకు భూరసాయనిక పరీక్ష సాగిస్తే ప్లేనర్ ఋణిజాల ఉత్పత్తి స్థానాన్ని గుర్తించవచ్చు. ద్రావణీయాలుగాను, కొలాయిడ్ పృష్ఠస్థలోను, క్లే ఋణిజాలతోను రవాణా అయిన లోహఋణిజమూలకాల ఉత్పత్తి స్థానాన్ని కూడా భూరసాయనికంగా వెదకవచ్చు. ఉత్పత్తిస్థానానికి దూరము ఎక్కువయ్యేకొద్దీ వాటి కేంద్రీకరణ సాంద్రత తగ్గుతుంది. అతి ధనికృతమైన (Richest) వినరణ ప్రవాహాలు ఋణిజ నిక్షేపానికి చేరువగాఉండి, నిక్షేపానికి దూరం ఎక్కువయ్యేకొద్దీ ప్రవాహంలోని లోహపు పరిమాణం తగ్గుతుంది. కొంత దూరం పోయిన తరువాత ప్రవాహంలోని లోహపరిమాణము వృష్టభూమి పరిమాణంతో (Back ground Quantity) కలిసిపోతుంది. ఇటువంటి ప్రవాహాలలో యాంత్రిక పరివేషాలు, లవణపరివేషాలు రెండూ వినరణ చెందిఉంటాయి. యాంత్రికపరివేషాలకన్నా లవణపరివేషాలు ఎక్కువదూరం వినరణ చెందుతాయి. ఈ రెండు పరివేషాలు ఒకేచోటగాని, వేర్వేరుచోట్లగాని అంతం కావచ్చు. ఉపరితల జలప్రవాహాలలో పరివేషాలు ఏర్పరిచే ఋణిజ నిక్షేపాలు ఐరన్, మాంగనీస్, కాపర్, లెడ్, జింక్, గోల్డ్, సిల్వర్, నికెల్, క్రోమియమ్ మొదలైనవి. పీటి నుంచి యాంత్రిక పరివేషాలు, లవణపరివేషాలుకూడా ఏర్పడతాయి. మోనక్షైట్, ఇల్మినైట్, మాగ్నెటైట్, కానటరైట్, రత్నాలు, గార్నెట్ నిక్షేపాలనుంచి యాంత్రిక పరివేషాలు మాత్రమే ఏర్పడతాయి. జలప్రవాహాలలో లోహమూలకాలు ఋణిజాలు వేర్పాటు చెందుతాయి. లోహాల శోషణ సామర్థ్యములోని భేదాలవల్ల లోహమూలకాలు, ఋణిజాల తారతమ్యసాంద్రత, రేణుపరిమాణాలలోని భేదాలవల్ల ఋణిజాలు ప్రవాహాలలో వేర్పాటు చెందుతాయి. ఈ కారణాలవల్ల ప్రవాహాలలో లోహాల పిస్తరణ చాలా క్రమరహితంగా ఉంటుంది.

నదీజల ప్రవాహాలలో భూరసాయనిక నిక్షేపాన్వేషణకోసం నమూనాలు తీసుకొనేటప్పుడు ఈ ప్రవాహాలలో కలిగే మార్పులను గుర్తుంచుకోవలె. కొండపాగులు, మంచునీటి ప్రవాహాలు, నీటిబుగ్గలు-వీటినుంచి వచ్చేనీరు ముఖ్యప్రవాహాలను

ఎక్కడ కలుస్తుందో ఆప్లోలోను, ముఖ్యప్రవాహాల వంపుల వద్దకున్న భూతలనిజే పాల నుంచి నమూనాలను సేకరించవలె. లవణవరివేషాల ఉత్పత్తిస్థానం వెదకడానికి సేటి నమూనాలను కొండవాగుల నుంచి, చక్కలనుంచినచే చిన్నచిన్న సెలయేరుల నుంచి, పీటిబుగ్గల ప్రవాహాల నుంచి సేకరించవలె. సర్వేక్షణ ఏ స్కేల్ మాన చిత్రలమీద జరుగుతుందో దానినిబట్టి నమూనాల మధ్యదూరం నిర్ణీతమవుతుంది. నమూనా ఏవిధంగా తీసుకోవలెనో ఈకించి వట్టిలో చూపడం జరిగింది.

మానచిత్రపు స్కేల్	నమూనాలస్థానాల మధ్య దూరం(మీటర్లు)	కిలోమీటర్లకు నమూనాల సంఖ్య
1 : 200,000	800	1.25
1 : 100,000	400	2.5
1 : 50,000	200	5.0
1 : 25,000	100	10.00

జలప్రవాహాలలో నమూనాలు సేకరించేటప్పుడు ప్రవాహమార్గంలోనే కాకుండా ప్రవాహానికి అడ్డుగా కూడా నమూనాలు తీసుకోవలె. వెడల్పైన నదీ లోయలలో ఈ నమూనాల మధ్యదూరం 100 మీటర్లకు నిర్ణయించుకొనవచ్చు. నన్నని ఇరుకైన లోయలలో ఈదూరం 20 మీటర్ల వరకు ఉంచవచ్చు.

ఎలూవియల్ పరివేషాలలో కొన్ని స్థానభ్రంశం చెందినవి. కొన్ని స్థాన భ్రంశం చెందనివి ఉంటాయి. స్థానభ్రంశం చెందనివి చాలా ముఖ్యమైనవి. ఇటువంటి ఎలూవియల్ పరివేషాలు ఆధారశిలలచుట్టూగాని ఆధారశిలకు కప్పిఉన్న మృత్తికలో గాని ఏర్పడుతూ ఉన్నందువల్ల నిక్షేపాన్వేషణ చాలా సులభసాధ్యమవుతుంది. స్థానభ్రంశం చెందిన పరివేషాలను కృత్రిమ పరివేషాలుగా పరిగణించవచ్చు.

రసాయనిక పరివేషాలు:

పరివేషాలు యాత్రకంగానే కాకుండా కొన్ని భౌతిక, రసాయనిక చర్యలవల్ల కూడా ఏర్పడతాయి. ప్రవరణలో ఉన్న ద్రావణాలలోని లోహాలు 'క్లే' జాతిభినిజాల వల్ల పీల్చుకొనబడి వాటి రేణువువై భాగానికి అతుక్కొని ఉంటాయి. ఈలోహాలు ఆమ్లాలలోని హైడ్రోజన్ తో ఉన్న వేరు అయాన్ తో కలిసేవరకు అటాగే ఉంటాయి. లోహాలలోని కొంతభాగం భిజి స్పటికనిర్మితిలో గుప్తంగా దాచబడి రసాయనిక స్థానభ్రంశానికి వీలుకాకుండా ఉంటుంది. ఔరపు PH విలువలవద్ద

మృత్తిక జలాలలోను, అంతర్భూమి జలాలలోను కరిగిఉన్న లోహాలు ద్రావణాల నుంచి అవక్షేపాలుగా వేరు కావచ్చు. కావర్ లెడ్. జింక్, మాంగనీస్, నిల్బరీ లోహాల సంయోగ పదార్థాలు (నల్ఫేబ్, కార్బోనేట్, ఆర్సినేట్, వెనడేట్, ఫాస్ఫేట్, మోలిబ్డేట్,) అంతర్భూమి జలాలలో ద్రావణాలుగాఉండి శిలా విదలాల నుంచి భూమి ఉపరితలానికి చేరి అక్కడ భాష్పీభవనం చెంది శిలలమీద రంగు రంగుల మచ్చలుగా ఏర్పడతాయి. వీటిని దృగ్గోచరమణ్య పరివేషాలుగా మనము తెల్లలలోకి తీసుకోవచ్చు.

పరివేషాల ఉద్భవ రీతులు

వైనచెప్పిన విషయాల నన్నింటిని లెక్కలోనికి తీసుకొన్నట్లయితే కింద నూచించిన వినరణ పరివేషాలరీతులను గుర్తుంచు కోవచ్చు.

(I) ఏకకాలజన్య వినరణ పరివేషాలు (ఆతిథేయశిలలతో) (1) అవశిష్ట శైథిల్యపటలంతో కలిసిఉన్నది.

(i) సిలికేట్ శిలల విఘటన క్రియవల్ల ఏర్పడినవి. (విఘటన అవశిష్ట పరివేషాలు)

(ii) కార్బోనేట్ శిలల ప్రక్షాళన (leaching)వల్ల ఏర్పడినవి (ప్రక్షాళన అవశిష్ట పరివేషాలు)

(2) అక్సీకరణ మండలంలోని సల్ఫైడ్, కార్బోనేట్, సిలికేట్ ఆర్సైన్ ఖనిజాల అక్సీకరణ, ఆర్థికరణావల్ల ఏర్పడిన అవశిష్టోత్పాదితాలతో కలిసిఉన్నవి (అక్సీకరణావశిష్ట పరివేషాలు)

(3) శైథిల్యపటలము, అక్సీకరణ మండలాలదై లూవియమ్లోని పరివేషాలు

వైవాటిలో మొదటిది, రెండవది ప్రక్షాళన పరివేషాలు. మూడవది స్థాన భ్రంశంచెందిన పరివేషము.

(ii) ఉత్తరజన్య వినరణ పరివేషాలు (ఆతిథేయ శిలలకు చెందినవి) స్థానభ్రంశం చెందినవి.

(1) యాంత్రిక పరివేషాలు, వినరణప్రవాహాలు

(i) అక్సీకరణ, ఆర్థికరణ క్రియలతో కూడనివి

(ii) ఆక్సిజన్ అగ్రరణి క్రియలతో కూడినవి.

లోహ-జీవరసాయనిక పరివేషాలు (వృక్షాల భౌతికరణా వశిష్టాలు) మృత్తిక పరివేషాలు:

(3) లవణ శోషణపరివేషాలు (అంతర్భృమ జలాలు భూమికవరితలానికి రావడం వల్లనూ, సన్ననిరేణువులు, ఒండ్రుమట్టిచేత శోషణం వల్లనూ, పదార్థాల మధ్యరసాయనిక క్రియలవల్లనూ ఏర్పడినవి

(4) మిశ్రమ పరివేషాలు (2, 3ల కలయికగాని, 1, 2ల కలయికలేదా ఏకజన్య పరివేషమేవైనా ఉత్తరజాత పరివేషము 2తో గాని 3తో గాని కలయిక)

కింది పరివేషాలను ఉత్తరజాత పరివేషాలకింద చూపవచ్చు.

(5) జలోద్భవ పరివేషాలు

(i) భౌతికరణ చెందిన శిలల అంతర్భృమ, విదరజలాలలో

(ii) అభ్యాగత శిలలను కప్పిఉన్నట్టి, అనుకొని ఉన్నట్టి ప్రవాహజన్య పదార్థాలలోని అంతర్భృమ జలాలలో

(iii) ఆర్టిజియన్ జలాలలో (in Artesian waters)

(iv) నిలవ ఉన్న కచ్చాజలాలలో

(v) నదీ ప్రవాహాలలో

(6) వాయుపరివేషాలు

(i) ఆక్సికరణ క్రియాసందర్భంలో నల్లైడ్ ఖనిజాలకు, కార్బోనేట్ శిలల మధ్యసంభవించిన ప్రతిచర్యల కారణంగా ఏర్పడినవి.

(ii) నిలవఉన్న కచ్చాజలాలతో వాటిలోని క్షయకరణ క్రియామూలకంగా ఏర్పడినవి.

(iii) రేడియో ధార్మిక విమలన మూలకంగా ఏర్పడినవి.

(iv) మెర్క్యరీ బాష్పీభవనం చెందినసందర్భంగా ఏర్పడినవి.

ఉపరితల అవశేషాలలోని వినరణపరివేషాల రూపాలు

ఉపరితలపు అవశేషాలలోని వినరణ పరివేషాల రూపాలు భౌతికతృప్త శ్లేథాలతోగాని, లోహభౌతికతృప్త పరివేషాలతోగాని అనురూపంగా ఉండవచ్చు.

విస్తరితపరివేషాలు అవశిష్టాలుగాను, ఏకజన్యాలుగాను ఉన్నట్లయితే స్థానభ్రంశం చెందిన పరివేషాల విషయంలోగాని, మిశ్రమపరివేషాల విషయంలోగాని ఇటువంటి అనురూపత ఉండదు. సమతలంగా ఉన్నచోట ఆధారశీలలో ఖనిజనిక్షేపము విస్తరితం చెందిఉన్నప్పుడు ఆశీలలపై శైథిల్య క్రియవల్ల ఏర్పడిన అవశిష్టాలు స్థానభ్రంశం చెందనప్పుడూ ఉపరితలం మీదఉన్న ఏకకాలజన్య విస్తరిత పరివేషాలు భూమ్యాంతర్భాగంలోని ఖనిజీకరణ మండలాలకు ప్రతిబింబాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ సందర్భాలలో లోహవిస్తరిత ఆధారశీలలలో కన్న విస్తరిత పరివేషాలలో ఎక్కువ క్రమమైనదిగా ఉంటుంది. ఉపరితల నిక్షేపంలో ఆక్సికరణకు సులభ సాధ్యం కాని ఖనిజాలు (కాసిటెర్ట్, ఉల్చమైట్, గోల్డ్,) ఆక్సికరణ క్రియాత్మాదితాలు, అద్రావణీయాలుగా ఉన్న ఖనిజాలు (గెలీనా) ఏదో ఒక కారణంవల్ల ప్రవాహవేగంలో రవాణాచేయబడుతుంటే ఉన్న సర్ప్రైజ్ ఉన్నప్పుడు ఈ క్రమ విస్తరిత మంత ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది.

ఖనిజనిక్షేపం సిలరుపంలో ఉన్నట్లయితే చదునైన ఉపరితలంమీద ఏర్పడిన ఏకకాల జన్యపరివేషానికి తీర్చిదిద్దిన సరిహద్దులుంటాయి. విస్తరితచెందిన ఖనిజీకృత మండలంకూడ అటువంటి ఖనిజ నిక్షేపపు సిరలచుట్టూ ఉన్నట్లయితే పరివేషము విశాలంగా ఉండి కచ్చితమైన సరిహద్దులు లేకుండా ఉంటుంది.

విస్తరిత పరివేషాలు వివిధ సంఘటన గోసాన్లతోను ఆక్సికరణ మండలాలతోను, విరంజితమైన మండలాలతోను అనుబంధించి ఉంటాయి. ఆక్సికరణ మండలము శైథిల్యంచెంది పడిలంలో ఏర్పడినట్లయితే ఉపరితలంమీద ఏర్పడిన విస్తరితపరివేషము ఆక్సికరణమండలపు ఖనిజసంఘటనను సూచిస్తుంది కాని అంతర్భాగంలోని ఖనిజనిక్షేపపు సంఘటనను మూత్రంకాదు. లోహ, ఖనిజ విస్తరిత ఇటువంటి సందర్భాలలో ఎక్కువ దూరం విస్తరిస్తుంది.

స్థానభ్రంశంచెందిన పరివేషాలు నిక్షేపం నుంచి రవాణాఅయిన దూరాన్ని బట్టి ఉపరితలపు వాలునుబట్టి తదితర పరిస్థితులను బట్టి వివిధరూపాలను పొందుతాయి. అందువల్ల ఖనిజనిక్షేపాన్వేషణకు పూర్వము ఉపరితలపరివేషాలు ఏకకాలజన్యాల లేదా ఉత్తరజన్యాల, లేదా ఉత్తజన్యాలయితే స్థానభ్రంశము ఎంత వరకు సంభవించిందో తెలుసుకొని అసలైన ఖనిజనిక్షేపము ఏ ప్రాంతంలో ఉందో విమల చేసుకోవలె. ఈపైన చెప్పిన కారణాలవల్ల లోహవిహీన పరివేషాలుంటే అక్కడ నిక్షేపం లేదని, లోహయుత పరివేషాలున్నంత మాత్రాన

అంతర్భాగంలో నిక్షేపాలుంటాయని అపోహపడకూడదు. ఇతర కాంఛాంశాలను కూడా సావధానంగా పరిశీలించి ఒక నిర్ణయానికి రావలె.

వినరణ పరివేషాలు (Dispersion Halos) ఉపరితలం మీద ఏ విధంగా వినరణ చెందినప్పటికీ లోతున చాలా మార్పులు చెందవచ్చు. ఆక్సికరణ మందలంలో శిలల సంఘటనలో మార్పులు, 'క్లే' మండలాల ఉనికి, కార్బోనేట్ శిలల ఉనికి ఈ పరివేషాలలోని మార్పులకు ముఖ్య కారణాలు.

పరివేషాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకొని దాని ఉపయోగాన్ని సరిగా అంచనా వేయవలెనంటే ఆ పరివేషము ఏర్పడేటప్పుడు ప్రారంభ దశనుంచి అంతం వరకు సంభవించిన భౌతిక, రసాయనిక మార్పులను సరిగా అర్థం చేసుకోవలె. స్థాన భ్రంశం చెందిన పరివేషము నిక్షేపం ఉనికికి ఎంత హెచ్చు దూరంలో ఉంటే అది నిక్షేపపు రూపానికి అంత ఎక్కువ భిన్నంగా ఉంటుంది.

స్థాన భ్రంశం చెందని పరివేషాన్ని బట్టి అంతర్భాగంలో ఉన్న ఖనిజ నిక్షేపపు ఉనికి కాకుండా, దాని పరిమాణాన్ని, ఖనిజీకృత విలువలను అంచనా వేయవచ్చు. పరివేషము స్థాన భ్రంశం చెందకపోతే అంతర్భాగంలో ఉన్న ఆధారశిలలలోని ఖనిజీకృత రాశికి అనుబంధంగా ఉంటుంది.

భూరసాయనిక నిక్షేపాన్వేషణ

ఉపరితల ప్రాచూరి శిలల (Surface mantle rock) లో నిక్షేపాన్వేషణ

ఆధారశిలలను కప్పిఉన్న శిలలలో నిక్షేపాన్వేషణ జరవడమే. అనలైన భూరసాయనిక నిక్షేపాన్వేషణ. ఈ విధమైన అన్వేషణ ఆధారశిలలపై ఉన్న మృత్తిక పొరలలో జరుపుతారు. ఈ మృత్తిక పొరలలో శిలాశైలిల్య అవశిష్టాలు స్థాన భ్రంశం చెందిన ఖనిజ వదార్థాలు, వృణావశిష్టాలు, తదితర జీవ రసాయనిక వదార్థాలు ఉంటాయి. ఈ పొరలలో పరివేషాలు ఏ విధంగా ఏర్పడతాయో ఇంతకుముందు చెప్పడం జరిగింది. ఈ మృత్తిక పొర సంఘటన ఒక్కొక్కచోట ఒక్కొక్క మాదిరిగా ఉంటుంది. వాతావరణ పరిస్థితులు, ఆధారశిలల సంఘటన, ప్రాంతీయ వృక్ష సంపద అంతర్భాగము జలారోహణ ఈ పొరల సంఘటనను నిర్ణయిస్తాయి. భూరసాయనిక నిక్షేపాన్వేషణలో నమూనాలు తీసుకొనే విధానం చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తుంది. ఈ నమూనాలను ఉపరితలం నుంచి ఎంత లోతు వరకు తీసుకోవలె, నమూనాలమధ్య దూరం ఎంత ఉండవలె. నమూనాలను ఎంత పరిమాణంలో తీసుకోవలె? అనేవి ముఖ్యమైన విష

యాలు. నమూనాలను తీసుకొనే లోతు మృత్తిక పొరలు ఏర్పడే ప్రక్రియలను బట్టి ఉంటుంది. ఒకే సర్వేక్షణలో తీసుకొనే నమూనాలన్నీ ఒకే మాదిరిగా తీసుకోవలె. ఎడారి ప్రాంతాలలో ఈ నమూనాలను 15-20 సెం. మీటర్ల లోతు నుంచి కాని, 20-40 సెం. మీటర్ల లోతు నుంచి గాని తీసుకోవలె. ఆర్కి, ఉపఅంధ సరేఖా వాతావరణంలో (In Humid Sub-tropical Environment) అష్టంతో కలిసిన మృత్తిక ఎక్కువగా వీచుడుతుంది. ఈ ప్రదేశాలలో నమూనాలను ఎక్కువ లోతు నుంచి ఎంచుకోవాలి. వీటిని ఎంచుకొనే లోతు 60-120 సెం. మీటర్ల వరకు ఉండవలె. పోడ్జాల్ (Podzol) శైలిలో వాతావరణంలో కూడా నమూనాలను ఎక్కువ లోతులనుంచి (30 నుంచి 50 సెం. మీ) సేకరించవలె. ఈ నమూనాలను తీసుకొనేటప్పుడు నిక్షేపాన్వేషకుడు వివిధ వాతావరణాలలోను మృత్తికలోని నానావిధ సంయోగ పదార్థాల ద్రావణీయతను గురించి తుజ్జంగా తెలుసుకోవలె. కొన్ని సందర్భాలలో నమూనా ఏ కాలంలో తీసుకోవలెనో తెలుసుకోవలె. ఎటువంటి పరిస్థితులలోనూ నమూనాను ఉపరితలంమీద సేకరించ కూడదు. ఎందువల్లనంటే ఉపరితలం మీద వాయువాహకం ద్వారా తీసుకొని రాబడిన ఇసుక, పుష్టి పదార్థాలు కుళ్ళగా ఏర్పడిన “హ్యూమస్” ఉపరితలపు పొరల సంఘటనను మార్చివేస్తాయి. కొంతలోతున తీసుకొన్న నమూనా అంతర్భాగంలో ఉన్న శిలలను సరిగా పోలి ఉంటుంది. బహు లోహ నిక్షేపాల విషయంలో వీటి ఆకీకరణ పరివేషాల తీరును, రూపాన్ని మార్చివేస్తాయి.

లోహ విస్తరణ వివిధ పరిమాణాల రేణువులలోను భిన్నంగా ఉంటుంది. అన్ని పరిమాణాలలోను లోహపు విలువలు ఒకే పరిమితిలో ఉండవు. రేణువులు 0.05 mm నుంచి 0.1 mm పరిమాణంలో ఉన్నప్పుడు లోహాల విలువలు అధికంగా ఉంటాయి. లెడ్ విలువలు మాత్రం అన్ని పరిమాణపు రేణువులలోను ఒకే మాదిరిగా ఉంటాయి. నిక్షేపాన్వేషణ సాగించేముందు ప్రతి ప్రాంతంలోను కొన్ని నమూనాలను పరిశీలించి ఏ రేణు పరిమాణంలో ఏ లోహాలు కేంద్రీకరించబడి ఉన్నాయో చూసుకొని ఫలితాలను వివరణ చేసేటప్పుడు ఏ లోహానికి ఏ రేణు పరిమాణం సరి అయినదో చూసుకొని ఆ విధంగా వివరణ చేసుకోవలె. ఒక ప్రదేశంలో ఒక లోహము ఒకే రేణు పరిమాణంలో కేంద్రీకరించబడిఉంటే మరొక ప్రదేశంలో అదే లోహము మరొక రేణు పరిమాణంలో కేంద్రీకరించబడవచ్చు. ఈ విషయము చాలా ముఖ్యంగా గ్రహించడగినది.

సమూహం పరిమాణము : సాధారణంగా ఉపరితలం నుంచిగాని లోతుల నుంచిగాని సేకరించిన నమూనాలు 10-20 గ్రాముల నుంచి 50 గ్రాముల వరకు ఉండవలె. విశ్లేషణ కోసం కావలసిన 0.5mm 1.0 mm అంశము 15-20 గ్రాములు ఉండేట్లు నమూనాలను తీసుకోవలె. నమూనాలను జాగ్రత్తగా అరచి, 1-0 5mm జలైద ద్వారా పోనిచ్చి చచ్చిన దానిని 15-20 గ్రాములు వుండే టట్లు తగ్గించుకోవలె. ఈ విధంగా పచ్చిన నమూనాను యాంత్రికంగా పొడిచేసి 0.1 mm పరిమాణం కంటే తగ్గించవలె. స్పెక్ట్రోగ్రాఫిక్ విశ్లేషణకు కావలసిన నమూనా కనీసం 6 గ్రాములయినా ఉండవలె. దీనిని చతుర్థాంశాలుగా తగ్గించు కొంటూ మనకు కావలసిన నమూనాను ఎంత తక్కువ పరిమాణంలోనైనా తీసుకోవచ్చు.

పై విధంగా సేకరించిన నమూనాలను కలరిమెట్రీ పద్ధతి ప్రకారం గాని, స్పెక్ట్రోగ్రాఫిక్ పద్ధతి ప్రకారం గాని, సోడియమ్, పొటాసియమ్ మొదలైన వాటిని విశ్లేషించదలచినప్పుడు ఫ్లేమ్ ఫోటో మెట్రిక్ పద్ధతి ప్రకారం గాని విశ్లేషణ చేయవలె.

ఉపరితలం నుంచి నమూనాలను సేకరించడం ఎక్కువగా లెడ్, జింక్, మోలిబ్డెనమ్, టంగ్స్టన్, టిన్, గోల్డ్, వెడకవలసిన పోల్ట బేస్తారు. మాంగనీస్ కోసంకూడా ఈ విధమైన సేకరణ పని చేస్తుంది. వర్షపాతము ఒక మాదిరిగా ఉండి శైథిల్యా వశిష్టాలు హెచ్చుగా ఉన్న భేదిత నైస్థిక స్వరూపమున్న ప్రదేశాలలో ఈ రకమైన పద్ధతి మంచి ఫలితం నిస్తుంది. వర్షపాతము ఎక్కువగా ఉన్న (400-600 mm) ప్రదేశాలలో ఈ పద్ధతి క్లిష్టతరమైనది. జింక్ కావర్ సర్ఫేట్లు ద్రావణీయతగా మారి రవాణా అయ్యే అవకాశం హెచ్చుగా ఉన్నందు వల్ల ఈ క్లిష్ట పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. భాష్పీభవనము తక్కువగా ఉన్నందు వల్ల అంతర్భాగ జలాలు ఉపరితలం మీదికి రావడం తగ్గిపోతుంది. ఈ కారణంగా పరివేషాలు ఉపరితలం మీద కాక కొంచెం లోతులో ఏర్పడతాయి.

నిక్షేపాన్వేషణ - కొన్ని ఉదాహరణలు

లెడ్ :- మృత్తికలోను, వదులైన శిలాపదార్థాలలోను జరిపే భూరసాయనిక నిక్షేపాన్వేషణలో లెడ్ చాలామంచి సూచిక. ఈలోహపు సర్ఫేట్ కార్బోనేట్ల ద్రావణీయత తక్కువ కావడంవల్ల ఇది సంభవిస్తుంది. బహులోహ నిక్షేపాలలోని ఇతరలోహాల సంయోగ ద్రవ్యాలు (Cu, Zn, Ag, లెడ్ సంయోగ పదార్థాల

కన్న హెచ్చుద్రావణీయత కలిగి ఉంటాయి. కాబట్టి అవి కొద్దిదూరం రవాణా అయి నిక్షేపపు కేంద్రీకరణ స్థానంవద్ద లెడ్ కంటే తక్కువ పాళ్లలో ఉంటాయి. ఇవి జలపరివేషాలుగా కూడా ఏర్పడతాయి. ఉపరితలంమీద వీటిపరివేషాలు లెడ్ పరివేషాల నుంచి దూరంగా ఏర్పాటు చెంది వుంటాయి.

శుష్కప్రదేశాలలో (Arid places) శైథిల్యానంతరం ఏర్పడిన లెడ్ సంయోగపదార్థాలు అసలు శిలలున్నచోట కేంద్రీకృతమవుతాయి. లేదా యాత్రికంగా కొంతదూరం మాత్రమే రవాణా అవుతాయి. అందువల్ల ఈ ప్రదేశాలలో ఆరుబయలు భూభాగాలలో లెడ్ కోసం జరిపే భూరసాయనిక నిక్షేపాన్వేషణ చాలా మంచి ఫలితాలనిస్తుంది. వైవిధ్యంగా ఏర్పడిన పరివేషాలు చాలాచిన్నవిగా ఉండి ఉత్పత్తి స్థానానికి చాలా చేరువలో ఉంటాయి. లెడ్ ఖనిజ నిరలనుంచి ఏర్పడిన పరివేషాలు దీర్ఘకారంగా ఉంటాయి. అస్పష్టమైన దీర్ఘకారపు పరివేషాలు విసరణ చెందిన లెడ్ నిక్షేపాలనుంచి ఏర్పడతాయి. ఈ విసరణ ఏకజన్యమై చాలా విస్తీర్ణాన్ని ఆక్రమించినట్లయితే పరివేషము దీర్ఘకారంగా ఉండక ఏకరీతిలో (Uni form) ఉంటుంది. భేదిత భూభాగాలలో లెడ్ ఆక్సైడ్లలో ఉన్న అద్భుత శిలాపదార్థాలు వాలుల కింది భాగానికి జారిన కారణంగా లెడ్ పరివేషాలలో వృద్ధి గాని ఊణితగాని సంభవించవచ్చు. వాలుపీఠం వద్ద లెడ్ ఖనిజాలు ఎక్కువగా కేంద్రీకరింపబడటానికి అవకాశముంది. హెచ్చుభాగం యాంత్రికపరివేషాలుగా ఏర్పడతాయి ఒక్కొక్కప్పుడు ఒండలి పీఠన పరివేషాలు కూడా ఏర్పడతాయి. చిన్న చిన్న లోయలలోని ఒండ్రుమట్టిలోని లోహపు శతాల ఆనవాళ్లను గుర్తించేవిప్పుడు, ఈలోహాల ఉత్పత్తిస్థానాలను కనుక్కోవడం, ఇందు మూలంగా దీనితరవాత ఓరిపింజే భూరసాయనిక నిక్షేపాన్వేషణ సులభమవుతాయి. అయినా ఈ సందర్భాలలో లోయ ఆకారము ఒండ్రుమట్టిలోని రేఖపరిమాణంలో మార్పులు, భావలో హంశలలోని ఖనిజ సంఘటనలను దృష్టిలో ఉంచుకొని అన్వేషణ సాగించవలె.

ఉపరితల ప్రావారం (Surface mantle) 2 లేదా 3 మీటర్ల మందం కన్న తక్కువగా ఉన్నచోట్ల లెడ్ పరివేషాలు యాంత్రిక పరివేషాలుగా ఉంటాయి, కొన్ని చాలా అరుదైన సందర్భాలలో చాలా అరుదైన సందర్భాలలో చాలా బలహీనమైన రసాయనిక పరివేషాలు మాత్రమే ఉండవచ్చు ప్రావారపు మందం హెచ్చుగానున్న చోట్ల లెడ్ పరివేషాలు ఉపరితలం మీద ఉండక చాలా లోతులో

ఉండి బోర్హాల్ ల సహాయంతో మాత్రమే గుర్తించడానికి వీలయినవిగా ఉంటాయి.

లెడ్ పరివేషాలున్న చోట్ల జింక్, బేరియమ్ స్ట్రాంషియమ్ పరివేషాలు కూడా ఉంటాయి. సిల్వర్ బిస్మత్ పరివేషాలు అరుదుగాను అంటిమెసి, మోలిబ్డెనమ్ వెనేడియమ్ పరివేషాలు చాలా అరుదుగాను కనిపిస్తాయి.

జింక్ :- ఉపరితల పరిసరాలలో జింక్ ప్రవర్తనలో చాలా మార్పులు ఉంటాయి. జింక్ నిక్షేపంలోని ఖనిజమైన స్పెల్డైట్ సులభంగా ఆక్సికరణ చెందే కారణంగా జింక్ ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తుంది. స్పెల్డైట్ ఆక్సికరణం చెందగా ఏర్పడిన జింక్, నల్ఫేట్ చాలా సులభంగా కరిగిపోతుంది. మరొక వైపు జింక్, కార్బోనేట్ శిలలకు “క్లే” ఖనిజాలకు అతుక్కొని పోతుంది. జింక్ సంయోగ పదార్థాలు ఆప్లుద్రావణాలలో చాలా సులభంగా కరుగుతాయి. కాని తటస్థ షార్ద్రావణాలలో ఇవి అవశేషాలుగా నిలిచిపోతాయి,

వృషాల పృద్ధిలో జింక్, చాలా ప్రముఖమైన పాత్ర వహిస్తుంది. ఇందువల్ల చాలా ప్రదేశాల మృత్తికలో జింక్, శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. రష్యన్ భూరసాయనిక శాస్త్రజ్ఞుడైన విస్గ్రావమ్ అంచనా ప్రకారం మృత్తికలోని జింక్, సరాసరి శాతం 0.005 ఆప్లుద్రావణాలు మూలంగాను. కొంతవరకు షార్ద్రావణాలు మూలంగాను, మృత్తికపోరలలోని జింక్ నిష్కర్షించబడుతుంది. సంఘటనను బట్టి జీవరసాయనిక సంయోగ పదార్థాలు జింక్ చలనాన్ని తగ్గించడంగాని, ఎక్కువ చేయడంగాని చేస్తాయి. ఈ పైన చెప్పబడిన కారకాలన్నీ జింక్ పరివేషాలేర్పడటంలో వాటి తీరతెన్నులలోను ప్రతిబింబిస్తాయి.

జింక్ సంయోగ పదార్థాలు శుష్క ప్రదేశాలలోను, షాలియానకాలలోను, కార్బోనేట్ శిలలలోను ఎక్కువదూరం రవాణా అవుతాయి. ఈ వాతావరణాలలో అవి స్మిత్సోనైట్ గాను, కేలమిన్ గాను అవశేషణ చెందుతాయి, ఇదికాక “క్లే” ఖనిజాలు జింక్ ను గ్రహిస్తాయి. జింక్ ను గ్రహించే “క్లే” ఖనిజాలలో మాండ్రెమొరిథోనైట్ ముఖ్యమైనది. ఈ కారణంగా “క్లే” ఖనిజాలలో జింక్ పరిమాణము చాలా పెంచుతగ్గులుగా ఉంటుంది. ఆర్త్రోశిస్టోస్థితి గల ప్రదేశాలలో ఉపరితలపు పొరలనుంచి జింక్ తొలగింప బడటానికి వాతావరణము అనుకూలమైనప్పటికీ శైథిల్యావస్థ పదార్థాలలో జింక్ పరిమాణము ఎక్కువగా వుంటుంది జీవరసాయనిక

పదార్థాలలో జింక్ కేంద్రీకృతమవుతుంది. భనిజాల నృటిక నిర్మితిలోని జింక్ పునఃస్థాపన చెందనిది. ఇదీ కాకుండా అనంతర భనిజాలలో కేంద్రీకృతమై ఉన్న జింక్ వల్ల కూడా ఈ జింక్ హెచ్చుపరిమాణంలో ఉంటుంది.

జింక్ కేంద్రీకరణ జరగడంలో ఊర్ధ్వ మండలీకరణను కూడా మనము దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. మృత్తిక పొలాలలోని వై భాగంలో ఆమ్ల పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటి కింది పొలాలలో ఆమ్లత తక్కువగా ఉండి దిగువకు పోను పోను బలహీనమైన ఊర మండలాలు ఉంటాయి. ఈ దిగువ పొలాలలో చాలా సందర్భాలలో జింక్ మళ్ళీ ఆపక్షేపణ చెందడానికి అవకాశముంది. ఈ విధంగా మృత్తిక దిగువ పొలాలలో జింక్ కేంద్రీకృత మవుతుంది. ఆధారశిలలలో జింక్ ను సేకరించుకొన్న అంతర్భాగ జలాలు ఉపరితలానికి వచ్చేటప్పుడు మృత్తిక దిగువ పొలాలలో కొంత జింక్ ను విడిచిపెడతాయి.

జింక్ విక్షేపణ పరివేషాలు లెడ్ పరివేషాలకంటే చిన్నవిగా ఉండి చిన్న చిన్న కేంద్రాలుగా ఏర్పడతాయి. అన్ని రకాలైన ఆధారశిలలలోను జింక్ భనిజీకరణ విస్తరణ చెందిన కాంజం వల్ల జింక్ పరివేషాలను శోధించేటప్పుడు అన్వేషకుడు తగిన జాగ్రత్త వహించవలె. జింక్ పరివేషాల విషయంలో మిగిలిన విలక్షణ మూలకాలను (Typical elements) కూడా పరిశోధించవలె. ఉపరితలపు మృత్తిక పొలాల నుంచి కింది భాగానికి జింక్ పరివాహం అవుతుంది. కాబట్టి అన్వేషణ జరిపే సమయంలో జింక్ కేంద్రీకరణ యొక్క ఉపరితల భాగాల్లో కాకుండా కొద్దిలోతు వరకు తీసిన బోర్ హోల్ లలోని నమూనాలలో కూడా శోధించవలె. ఈ విధంగా చేయకపోతే ఉపరితలంలో జింక్ లేకపోవడంతో ఆ ప్రదేశంలో జింక్ భనిజీకరణ లేదనే అపోహ కలుగుతుంది. బోర్ హోల్ ల నుంచి నమూనాలను వివిధ లోతుల నుంచి సేకరించవలె.

కావర్ :- కావర్ అన్వేషణ చాలా క్లిష్టమైనది. కావర్ భనిజాలు చాలా చిల్లలున్నాయి. దీని భూరిసాయనిక ప్రవర్తన చాలా క్లిష్టమయినది. అన్వేషణ జరిపే ముందు ఆ ప్రదేశంలోని ఆధారశిలలను బట్టి, కావర్ ఏ రకమైన భనిజంగా లభ్యమవుతుందో విశదంగా తెలుసుకోవలె. తరువాత, భూరిసాయనిక సూచికలను ఎంచుకోవలె.

కావర్ భూరిసాయనిక ధర్మాలు జింక్ ధర్మాలను పోలి ఉంటాయి. కావర్ సల్ఫైడ్ చాలా సులభంగా ద్రావణీయమయ్యే సంయోగ పదార్థము. కావర్

కార్బోనేట్లయిన మాలక్రైట్, అజురైట్, కాపర్ నిలికేట్లు తక్కువ ద్రావణాంకంలో, ఊరద్రావణాలలోను చాలా తక్కువగా ద్రావణీయం అవుతాయి. ఆమ్ల ద్రావణాలలో వీటి ద్రావణీయత కొంచెం హెచ్చుగా ఉంటుంది. “క్లే” ఖనిజాలకు కాపర్ ధాతువు చాలా సులభంగా అతుక్కుని ఉంటుంది. అంతే సులభంగా ఈ ధాతువు “క్లే” ఖనిజాలనుంచి ఆమ్లద్రావణాల సహాయంతో విసరణ చెందుతుంది. మౌలిక అధారశిలలలోని కాపర్ శాతము ఆమ్ల ఆధారశిలలలో కన్న కొంచెం హెచ్చుగా ఉంటుంది. అతి ఆమ్ల మృత్తికలలోని కాపర్ శాతం హిస ఆమ్లపు ఊర మృత్తికలలోని కాపర్ శాతంకన్న తక్కువగా ఉంటుంది. పీట్ (Peat) మృత్తిక లోని కొన్ని జీవ సంబంధ పదార్థాలు కాపర్ను నిలిప చేస్తాయి; మరికొన్ని ఈ ధాతువును సులభ ద్రావణీయ పదార్థంగా మార్చివేస్తాయి.

వాతావరణము ఎటువంటిదయినప్పటికీ, మృత్తిక ఏర్పడే ప్రక్రియలలో ఎంత విభేదమున్నప్పటికీ కాపర్ శాతం హెచ్చుగానున్న ఆధారశిలల మీద, ఏర్పడిన మృత్తిక పొలంలో ఈ లోహపు శాతం హెచ్చుగా ఉంటుంది. హ్యూమస్ (Humus) శాతం ఎక్కువగానున్న ఊర మృత్తిక పొలంలో కూడా కాపర్ శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందువల్లనంటే ఈ మృత్తిక పొలంలోని కాపర్ జీవసంబంధ కాంప్లెక్స్‌లతో ముడిపడి ఉండి ఎటువంటి ద్రావణం సహాయంతోనూ వేరు కాబడే అవకాశం కలిగి ఉండదు. ఊరమృత్తికలో వై పొలంలోను, ఆమ్ల మృత్తికలో ఏగువ పొలంలోను కాపర్ శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ కారణాల మూలంగా కాపర్ కోసం జరిపే ఉపరితల సర్వేక్షణ వాతావరణ పరిస్థితులు, ఖనిజ సంయోగము, అశ్మపిష్టాసము, మృత్తిక పరిసరాలనుబట్టి, వివిధ ఫలితాలనిస్తుంది. అందువల్ల సర్వేక్షణ ఫలితాలను అర్థం చేసుకొనేముందు ఆ ప్రదేశంలో వైన ఐక్వివ కాణాలను, కాపర్ పరిమాణం మీద వాటి ప్రభావాన్ని నడిగా అర్థం చేసుకోవలె.

సంపత్కర పట్టపాటము 200-250 ఘ. మీ. చుట్టు పరిమితమై ఉన్న ఎడారి పరిసరాలలో శ్రీ ఫిల్మక్రియ హెచ్చుగా శారమంతమై ఉంటుంది. ఇటువంటి పరిస్థితులలో కాపర్ చాలా తక్కువ దూరం దివాడా అయి యెక్కువ శాతం బేసిక్ కార్బోనేట్‌గాను, హైడ్రోసిలికేట్‌గాను ఛాల్కోనైట్‌గాను కేంద్రీకృత మవుతుంది. ఈ విధమైన కేంద్రీకరణ ఉపరితల పరిసరాలలో కాపర్ పరివేషా లేర్పడటానికి చాలా వీలుగా ఉంటుంది. “క్లే” ఖనిజాలు కాపర్ను వీల్చుగల

శక్తి కూడా ఈ పరివేషాలు ఏర్పడటానికి దోహదం చేస్తుంది. ఇటువంటి పరిస్థితులలో ఏర్పడిన విశ్లేషణ పరివేషాలు ఆర్థికంగా ఫలవంతమైన నిశ్లేపాల చేరువలోనే కాకుండా, ఫలహీనమైన విసరణ నిశ్లేపాల చేరువలో కూడా ఏర్పడతాయి. ఈ విధంగా ఏర్పడిన కృత్రిమ పరివేషాలను అందులోని కాపర్ నంయోగ పదార్థాల కాంతిమంతమైన రంగుల వల్లనూ, పరిసరాలకన్న పరివేషాలలో ఉన్న అధిక కాపర్ పరిమాణం వల్లనూ గుర్తించవచ్చు. కాపర్ నిశ్లేపాన్వేషణలో ఈ కృత్రిమ పరివేషాలను సరిగా గుర్తించి సర్వేక్షణ చేయడం ఎంతైనా అవసరము.

సందేహాస్పదమైన సందర్భాలలో సర్వేక్షణ కాలంలో కాపర్ అనలైన ఉనికిని, మృత్తికలోని కాపర్ పరిమాణం సహాయంతోనే కాకుండా, అసార్ ఖనిజాలలోను, కొన్ని ఋఖ్య మూలపదార్థాలతోను (Pb, Ag, Co, Mo, As, Sb.) కాపర్ కున్న అనుబంధం సహాయంతో కూడా సరిగా గుర్తించవలె. సర్వేక్షణ స్థానం గురించి అశ్రువిజ్ఞానము ప్రాథమిక ఖనిజీకరణ ఎక్కడ ఉందో కనుక్కోవడానికి సహాయకారిగా ఉంటుంది.

కాపర్ నిశ్లేపాలున్నచోట్ల ఏర్పడిన ఐరన్ గోసాన్లు, బాహ్య రూపంలో అవశేష శిలలలో ఏర్పడిన ఐరన్ గోసాన్ల మాదిరిగా ఉన్నప్పటికీ వాటిని కాపర్ లోహంతో అనుబంధించి ఉండే మూలకాలు అయిన (Co, Ni, As, Pb, Zn, Se, Te ల కోసం విశ్లేషణచేసి గుర్తించవచ్చు. ఇవి కాకుండా కాపర్ నిశ్లేపాల వద్ద ఏర్పడిన గోసాన్ల నుంచి తీసిన ఐరన్ హైడ్రాక్సైడ్ల నుంచి నీటి సారము (extract) స్వల్పంగా ఆప్లుయతమై ఉంటుంది. అవశేష శిలల మీద ఏర్పడిన గోసాన్ల నుంచి ఇదే మాదిరిగా తీసిన సారము స్వల్పంగా శూర యుతమై ఉంటుంది. అదీగాక ఈ రెండవ సారము Mn, Sr, Ni, Zn మూలకాలతో అనుబంధించి ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఆప్లుయత సారము కాపర్ నిశ్లేపాన్వేషణకు-ముఖ్యంగా ఛార్కోపైరైట్ నిశ్లేపాలకు-ఒక సహాయకారిగా పనిచేస్తుంది. మోలిబ్డనమ్ విలువలు కాపర్-పోర్ఫిరీ (Copper Porphyry) నిశ్లేపాన్వేషణలో సూచికలుగా సహాయపడతాయి. స్కార్న్ (Skarn) నిశ్లేపాన్వేషణలో బోరాన్ విసరణను వివరంగా తెలుసుకొంటే నిశ్లేపం ఉనికిని సులభంగా కనుక్కోవచ్చు.

శిలల నుంచి ప్రత్యక్షంగా మృత్తిక ఏర్పడినప్పుడు ఆ మృత్తికలోని కాపర్ పరిమాణము శిలలలోని కాపర్ పరిమాణంతో సమానంగా ఉంటుంది.

పర్యత వాలుల మీద ఏర్పడిన మృత్తకపౌర మందం హెచ్చుగా ఉండి నిక్షేపం ఏసరణచెంది ఉన్నట్లయితే ఆ మృత్తకలోని కాపర్ ఖనిజాల పరిమాణం తగ్గుతుంది. నిక్షేపము స్థూలమై ఉండి మృత్తక పౌర వలుచుగా ఉన్నట్లయితే ఆ మృత్తక పౌరలోని కాపర్ ఖనిజాలు భగవంత మవుతాయి. పర్యతపు వాలు పీఠంవద్ద కాపర్ యొక్క యాంత్రిక పరివేషాలేర్పడవచ్చు.

కాపర్ నిక్షేపపు శిలల మీద ఏర్పడిన మృత్తక పవనాల వల్ల రవాణా పొందిన మృత్తకతో కలయిక చెందినందు వల్లగాని, యాంత్రికరవాణా చెందిన పదార్థాల సమ్మేళనం వల్లగాని కాపర్ విలువలు విగువనున్న శిలలలో కన్న మృత్తకలో తక్కువగా ఉంటాయి. సున్నపు రాతిలోగాని, డోలమైట్లోగాని, కాపర్ ఖనిజీకరణ జరిగినప్పుడు శైథిల్యక్రియ తరవాత వైన ఏర్పడిన మృత్తక లోని తాచుపు విలువలు విగువ శిలలలో కంటే హెచ్చుగా ఉంటాయి. క్వార్ట్జైట్, షేల్ మొదలైన శిలలలో శైథిల్యక్రియ తరవాత కాపర్ విలువలలో ఎక్కువ మార్పులు లేకపోవచ్చు. బ్రెక్సియా, కంగ్గోమరేట్లలోని కాపర్ ఖనిజీకరణలో శైథిల్యక్రియ తరవాత కాపర్ విలువలు తగ్గవచ్చు.

ఆర్థికపరమైన ఖనిజీకరణ మండలం చుట్టూ విసరణ ఖనిజీకరణ మండులము ఉంటుంది. ఈ విసరణ మండలం నుంచి ఏర్పడిన మృత్తకలోని కాపర్ విలువలకు, ఆర్థికపరమైన కాపర్ నిక్షేపాలకు ప్రత్యక్ష సంబంధము ఉంటుంది. విసరణ ఖనిజీకరణ మాత్రమే ఉన్న ప్రదేశాలలో ఏర్పడిన మృత్తకలో కృత్రిమ పరివేషాలు మాత్రం ఏర్పడతాయి ఖనిజ నిక్షేపం ఉపరితలానికి సమీపంగా ఉన్నప్పుడు దీని ఫలితంగా ఏర్పడిన పరివేషము నిక్షేపం వాలుకు విగువభాగంలో కొద్దిదూరంలో ఉంటుంది. అయినప్పటికీ నిక్షేప స్వరూపానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక ప్రాముఖ్యం ఉన్న నిక్షేపాన్ని మందమైన అపక్షేపశిలలు కప్పి వేసినప్పుడు ఏర్పడిన పరివేషాలు నిక్షేపపుచురుల అనుగుణంగా ఉంటాయి. ఈ పరిస్థితిలో పరివేషంలోని కాపర్ విలువలు హెచ్చుగా ఉండవు. ఒండ్రుమట్టిలో ఏర్పడిన పరివేషాలు ఖనిజ నిక్షేపానికి కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండవచ్చు. అదేచోట అంతర్భ్రమ, ఉపరితల జలాలలో కాపర్ ధాతువు లేకపోవచ్చు. దీనికి గల కారణము ఒండ్రుమట్టిలో కాపర్ ఖనిజాలు యాంత్రికంగా నిక్షేపితం కావడమే. నీటిలో కొద్దిపాటిగా ద్రావణీయస్థితిలో ఉన్న కాపర్ ఎక్కువగా రవాణా కావడానికి అవకాశము ఉండటం దీనికి రెండవ కారణము హిమానీనదీ పదార్థా

లున్న చోట కాపరీ నిక్షేపాన్నేషణకు భూరసాయనిక పద్ధతి ఉపయోగము తక్కువ.

మోలిబ్డినమ్ :- మోలిబ్డినమ్ ధాతువుయొక్క ముఖ్య ఖనిజము మోలిబ్డినైట్. ఉపరితలపు పరిసరాలలో ఈ ఖనిజము ఆక్సికరణం చెంది ద్రావణ రూపంలో రవాణా అవుతుంది. పరిసరాలనుబట్టి ఉపరితలంలో 10 నుంచి 100 మీటర్ల లోతువరకు గాని, 50 నుంచి 60 మీటర్ల లోతువరకుగాని మోలిబ్డినమ్ ద్రావణరూపంలో రవాణా అవుతుంది. ఈ కారణాలవల్ల నిక్షేపాలున్నచోట్ల ఉపరితలభాగంలో ఋణాత్మక అసంగతాలు (Negative anomalies) ఏర్పడతాయి.

రవాణాకు అవకాశంలేని ప్రదేశాలలో మోలిబ్డినపు పరివేషాలు నిక్షేపం నిరంతరం లోహపు విలువనుబట్టి ఉంటాయి. శుష్కవాతావరణ ప్రాంతాలలో అంతర్భూమిజలం ఉపరితలానికి రావడంవల్లనూ, ద్రావణాలను మొక్కలవేళ్ళు పీల్చడం వల్లనూ పరివేషాలలో మోలిబ్డినమ్ కేంద్రీకృతమవుతుంది. ఉపరితల జలాలలో మోలిబ్డినమ్ ప్రాథమిక ఖనిజాలుగానూ, అనంతర ఖనిజాలుగానూ ఏర్పడవగా రవాణా అవుతుంది. రసాయనిక సంయోగపదార్థాలుగానూ మరియు ఇతర ఖనిజాలకు హత్తుకొనినూడా మోలిబ్డినమ్ రవాణా చెందుతుంది. చుట్టూ ఏర్పడే తీరుకు మోలిబ్డినపు పరివేషాలు ఏర్పడటం మీద పెద్ద ప్రభావం ఉంటుంది.

టంగ్ స్టన్ :- శిలా పదార్థాలలో టంగ్ స్టన్ విలువను నిర్ధారణ చేయడానికి స్పెక్ట్రోగ్రాఫిక్ పద్ధతికంటే కలరిమెట్రిక్ పద్ధతే సులభమైనది. మొదటి పద్ధతిలో టంగ్ స్టన్ విలువ 0.01 % వరకు నిర్ధారణ చేయబడుతుంది. అంతకు తక్కువ విలువలను ఈ పద్ధతితో కనుక్కులేము. కలరి మెట్రిక్ పద్ధతిలో 0.001% వరకు ఉన్న టంగ్ స్టన్ను కనుక్కువచ్చు.

టంగ్ స్టన్ ముఖ్య ఖనిజాలైన ఉల్పైటైట్, వీలైట్ శైథిల్యక్రియను బాగా నిరోధిస్తాయి. అందువల్ల శైథిల్యమండలంలో టంగ్ స్టన్ విలువలు పెద్దవుతాయి. కాని తగ్గవు. సున్నిత రేణుపదార్థాలుగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఈ ఖనిజాలు శిథిలం చెందడానికి అవకాశముంది.

ఉల్పైటైట్, ఐరన్ సల్ఫైడ్లు శిథిలం చెందేటప్పుడు ఐరన్ హైడ్రాక్సైడ్, టంగ్ స్టన్ ట్రైఆక్సైడ్ల మిశ్రమ మేర్పడుతుంది. ప్రాథమిక ఖనిజాలతో కలిసి ఉన్న మాంగనీస్ ఆక్సికరణంచెంది ఆప్టయుత పరిసరాలలో రవాణా అవుతుంది.

శైలిక్రియ హెచ్చుతున్నకొద్దీ ఉల్ట్రామైట్ మరింత ఎక్కువగా వినియోగించి పెర్రిటంగ్ స్టైట్ తోగాని (Ferri-Tungstite), యిర్ హైడ్రాక్సైడ్ తోగాని ప్రతిష్ఠాపన చెందు జరుగుతుంది. పునరాకలో ఆప్టుత్వము తగ్గి ఉత్పత్తవ్వకాని, ఆకర్షకతాని పెంచినప్పుడు, యిర్ హైడ్రాక్సైడ్ అవశేష మేర్పడుతుండగా మాంగనీస్ డై ఆక్సైడ్ అవశేషము ప్రారంభమవుతుంది. ఈ కొత్త వాతావరణంలో టంగ్ స్టైట్ యిర్ ఆక్సైడ్ కొంతవరకు వివాణాకావడానికి అవకాశముంది.

ఉపరితల అంతర్భాగము జలాల శుష్క అవశిష్టాంతో ఆకర్షకత్వము టంగ్ స్టైట్ కనిపించవచ్చు. కొన్ని మొక్కలను కాల్చగా మిగిలిన బాడియో కొంతవరకు టంగ్ స్టైట్ ఉంటుంది మృత్తిక పొరలతో టంగ్ స్టైట్ ఉంటుందని చెప్పుకోవడానికి తగినంత ఆధారం లేదు.

ఉపరితలంలో బహుళతమై ఉన్న ఉల్ట్రామైట్ కొన్ని మీటర్ల లోతువరకు వినియోగించి అందులోని యిర్, మాంగనీస్ అవశిష్టాలుగా మృత్తిక పొరలలో దామరి, టంగ్ స్టైట్ మాత్రం ఆ ప్రదేశం నుంచి రవాణా అయి పురపూలు కొన్ని ఉన్నాయి. పీర్ట్ వోహడా ఇవేమానిగా నిర్మించును వివాణా అవుతుంది. కొన్ని సందర్భాలలో టంగ్ స్టైట్ తో ప్రత్యక్షపర చెందుతుంది.

మోర్టిన్ మైట్, టంగ్ స్టైట్ ఖనిజాలు కలిసి ఉన్న సందర్భాలలో పట్టుకొని మోర్టిన్ మైట్ విశేష పరివేషాలు టంగ్ స్టైట్ పరివేషాల కన్న విశాలంగా ఉంటాయి. దీనికిగల కారణము శైలిక్రియలో మోర్టిన్ మైట్, టంగ్ స్టైట్ లు ఏక విభేదము. పరివేషాలలో టంగ్ స్టైట్ చాలా సున్నిత రేఖపదార్థాలైన ఖనిజరూపంలోగాని లేదా టంగ్ స్టైట్ పీల్చుకొని విశేషం చెందిఉన్న ఖనిజరేఖలుగా గాని నిర్మించడం జరుగుతుంది. శైలిక్రియ తక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాలలో టంగ్ స్టైట్ పరివేషాలను సున్నిత రేఖరూపంలో ఉన్న దాని ఖనిజాల ఉనికినిబట్టి నిర్మించవచ్చు. శైలిక్రియ హెచ్చుగా ఉన్న ప్రాంతాలలో పరివేషాలకు ప్రాంతీయపదార్థాల సైక్లోగ్రాఫిక్ విశ్లేషణవల్ల నిర్మించవచ్చు.

టంగ్ స్టైట్ ఖనిజాలకు శైలిక్రియ సెరోఫోరక్టి గొప్పగా ఉన్నందు వల్ల టంగ్ స్టైట్ లోహం తోనం చేసే భూరసాయనిక సర్వేక్షణలో చాలా ఖనిజ విశిష్టతలు కూడా చెందువలె. శైలిక్రియకు చాలావీలుగా ఉన్న శీత పదార్థాలలో నున్న క్వార్ట్జ్-ఉల్ట్రామైట్ సీరలవై భాగంలో టంగ్ స్టైట్ కేంద్రీకీకరణ తక్కువగా

ఉండి శైథిల్య క్రియానిరోధకతైన శింబర్తోని టంగ్స్టన్ నికలమీద టంగ్స్టన్ కేంద్రీకరణ ఎక్కువగా ఉంటుంది.

టిన:- టిన్ కోసం చేసే భూరసాయనిక నిశ్చేపాన్వేషణ చాలా మంచి ఫలితాల నిస్తుంది. భూరసాయనిక నిశ్చేపాన్వేషణ ద్వారా నిర్ణయించిన టిన్ ఖనిజ నిశ్చేపం సరిహద్దులు వివరంగా చేసిన సర్వేక్షణలో ఏర్పడిన సరిహద్దులతో ఏకీభవించి ఉంటాయి. టిన్ నిశ్చేపాలకోసం భూరసాయనిక సర్వేక్షణలో పరిశోధనలు చేసిన సోవియట్ శాస్త్రజ్ఞుడు ఓజిరప్ అభిప్రాయం ప్రకారం శిలలలో 0.05% తగరపు విలువలున్నట్లయితే అవి నిశ్చేపం ఉనికికి మంచి సూచనలుగా తీసుకోవచ్చు. ఈ శాస్త్రజ్ఞుని ప్రకారం తగరపు నిశ్చేపాలకోసం సర్వేక్షణ విశాలమైన ప్రదేశాలలో (5 నుంచి 10 చ. కి. మీ. వరకు) సాగించవచ్చు. ప్రతి 100 లేదా 200 మీటర్లకు ఒక పార్క్వరేభాకృతిని తీసుకొని నమూనాలను ప్రతి 25 లేదా 50 మీటర్లకు, 0.5 మీటర్ లోతులో ఎంచుకోవాలి. శిలలలోని టిన్ ఖనిజాల రూపంలోగాని లేదా ఇతర ఖనిజాలలో సమన్వయావ మిశ్రమంగా గాని ఉంటుంది. ఈ కారణంవల్ల టిన్ కోసం భూరసాయనిక సర్వేక్షణ ఫలితాలను విపులీకరించడానికి ముందు ఈ లోహము ఆ శిలలలో ఏ రూపంలో ఉందో తెలుసుకోవడం చాలా అవసరము.

టిన్ నిశ్చేపాలు క్వార్ట్జ్ - కాన్సైరైట్ కు సంబంధించినవి గాని, సల్ఫైడ్ - కాన్సైరైట్ కు సంబంధించినవి కాని అయిఉండవచ్చు. మొదటి రకపు వాటి సర్వేక్షణలో టిన్ విలువలు తక్కువగా ఉంటాయి. రెండవ రకపు నిశ్చేపాల సర్వేక్షణలో లోహపు విలువలు హెచ్చుగా ఉంటాయి. ఈ లోహపు విలువల హెచ్చుతగ్గులలో వాతావరణపు ప్రభావం కూడా కనిపిస్తుంది. శీతల వాతావరణంలో శైథిల్యక్రియకు సానుకూలత తక్కువ కాబట్టి పరిశేషాలలోని లోహపు విలువల కన్న నున్నిత ఖనిజరేఖ పదార్థాలకే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యము ఇవ్వవలసి ఉంటుంది.

టిన్ నిశ్చేపాల సమీపంలోనున్న మొక్కలలో టిన్ కేంద్రీకృతమవుతుంది. ఉపరితలపు మృత్తిక పొరలలో సాధారణంగా టిన్ కేంద్రీకృతం కాదు. కింది పొరలలో ఎక్కువగా చేరుకొంటుంది.

గోల్డ్ : గోల్డ్ శిలలలోను, స్ఫుర్తికలోను, జలాలలోను చాలా తక్కువ పరిమాణంలో వుండును. ఈకారణవల్ల నిక్షేపాన్వేషణకు శిలా పదార్థాలలో గోల్డ్ ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి చాలా కష్టతమైన, సున్నితమైన విశ్లేషణ పద్ధతి చాలా అవసరము. శిలలలోని గోల్డ్ పరిమాణము రసాయనిక విశ్లేషణం వల్లగాని, స్పెక్ట్రోగ్రాఫిక్ విశ్లేషణవల్లగాని కనుక్కోవడం చాలా కష్టము. స్పెక్ట్రోగ్రాఫిక్ విశ్లేషణంలో ప్రత్యేకపద్ధతని ఉపయోగించి ఈ గోల్డ్ పరిమాణాన్ని కనుక్కోవచ్చు. గోల్డ్ కోసం అన్వేషణ కొనసాగించేప్పుడు గోల్డ్ ఖనిజాలతో కలిసి ఉన్న అసార ఖనిజాల కోసం అన్వేషణ సాగిస్తే ఫలితాలు బాగుంటాయి. ఒక్కొక్కరికీమైన గోల్డ్ నిక్షేపానికి ఒక్కొక్కరికీమైన అసార ఖనిజ సముదాయముంటుంది.

గోల్డ్ నిక్షేపాలు ప్రైరైట్ ఖనిజాలతో కలిసి ఉంటాయి కాబట్టి ప్రైరైట్ నిక్షేపాన్వేషణకు ఏ ఖనిజ సూచికలను ఉపయోగించుకొంటామో వాటినే గోల్డ్ నిక్షేపాలకు కూడా ఎన్నిక చేసుకోవాలి. ప్రైరైట్తో కలిసిఉన్న గోల్డ్ నిక్షేపాలను వెదకడానికి సిల్వర్, లెడ్, జింక్, ఆర్సెనిక్, అంటిమోని, సెలీనియమ్, టెలూరియమ్ల కోసం శిలాపదార్థాలను విశ్లేషణ చేయవలె. గోల్డ్ నిరలకోసం అన్వేషించే సంవర్షాలలో సిల్వర్ సెలీనియమ్, టెలూరియమ్, లెడ్ల కోసం విశ్లేషణచేస్తే ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. సెలీనియమ్, టెలూరియమ్లకు మాత్రం ప్రత్యేక విశ్లేషణ పద్ధతని ఉపయోగించవలె.

నిరల రూపంలో ఉన్న గోల్డ్ నిక్షేపాలను వెదకే సంవర్షాలలో నిక్షేపపు బహిర్గతనిరలనే కాకుండా వాటిని కప్పి ఉన్న మృత్తికపొరలను, వాటికి నమీ పంలో ఉన్న మృత్తిక పొరలనుకూడా సిల్వర్ పరిమాణం కోసం పరిశోధించవలె. క్వార్ట్జ్ సిల్వర్-గోల్డ్ నిరలనుంచి నమూనాలను తీసుకొనేప్పుడు స్థూలభాగము, సున్నితభాగము రెండూ తీసుకోవలె. ఎందువల్లనంటే గోల్డ్ యిత సిల్వర్ సున్నితరేణు భాగాలలోనే కాకుండా స్థూలరేణు భాగాలలోకూడా ఉంటుంది. రసాయనిక విశ్లేషణ పద్ధతిలోను, స్పెక్ట్రోగ్రాఫిక్ విశ్లేషణ పద్ధతిలోను సిల్వర్ సున్నితత్వాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని గోల్డ్ నిక్షేపాన్వేషణలో సిల్వర్ను చక్కటి సూచికగా ఎన్నుకొవచ్చు.

సెలెన్, రోజార్ట్, క్రోమియమ్ :- సెలెన్, రోజార్ట్, క్రోమియమ్ల కోసం చేసే నిక్షేపాన్వేషణ అతిమౌలిక శిలలలోను, వాటినుండి ఏర్పడిన అంఫి

బొటైట్‌లలోను (amphibolites) ఉన్న ఈ లోహాల పరిమాణం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సాధారణంగా అతి మౌలికశిలలలో 0.2 నుంచి 0.25% వరకు నికెల్, 0.02% కోబాల్ట్ 0.2% క్రోమియం ఉంటాయి. శైథిల్యక్రియానంతరం ఈ శిలలలోని సులభద్రావణీయ పదార్థాలన్నీ రవాణా అయిన తరువాత నికెల్ హైడ్రోసిలికేట్ నిక్షేపాలు, కోబాల్ట్ నిక్షేపాలు అవశిష్టాలుగా మిగిలిపోతాయి. శైథిల్యక్రియవల్ల అతిమౌలిక శిలలలోని మెగ్నీషియం నిలికేట్‌గా గాని లేదా హైడ్రోసిలికేట్‌గా గాని విడుదల చెందడం ప్రథమచర్య. తరువాత ఈ మెగ్నీషియం హైడ్రోకార్బోనేట్‌గా రవాణా అవుతుంది. ఈలోపుగా ఐరన్ లోహము హైడ్రాక్సైడ్‌గా మారి స్వతంత్ర ఖనిజాలుగా మాంగనీస్ హైడ్రాక్సైడ్లతో కలిసి వైభాగపు పొరలో కేంద్రీకృతమవుతాయి. శైథిల్య భూమండలానికి మధ్యమండలంలో ఐరన్, నికెల్ హైడ్రోసిలికేట్లు, పిగవ మండలంలో నికెల్‌తో కూడిన మెగ్నీషియం హైడ్రోసిలికేట్లు కేంద్రీకృతమవుతాయి. ఇవి కాకుండా వైభాగంలోని, మధ్యమండలంలోని నికెల్ క్లోరైడ్లు, నికెల్ జెప్పెరినైడ్లు ఏర్పడతాయి. కోబాల్ట్ ఆక్సైడ్ మాంగనీస్ హైడ్రాక్సైడ్లతో కలిసి ఉపరితల మండలంలో కేంద్రీకృతమవుతుంది. ఏదైనా ఒక శైథిల్యమండలంలో ఏర్పడిన పుత్తిక పక్క మండలాల నుంచి చేర్చినపుత్తికతో కలిసి ఉంటుంది. ఇది కాకుండా పవనాలవల్ల నీటివల్ల రవాణా కావడంవల్ల చేరిన అవశేషాలు కూడా కలిసి ఉంటాయి. ఉపరితల ప్రావాలము నుండంగా తేలిచోట్ల ఇటువంటి పుత్తిక పొరల ఉపరితల మండలంలో నికెల్, కోబాల్ట్, క్రోమియం కేంద్రీకృతం కావడానికి అవకాశముంది. పురాతన శైథిల్య మండలాలలోని శైథిల్యోత్పాదాలు ప్రస్తుత ఉపరితల ప్రావాలము ఏర్పడటానికి ఎంత ఎక్కువగా సహకరిస్తే అటువంటి ఉపరితల మండలాలలో నికెల్, కోబాల్ట్, క్రోమియం నిక్షేపాలు అంత ధనవంతంగా ఉంటాయి. ఉపరితల మండలంలో మాంగనీస్ హైడ్రాక్సైడ్లతో బాటు కేంద్రీకృతమై ఉన్న కోబాల్ట్ విదరణద్వారా కింది భాగాలకు విగుతుంది. ఈ పరిస్థితులన్నీ నికెల్, కోబాల్ట్‌ల భూరసాయనిక నిక్షేపాన్వేషణకు చాలా ఉత్సాహాన్ని కలగజేస్తాయి. పుత్తిక విశ్లేషణ ఈ లోహాల నిక్షేపాన్వేషణకు సత్ఫలితాలనిచ్చేవప్పుడు పుత్తికభాగాలను విశ్లేషణ చేయడం అనవసరము, పృథాశ్రమ.

కోబాల్ట్, నికెల్, క్రోమియముల విషయంలో భూరసాయనిక పద్ధతికి ముందుగా భూభౌతిక పద్ధతుల ద్వారా నిశ్చేపాన్వేషణ సాగించడం చాలా ముఖ్యము. ఎందువల్లనంటే ఈ పద్ధతి వల్ల ఈ లోహాలు కేంద్రీకృతమై ఉన్న అతిమౌలిక శిలల హద్దులను ముందుగా కనుక్కోవచ్చు. అంతర్జలాలు దిగువ మండలాలలోకి పోయే సందర్భాలలో నికెల్ కోసం జల-భూరసాయనిక పద్ధతుల ద్వారా నిశ్చేపాన్వేషణ కొనసాగించవలె. సల్ఫైడ్ నిశ్చేపాలున్న ప్రదేశాలలో అంతర్జలాల అభ్యాగత శిలల నుంచి ఏర్పడిన శైథిల్యోత్పాదితాల నుంచి తీసిన జలసారపు PH విలువను, నికెల్ విలువను కనుక్కోవలె.

ఉపరితల ప్రావారం మందము ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అయస్కాంత సర్వేక్షణతో కూడిన జీవ భూరసాయనిక సర్వేక్షణ, నిరుపేచ్చుగా నిలవ ఉన్న ప్రదేశాలలో జల-భూరసాయనిక సర్వేక్షణతో కూడిన జీవ-భూరసాయనిక సర్వేక్షణ ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటాయి.

మందము తక్కువగా ఉన్న ప్రావారమున్న అతిమౌలిక శిలల శైథిల్య చతులలో ఆక్సికరణ చెందిన కోబాల్ట్ కోసం నిశ్చేపాన్వేషణ సాధారణ పద్ధతుల ద్వారా జరిపించవచ్చు. ఇటువంటి ప్రదేశాలలో ఓకర్లు (ochre), మాంగనీస్ హైడ్రాక్సైడ్లు ఉన్న ప్రాంతాలను ఎక్కువ శ్రద్ధతో పరిశీలించవలె. ఉష్ణజలీయ కోబాల్ట్ సల్ఫైడ్ నిశ్చేపాలను వెదికేటప్పుడు నమూనాలలో ఆర్సెనిక్ ను కనుక్కోవడం ఎంతైనా ఉపకరిస్తుంది.

ఉష్ణజలీయ ఖనిజాలు :-

ఉష్ణజలీయ ఖనిజాలైన ఫ్లోరైట్, బెరైట్, కాల్సైట్, లిథియమ్ ఖనిజాలు మొదలైన వాటిని భూరసాయనిక పద్ధతిలో అన్వేషణ సాగించినందువల్ల నిశ్చేపాల ఉనికిని గురించి తెలుసుకోవడమే కాకుండా ఉష్ణజలీయ మార్పులు శిలలలో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో వివరంగా తెలుసుకోవచ్చు. ఫ్లోరైట్, బెరైట్ ఖనిజాలను నిశ్చేపం ఉన్న శిలలకు నలువైపులా ఉన్న శిలా పదార్థాలలోను, శైథిల్య వశిష్టాలలోను వెదకవలె. ఈ రెండు ఖనిజాలు అతి సున్నిత శిలా పదార్థాలలో ఉంటాయి. కాల్సైట్ నిశ్చేపాలున్నచోట ఉపరితల ప్రాంతాలలో ఈ ఖనిజపు శైథిల్యవశిష్టంగా కాల్షియమ్ ఆక్సైడ్ ఉండటం గమనించవలసిన విషయము. కాల్సైట్ నిశ్చేపాలున్న ప్రదేశాలలో అంతర్గత ఉపరితల జలాలలో కాల్షియమ్ విలువ హెచ్చుగా ఉంటుంది.

లిథియమ్ ఖనిజాన్వేషణను మాధ్యమిక (Intermediate) శిలలలో కొనసాగించవలె. శిలా శైథిల్య ప్రక్రియ సమయంలో లిథియమ్ ఖనిజాల నుంచి లిథియమ్ తొలగించబడి అవి మృత్తిక దిగువ పొరలలో కేంద్రీకృత మవుతుంది. ఈ కారణం వల్ల లిథియమ్ ఖనిజాన్వేషణ కోసం మృత్తిక పొరలలోని లిథియమ్ విలువలను కనుక్కుని లిథియమ్ పెగ్మటైట్ల ఉనికి కనుక్కోవచ్చు; లేదా వాటి సరిహద్దులను గుర్తించవచ్చు.

ఖనిజీకృత శిలలను కప్పిఉన్న మృత్తిక పొరలను పరీక్షించి నిక్షేపాన్వేషణ జరిపించడం చాలా సాధారణమైన అన్వేషణా విధానము. అన్వేషణ విధానము నిక్షేపపు ఉచ్చవ ప్రక్రియమీదను, నిక్షేపపు ఉచ్చవ వాతావరణం మీదను, మృత్తికపొరల వాతావరణ పరిస్థితుల మీదను, ప్రదేశపు పర్వతమాలోచ్ఛవ చరిత్ర మీదను, భూజలతల మట్టం మీదను ఆధారపడి ఉంటుంది. మృత్తికపొర మందం 1 నుంచి 5 మీటర్ల వరకు ఉండి నిక్షేపాన్వేషణ జరిపించవలసిన ప్రదేశము ఎక్కువగా భేదించబడకుండా ఉన్నట్లయితే, భూసాయనిక సర్వే గ్రిడ్ పద్ధతిలో జరిపించవలె. శుష్కప్రదేశాలలో ఈ సర్వే జరిపించేటప్పుడు 10-20 సెం. మీ లోతు నుంచి సూక్ష్మరేఖ మయమైన సమూహాలను తీసుకోవలె. వీరు నిలవ ఉన్న ప్రదేశాలలో ఈ సమూహాలను లోతులనుంచి (అంటే 0.5 నుండి 1 మీటరు వరకు) సేకరించవలె. అతి శీతల ప్రదేశాలలో శైథిల్యక్రియ చాలా తక్కువ స్థాయిలో సంభవిస్తుంది. కనక సమూహాలను స్థూలరేఖ భాగాల నుంచి సేకరించవలె. శైథిల్యక్రియా నిరోధకాలైన ఉల్ఫమైట్, మోనజైట్, కాసిటరైట్, ఇల్మినైట్, గోల్డ్ మొదలైనవి ఉన్న ప్రదేశాలలో స్థూలరేఖ సమూహాలు చాలా అవసరము. శుష్క వాతావరణ ప్రదేశంలోను, నీటితో నిండిన ప్రాంతంలోను సేకరించిన సమూహాలను స్పెక్ట్రోగ్రాఫిక్ విశ్లేషణ ద్వారా పరిశోధించవచ్చు. అతి శీతల ప్రాంతాలలోని సమూహాలను ఖనిజీకరణ విశ్లేషణ ద్వారా పరిశోధించ వలసిన అవసరముంది.

ఉపరితల మృత్తిక పొరల మందము హెచ్చుగా ఉండి, ఆ ప్రదేశము బాగా భేదించబడి ఉంటే నిక్షేపాన్వేషణ పద్ధతులను ప్రదేశపు నిమోన్నతాలను బట్టి, వాతావరణాన్నిబట్టి మార్పుకొంటూ ఉండవలె. ఇటువంటి చోట గ్రిడ్ సర్వేషణ పద్ధతి ఉపయోగకారి కాదు. వాలులలో ఎక్కువగా అన్వేషణ జరిపించవలె. వాతావరణ పరిస్థితులనుబట్టి, ఖనిజ నిక్షేపపు సంఘటననుబట్టి ఇటువంటి

చోట రసాయనిక, స్పెక్ట్రోగ్రాఫిక్ విశ్లేషణతో బాటు ఖనిజ విశ్లేషణ కూడా అవసరము, చిన్నచిన్న కందకాలను వాలులలో నమోన్నతరేఖలకు సమాంతరంగా తవ్వవలె. ఈ కందకాల మధ్య అంతరము 10 మీటర్ల నుంచి 50 మీటర్ల వరకు ఉండవచ్చు. అతి శీతల వాతావరణంలో ఖనిజ విశ్లేషణ ఎక్కువ ఉపయోగ పడుతుంది. ఉష్ణప్రాంతాలలో ఖనిజ విశ్లేషణ కంటే రసాయనిక, స్పెక్ట్రోగ్రాఫిక్ విశ్లేషణ పద్ధతులు ఎక్కువ ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి.

హెచ్చుగా చేదించబడిన పర్వత ప్రాంతాలలో మృత్తిక పొరలు ఒక చోట కేంద్రీకరింపబడటానికి అవకాశముండదు. అటువంటి చోట పర్వత వాలులలో అన్వేషణ కొనసాగించవలె. పర్వతపు దిగువ భాగాలలో కేంద్రీకృతమై ఉన్న మృత్తికలోని స్థూలరేణు భాగాన్ని ఖనిజ విశ్లేషణ పద్ధతుల ద్వారా నూత్నరేణు పదార్థాన్ని రసాయనిక స్పెక్ట్రోగ్రాఫిక్ విశ్లేషణ పద్ధతుల ద్వారా పరిశోధిస్తే విజయవంతమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఖనిజ నిక్షేపాలు, శిలా నిక్షేపాలచే (క్వాటర్నరీ నిక్షేపాలు-లోయెస్, ఒంథలి, డెట్టా, నదీకృత నిక్షేపాలు గాని అంత కంటే పురాతన శిలా నిక్షేపాలు) కప్పబడి ఉన్నప్పుడు నిక్షేపాన్వేషణ కష్టతరంగా ఉంటుంది. అంతర్గతమై ఉన్న ఖనిజ నిక్షేపాల ఉనికిని తెలుసుకోవడానికి బోరింగ్లు చాలా అవసరము. వీటితోబాటు, భూభౌతిక పద్ధతులు, జల రసాయనిక పద్ధతులు నిక్షేపాన్వేషణకు తోడ్పడతాయి. ఉపరితలపు మృత్తిక పొరలు 15 మీటర్ల దళసరి ఉన్నప్పుడు, జీవ-భూరసాయనిక పద్ధతుల ద్వారా నిక్షేపాన్వేషణ జరిపించవచ్చు. ఈ మృత్తిక పొరల దళసరి హెచ్చవుతున్న కొద్దీ జల భూరసాయనిక పద్ధతుల ప్రాముఖ్యము ఎక్కువవుతుంది. బోరింగ్లు వేసి సర్వేక్షణమానచిత్రాన్ని తయారుచేసేటప్పుడు జలభూరసాయనిక పరీక్షలు చాలా అవసరము.

అధార శిలా ప్రాంతాలలోను, మృత్తిక పొరలతో పూర్తిగా కప్పబడిన ప్రాంతాలలోను భూరసాయనిక పద్ధతుల ద్వారా నిక్షేపాన్వేషణ జరిపించేటప్పుడు ఆధారశిలల చరిత్ర, మృత్తికపొరల చరిత్రలతో బాటు ఆ ప్రదేశపు నిమోన్నతాల యొక్క భూస్వరూపము, అది ఏర్పడిన వివరాలు, క్వాలర్నరీ అవశేష శిలల చరిత్ర కూడా బాగా అర్థం చేసుకోవలె.

జల - భూరసాయనిక విధానాలు

లోహాలు - ద్రావణీయత

జల - భూరసాయనిక సద్గుణాల ద్వారా నిక్షేపాన్వేషణను గురించి తెలుసుకొనే ముందు అటువంటి అన్వేషణను సులభసాధ్యంచేసే ప్రక్రియలను గురించి తెలుసుకోవలసి ఈ అన్వేషణ వద్దగుట సీటిలో లోహాల ద్రావణీయత మీదా, అంతర్భౌమికంగాను, ఉపరితలమీదా ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి లోహ ద్రావణాల చలనం మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. అధారశీలం మీదుగా ప్రవహించే నీరు అటువంటి శీలంలో ఉన్నటువంటి సులభంగా ద్రావణీయమైన ఖనిజాలను ఖనిజసంయోగ వదార్థాలనూ ద్రావణంగా మార్చి అటువంటి ద్రావణస్థితిలో మరొకచోటికి రవాణాచేస్తాయి. కొన్ని సందర్భాలలో ఈ ద్రావణాల నుంచి ఖనిజ సంయోగవదార్థాలు అవక్షేపాలుగా విడుదల అవుతాయి. మరికొన్ని సందర్భాలలో ఈ అవక్షేపాలు మళ్ళీ ద్రావణీయమై రవాణా అవుతాయి. ఈ విధంగా ద్రావణీయత, రవాణా, అవక్షేప ప్రక్రియలు ఒక వ్యాయంగాని, కొన్ని పర్యాయాలు గాని సంభవించవచ్చు. భూపటలం యొక్క జలసంతులనం (Water balance) లో పాల్గొనే నలభై మూలకాలలోను, మన నిక్షేపాన్వేషణకు పనికి వచ్చేవి ఇరవై ఒకటి మాత్రమే. అవి కోబాల్ట్, మోలిబ్డినమ్, స్ట్రోంటియమ్, బేరియమ్, బోరాన్, నికెల్, సిల్వర్, టంగ్స్టన్, కాపర్, జింక్, కాడ్మియమ్, ఇండియమ్, మెర్క్యురీ, క్రోమియమ్, వెనేడియమ్, ఆర్సెనిక్, ఆంటిమోని, ఫ్లోరీన్ శిలా ఖనిజాలలోని మూలవదార్థాలు ద్రావణాలుగా మారడం ఆ మూలకాల అయానిక శక్తి (ionic Potential) మీద ఆధారపడిఉంటుంది. తక్కువ అయానిక శక్తి విలువలున్న మూలకాలు త్వరగా ద్రావణాలుగా మార్చబడి ఎక్కువ కాలం ద్రావణస్థితిలో ఉంటాయి. ద్రావణీయతను బట్టి వీటి చలనశక్తి సాచుతూ తగ్గుతూ ఉంటుంది. స్వేద జలంలోని ద్రావణీయతను ఆధారంగా చేసుకొని లోహ మూలకాలను కింది విధంగా విభజించవచ్చు.

(1) అక్షయ ద్రావణీయత ఉన్నవి :- సోడియమ్, పొటాసియమ్ ఈ మూలకాలు శీలల నుంచి వేరయిన తరువాత హేలైడ్లు, సల్ఫైడ్లు, నైట్రైడ్లు, కార్బోనేట్లు, ఫ్లోరైడ్లు, బోరేట్లు, సిలికేట్లుగా ఉవాడా అవుతాయి. వీటితోబాటు సీసియమ్, రుబీడియమ్లను కూడా చేర్చవచ్చు. (2) సులభంగా ద్రావణీయమైనవి :- కాల్షియమ్, మెగ్నీషియమ్, నికెల్ - వీటి హేలైడ్లు, సల్ఫైడ్లు, బైకార్బోనేట్లు కోబాల్ట్, ఇరన్, మాంగనీస్, కాపర్, సిల్వర్ - వీటి హేలైడ్లు, సల్ఫైడ్లు, మరియు సిల్వర్ సల్ఫైడ్. (3) స్వల్ప ద్రావణీయత ఉన్నవి :- స్ట్రాంషియమ్ సల్ఫైడ్, బేరియమ్, స్ట్రాంషియమ్, స్క్వలర్ - వీటి కార్బోనేట్లు (4) అతస్వల్ప ద్రావణీయత ఉన్నవి :- లెడ్ కార్బోనేట్లు జింక్, కాల్షియమ్, మెగ్నీషియమ్ - వీటి సిలికేట్లు, కాపర్ జెసిక్ కార్బోనేట్లు, బేరియమ్ సల్ఫైడ్, క్లోరైడ్ రూపంలోని సిల్వర్. (5) అద్రావణీయమైనవి: ఐరన్ (Fe^{3+}), మాంగనీస్ (Mn^{3+}), పైటాసియమ్ (Ti^{3+}) కోబాల్ట్ (Co^{3+}) వీటి హైడ్రాక్సైడ్లు.

ప్రకృతి జలాలలో ద్రావణీయత వైన చెప్పబడిన పిథంగా కాకుండా కొద్దిమార్పులతో ఉండవచ్చు. అంతర్భృమజలాలలో అమ్లాలు, తపితల సంయోగ వదార్థాలు ఉన్నందువల్ల వైన అద్రావణీయమైనవిగా చెప్పిన మూలకాలు, సంయోగ వదార్థాలు వీటిలో ద్రావణీయస్థితిలో ఉంటాయి. ఈ ద్రావణీయతకు కారకాలు: (1) ద్రావణాలలో హైడ్రాజన్ అయాన్ స్థాయి, (2) ఆక్సిరణ-క్షయకరణ శక్తులు oxidation Reduction Potentials), (3) పీడన (Pressure), (4) ఉష్ణోగ్రత, (5) అయానిక విభజన (6) ద్రావణంలో సాధారణ లేదా పితాత అయానిక ప్రభావము, (7) వాయువుల (CO_2 , O_2) ప్రభావము, (8) ద్రావణంలోని అయానిక పరస్పర రసాయనిక చర్యలు మొదలైనవి. వీటి ప్రభావం వల్ల మూలకాల ద్రావణీయత నేర్పద జలాలలో కన్న అంతర్భృమ జలాలలో ఎక్కువగా ఉంటుంది.

అంతర్భృమ జలాలలో ద్రావణీయతగా ఉన్న రసాయనిక వదార్థాలు అయానిక్ ద్రావణాలుగా గాని, అబద్ధద్రావణాలుగా గాని లేదా కొలాయిడల్ ద్రావణాలుగా గాని ఉంటాయి.

ప్రకృతి జలాలను విశ్లేషించి నిశ్చేపాన్వేషణ జరిపించడం ఇప్పుడు ఎక్కువగా వాడుకలోకి వస్తున్నది. ప్రకృతి జలాలలో మూలకాలు చాలా తక్కువ పరిమాణంలో ఉన్నందు వల్ల వాటిని ఆధునిక విశ్లేషణ పద్ధతుల ద్వారా కనుక్కోవలె. ఖనిజీకరణ మండలాల సమీపంలో ప్రవహించే ప్రకృతి జలాలలోని లోహమూల

కాలు భుజి కరణలేని ప్రదేశాలలోని ప్రకృతి జలాలలో కన్న హెచ్చు పరిమాణంలో ఉంటాయి. ఉదాహరణకు కొన్ని లోహమాల కాల సాంప్రదీకరణ విగువ ఇచ్చినాము (Saukov Perelman, 1956).

లోహము	ప్రకృతి జలాలలో సాంప్రదీకరణ (g/l)	భూనికరణ లేని చుండలము	భుజి కృతమంచలము
నికెల్	$1 \times 10^{-6} \text{—} 1 \times 10^{-5}$	$1 \times 10^{-5} \text{—} 1 \times 10^{-3}$	$1 \times 10^{-5} \text{—} 1 \times 10^{-3}$
కోబాల్ట్	$1 \times 10^{-7} \text{—} 1 \times 10^{-5}$	$1 \times 10^{-5} \text{—} 1 \times 10^{-3}$	$1 \times 10^{-5} \text{—} 1 \times 10^{-3}$
జింక్	$1 \times 10^{-7} \text{—} 1 \times 10^{-5}$	$1 \times 10^{-5} \text{—} 1 \times 10^{-3}$	$1 \times 10^{-5} \text{—} 1 \times 10^{-3}$
కాపర్	$1 \times 10^{-6} \text{—} 1 \times 10^{-5}$	$1 \times 10^{-5} \text{—} 1 \times 10^{-3}$	$1 \times 10^{-5} \text{—} 1 \times 10^{-3}$
యురేనియమ్	$1 \times 10^{-8} \text{—} 1 \times 10^{-5}$	$1 \times 10^{-5} \text{—} 1 \times 10^{-3}$	$1 \times 10^{-5} \text{—} 1 \times 10^{-3}$
మోలిబ్డినమ్	$1 \times 10^{-7} \text{—} 1 \times 10^{-6}$	1×10^{-4}	
లెడ్	$1 \times 10^{-7} \text{—} 1 \times 10^{-6}$	$1 \times 10^{-5} \text{—} 1 \times 10^{-3}$	

ప్రకృతి జలాలలో లోహపు నగటు పరిమాణము భూపటలంలోని ఆ లోహపు నగటు పరిమాణం మీద, విశ్లేషణ చేసిన నమూనాల సంఖ్యమీద ఆధార పడి ఉంటుంది. ప్రకృతి జలాలలో లోహపు పరిమాణాలు విగువ పేర్కొనబడిన కారకాలమీద ఆధారపడి ఉంటాయి.

- (1) ఆక్సికరణ క్రియానంతరమేర్పడిన సంయోగ పదార్థాల ద్రావణీయత,
- (2) జలాల PH, Eh విలువలు.
- (3) లోహ సల్ఫైడ్ల ఆక్సికరణ స్థాయి.
- (4) ప్రకృతి జలాలలోని చలరాశులు (Variables).
- (5) నిక్షేపం పరిమాణము.
- (6) శిలలయొక్క ప్రవేశయోగ్యత
- (7) వాతావరణ పరిస్థితులు, జలసంబంధ, పర్వత వాతావరణము.
- (8) భుజికృత శిలలనుంచి వెలువడిన పదార్థాల మీద ఇతర శిలల సాయనిక చర్యలు.

ప్రకృతిజలాలలోని లోహ మూలకాల చలనశక్తి కూడా పైన పేర్కొన్న కారకాలమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రకృతి జలాలలోని లోహాలు ఎక్కువ

భాగం నల్పైడ్ ఖనిజాలనుంచి, నల్పైడ్ నిక్షేపాలనుంచి చేర్చబడతాయి. ప్రకృతి జలాలలోని లోహపరిమాణము ఖనిజనిక్షేపాల ఆక్సీకరణస్థాయిమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఖనిజాల ఆక్సీకరణ, ద్రావణీయత, ద్రావణాల చలనము అంతర్భాగము జల తలపు మట్టంమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఖనిజనిక్షేపాలు శిథిలం చెందేటప్పుడు ఆస్తుజలాలు ఈ శైథిల్యక్రియకు సహాయపడతాయి. ప్రకృతి జలాలకు ఖనిజాలలోని లోహాలు ఎక్కువగా ద్రావణీయస్థితిలో చేర్చబడతాయి. ఇటువంటి జలాలు నిక్షేపాలనుంచి దూరంగా ప్రవహించేటప్పుడు పరిసర శిలాప్రభావం వల్ల వీటి PH విలువలలో మార్పులువచ్చి షార్ విలువలకు చేరువగా ఉంటాయి. ఈ పరిస్థితులలో ద్రావణీయాలుగా ఉన్న కొన్నిలోహాలు అవక్షేపణ చెందుతాయి. తత్ఫలితంగా ఈ జలాలలోని లోహపువిలువలు నిక్షేపాలకు దూరం ఎక్కువయ్యే కొద్దీ తగ్గుతుంటాయి. లోహాలు ద్రావణీయస్థితిలో ఉండటానికి, అవక్షేపాలుగా మారడానికి వీటిలోని జీవసంబంధ పదార్థాలుకూడా కారకాలుగా ఉంటాయి.

ప్రకృతిజలాలలోని లోహపుశాతాన్ని ఆపరిసరాలలోగల లోహపు ఉత్పత్తి స్థానానికి మాత్రమే సూచికగా తీసుకోవచ్చు. లోహశాతానికి, నిక్షేపం పరిమాణానికి ఏమాత్రం సంబంధము ఉండదు. ప్రకృతి జలాలలో లోహపరిమాణపు హెచ్చుతగ్గులకు ఇతర కారణాలు ఉండవచ్చు. అయినప్పటికీ ఈవిలువల సహాయంతో నిక్షేపం ఉనికిని కనుక్కోవచ్చు. శిలావిశ్లేషణం వల్లనూ శైథిల్యక్రియా జన్య పదార్థాల విశ్లేషణ వల్లనూ కూడా కనుక్కోలేని నిక్షేపాలను ప్రకృతి జల విశ్లేషణవల్ల కనుక్కోవచ్చు. బహుశ నల్పైడ్ నిక్షేపాలున్నచోట్ల ప్రకృతి జలాలలో వివిధలోహాలు ఒకేశాతంలోఉండవు. వీటి విలువలు ద్రావణీయతల మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. అందువల్ల జలభూవిజ్ఞాన రసాయనిక నిక్షేపాన్వేషణ జరిపించేటప్పుడు ఏ ఏ లోహాలు ఈ ప్రకృతి జలాలలో ఎంత శాతం ఉన్నాయో విశ్లేషణద్వారా తెలుసుకొని ఆ లోహాల నిక్షేపాన్వేషణను జరిపించవలసి ఉంటుంది.

బహుశ నల్పైడ్ నిక్షేపాలున్న ప్రదేశాలలోని ప్రకృతిజలాలలో ద్రావణీయ స్థితిలోన్న లోహాలు ఒకటికంటె ఎక్కువ ఉంటాయి. ప్రకృతిజలాలలోని లోహం శాతము వాతావరణస్థితిని బట్టి దేశకాలపరిస్థితులను బట్టి మారుతుంటుంది. వర్షము కాలంలో లోహపు విలువలు చాలాతక్కువగా ఉంటాయి. శరత్తుకాలంలో ఇవి చాలా హెచ్చుగా ఉంటాయి. జలభూవిజ్ఞాన రసాయనిక సర్వేక్షణకు శరత్

ఋతు కాలమే సరిఅయినది. ఉపరితల జలప్రవాహాలలో లోహాలు ద్రావణీయస్థితి లోనే కాకుండా విలంబిత స్థితి (suspension)లో కూడా రవాణాఅవుతాయి. పర్వ కాలంలో అధికవర్షపాతంవల్ల లోహపు విలువలు తగ్గడమే కాకుండా, ఈ ఋతువులో భూజలతలము ఉపరితలానికి చేరువలో ఉన్నకారణంగా ఖనిజ నిక్షేపాలు శైథిల్యం చెందడానికి అవకాశం తక్కువయినందువల్ల ప్రకృతి జలాలకు లోహాలు అదనంగా చేర్చబడవు. వర్షఋతువు ఆఖరిదశలో ఖనిజాలు ఎక్కువగా శిథిలం కావడంవల్ల లోహాలు ఎక్కువగా ప్రకృతిజలాలకు చేర్చబడతాయి. గ్రీష్మఋతువులో భూజలతలము చాలాకిందికి పోతుంది. కొన్నికొన్నిచోట్ల లోహసంయోగ పదార్థాలు అవక్షేపాలుగా ఏర్పడతాయి. ఈ ఋతువులో ప్రకృతి జలాలలోని లోహాలు అంత హెచ్చుకాతంలో ఉండవు.

జల భూవిజ్ఞాన రసాయనిక సర్వేక్షణలో మనము ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవలసిన విషయాలు రెండు: ప్రకృతిజలాలలో లోహశాతము తక్కువగా ఉంటే ఆప్రాంతాలలో ఖనిజనిక్షేపాలు లేవని అనుకోరాదు. అదే విధంగా జలాలలోని లోహశాతము చాలా హెచ్చుగా ఉంటే ఖనిజనిక్షేపాలు ఉన్నట్లు భావించ కూడదు. ప్రకృతిజలాలలో ఏదో ఒక్కలోహపు విలువలనుబట్టి నిక్షేపాన్వేషణ జరిపించే కంటే కొన్ని లోహసమూహాల విలువలనుబట్టి ఈ అన్వేషణ జరిపిస్తే ఫలితాలు విజయవంతంగా ఉంటాయి.

ప్రకృతి జలాలు—లోహచలనము

లోహాలు కలిసి ఉన్న ప్రకృతిజలము లోహాల ఉనికిస్థానాలనుంచి వివిధ పరిస్థితులలో వివిధ రీతుల రవాణా అవుతుంది. సాధారణంగా జలప్రవాహము ఏ దిశగా ఉందో అదే దిశలో ఈలోహపూరిత జలాలు కూడాప్రయాణం చేస్తాయి. ఖనిజ నిక్షేపాలనుంచి వేరుచేయబడిన లోహాలు, లోహసముదాయాలు రవాణా అయ్యేదూరము లోహాలవణ ధర్మాలమీద, నీటియొక్క PH విలువలమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇవికాక శిలలలోని భ్రంశాలు, పగుళ్లు, మరి ఇతర నిర్మితియ విరూపణల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.

ప్రవాహజలాలే కాకుండా నీరు నిలువడిందే తంపర భూములుకూడా జల భూవిజ్ఞాన రసాయనిక సర్వేక్షణకు పనికివస్తాయి. జలభూవిజ్ఞాన రసాయనిక సర్వేక్షణ సమయంలో ఆప్రదేశంలోని ప్రకృతి జలాలలోని లోహపువిలువలు

ఏ విధంగా మార్పులుచెందుతున్నాయో కొంత సూచనగా తెలుసుకొని తరవాత ప్రవాహపు నీటిలోగాని, నిలవఉన్న నీటిలోగాని, అంతర్భూమి జలాలలోగాని లోహపు విలువలు ఏపరిమాణంలో ఉన్నాయో తెలుసుకొని సర్వేక్షణ జరిపించవలె. నీటిలో ద్రావణీయస్థితిలో ఉన్న లోహాలను మూడు తరగతులుగా విభజించవచ్చు. అవి (1) సంచితమయ్యేవి (Accumulating) (2) విశేషణకాలేనివి (Non-dispersible) (3) విశేషణ చెందగలిగేవి (dispersible). సల్ఫేట్ అయాన్ జింక్ మొదటి విభాగానికి చెందుతాయి. ఈ రెండూ అంతర్భూమి జలాలలో సంచితమయి, నిశ్చేపం స్థానానికి (జిప్సమ్, జింక్ సల్ఫైడ్ నిశ్చేపాలు) అతిదగ్గరలోను, ఎక్కువ దూరంగాను కూడా పరివేషాలను ఏర్పరుస్తాయి. రెండవ రకానికి చెందినవి మోలిబ్డనమ్. ఈలోహము చక్కటి పరివేషాలను ఏర్పరుస్తుంది. కాపర్ నిశ్చేపాలలో మోలిబ్డనమ్ ఉంటుంది. కనక మోలిబ్డనమ్ పరివేషాలు సాధారణంగా కాపర్ నిశ్చేపాలకు సూచికలు. ఇది కాకుండా మోలిబ్డనమ్ నిశ్చేపాలను కూడా సూచిస్తాయి. ఖనిజ నిశ్చేపాలు ఏర్పడే ఇతర లోహాలన్నీ మూడవ విభాగానికి చెందినవి.

జల భూవిజ్ఞాన రసాయనిక పద్ధతి-నిశ్చేపాన్వేషణ

జల భూవిజ్ఞాన రసాయనిక పద్ధతి ద్వారా నిశ్చేపాన్వేషణను చాలాకాలం నుంచి జరుపుతున్నారు. అన్వేషణకుముందు ప్రకృతిజలాలలో లోహాల ప్రాంతీయ స్థానిక వృష్టభూముల విలువలు (Regional and local Background values) తెలుసుకోవలె. ఈ విలువలతో పోల్చిచూసినప్పుడు ఆ ప్రదేశంలోని ప్రకృతిజలాలలో కనిపించిన లోహపువిలువల అసంగతాలను సేకరించవలె. అన్వేషణ జరిపించే ప్రదేశంలోని వివిధ రకాల శిలలలోని జలాలలో లోహపు విలువలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో కనుక్కోవలె. తరవాత అటువంటి శిలలలోని భ్రంశాలు, వగుళ్లు, శిలాస్పర్శలు-వీటిచాయలో ఉన్న జలాలలోని లోహపువిలువలు తెలుసుకోవలె. ఈ లోహపు విలువలలో అధిక విలువలున్న స్థానాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించి అటువంటి అధిక విలువలకు శిలలు, శిలానిర్మితులు, స్పర్శలు పరిసర వాతావరణము ఎంత వరకు కారణాలో పరిశీలించవలె.

జలభూవిజ్ఞాన రసాయనిక నిశ్చేపాన్వేషణ వివృత భూభాగంలోనే కాకుండా చేదిత భూభాగంలో కూడా జరిపించవచ్చు. చేదిత భూభాగంలో ప్రకృతిజలాలు బహిర్గత ఖనిజనిశ్చేపాలను, అంతర్భూమి నిశ్చేపాలను కూడా స్పృశించడానికి

వీలవుతుంది. ఇదికాక ఇటువంటి ప్రదేశాలలో భూజలతలము చాలాచోట్ల ఉపరితలానికి వస్తుంది. ప్రవాహజలాలు నిక్షేపాలకు చాలాచేరువలో ఉన్న కారణంగా నిక్షేపాలను కనుక్కోవడం చాలా సులభ సాధ్యమవుతుంది. భూజలతల బహిర్గతాలకు ఈ జలాలు స్పృశించే నిక్షేపాలకు మధ్యదూరము చాలా తక్కువయినందువల్ల నిక్షేపాన్వేషణ సులభ సాధ్యమవుతుంది. ఛేదిత భూభాగంలో ప్రవాహజలాలు ఎక్కువ వేగంతో ప్రవహిస్తుంటాయి. వర్షముతువులో ఉపరితల జలాలతో సమ్మిళితమవుతాయి. ఇందువల్ల వర్షముతువులో ఈ జలాలలోని లోహపు విలువలు మిగిలిన ఋతువులలో కంటే తక్కువగా ఉంటాయి.

భూభాగము ఎక్కువగా ఛేదితమయిన ప్రదేశాలలోను, నిక్షేపాలను కప్పిఉన్న ప్రాచారశీలల మందము ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాలలోను జలభూవిజ్ఞాన రసాయనిక పద్ధతులు ఇతర పద్ధతుల కంటే మంచి ఫలితాలనిస్తాయి. నిక్షేపాన్వేషణకు బహిర్గతాలైన జలాలను, అంతర్భూమి జలాలను కూడా నమూనాలు సేకరించవలె. బావుల నుంచి బోర్ హోల్ ల నుంచి కూడా నీటి నమూనాలను తీయవలె. ఈ నమూనాలను విశ్లేషించి వాటిలోని లోహపు విలువలను కనుక్కోవలె. లోహపు విలువలు అశాశనకంగా ఉన్న ప్రాంతాలలో అన్వేషక బోరింగ్ లను వేసి నీటి నమూనాలను సేకరించి వాటిని లోహాలకోసం, ఆనయాన్ ల (anions) కోసం విశ్లేషించవలె. ముఖ్య లోహమూలకాల కోసమే గాకుండా తదితర అనుబంధ మూలకాల కోసం కూడా నీటి నమూనాలను విశ్లేషించవలె. అనుబంధ మూలకాల కోసం జరిపే జలవిశ్లేషణ కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో తప్పనిసరి అవుతుంది. ఈవిధంగా లెడ్ నిక్షేపాన్వేషణకు ప్రకృతి జలాలలోని రజతము, జింక్ విలువలను కోబాల్ట్ నిక్షేపాన్వేషణకు నికెల్ విలువలను కనుక్కోవలె. సల్ఫైడ్ నిక్షేపాల ఉనికిని జలాలలోని “సల్ఫైడ్” నూచిస్తుంది. ఇదేవిధంగా ప్రకృతి జలాలలోని రేడియోధార్మిక మూలకాలు యురేనియమ్ ఖనిజనిక్షేపాలను, ఫ్లోరిన్ బోరాన్ లు ఉష్ణజలీయ ఖనిజనిక్షేపాలను నూచిస్తాయి.

జల భూవిజ్ఞాన రసాయనిక నిక్షేపాన్వేషణలో ప్రకృతి జలాలలోని లోహాల అనుబంధ మూలకాల “ఆధిక్యతలు” ఏ కారకాలవల్ల ఏర్పడతాయో వాటినిన్నిటిని మనము లెక్కలోకి తీసుకోవలె.

కొన్ని ఉదాహరణలు : (1) కావర్ నిక్షేపాన్వేషణ : కావర్ నిక్షేపాలున్న ప్రదేశాలలో మూడు రకాలైన ప్రకృతి జలాలను గుర్తించవచ్చు. మొదటి రకం: గని ప్రదేశంలోని ఆప్టు జలాలు; రెండవ రకం: నిక్షేపానికి దగ్గరలో ఉన్న ఆప్టు జలాలు; మూడవ రకం: అంతర్భూమి ఆప్టుజలాలు. నల్లైడ్ నిక్షేపాల ఆక్సీకరణ వల్ల మొదటి రకపు జలాలు, ఆ నిక్షేపావస్థలో నున్న నల్లైడ్ ఖనిజాల ఆక్సీకరణ వల్ల రెండవరకానివీ, పై రెండు ప్రక్రియలవల్ల తయారైన పదార్థాలు అంతర్భూమి జలాలకు చేర్చబడినందువల్ల మూడవ రకానివీ ఏర్పడతాయి.

నిక్షేపాల సమీపంలో అంతర్భూమి జలాలలో ఏర్పడిన కావర్ నిక్షేప పరివేషాలు సాధారణంగా విచ్ఛిన్నంగా ఉంటాయి. బాగా చేదించబడిన నిమ్నోన్నత స్వరూపమున్న ప్రదేశాలలోను, అతివృష్టిగల ప్రదేశాలలోను అంతర్భూమి జలాలలోని కావర్ లోహపు విలువలు తగ్గుతాయి. నిక్షేపానికిగల దూరాన్ని బట్టి ఈ అంతర్భూమి జలాలలోని కావర్ విలువలు తగ్గుతూ, పెచ్చుతూ ఉంటాయి. ప్రవాహ నిరోధకాలున్న చోట ఈ విలువలు పెచ్చువుతాయి. ఉపరితలానికి సమీపంలో విక్షిప్త ఖనిజీకరణ మండల ముందే అటువంటి ప్రదేశాలలోని అంతర్భూమి జలాలు అధిక కావర్ విలువలను చూపిస్తాయి. ఖనిజ నిక్షేపాలు చాలాలోతున ఉంటే ఈ విలువలు తక్కువగా ఉంటాయి. జలవినిమియాలు (Water exchanges) బాగావున్న ప్రదేశాలలో కావర్ విలువలు నిక్షేపాలకు 500 మీటర్ల వరకు మాత్రమే సూచించబడతాయి. భూభాగపు చేదన తక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఈ కావర్ విలువలు 1-1½ కి.మీ. వరకు, కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో 5 కి.మీ. వరకు సూచించబడతాయి. అంతర్భూమి జలాలు చాలా నెమ్మదిగా రవాణాచేయబడే వాతావరణంలోను, ఎక్కువగా ఖనిజీకరణ చెందిన వాతావరణంలోను 500 మీటర్ల నుంచి 1000 మీటర్ల వరకు మాత్రమే ఈ లోహపు ఉనికిని కనుక్కోవచ్చు. కావర్ నిక్షేపాల పరిసర ప్రాంతాలలోని జలాలలో కావర్తో బాటు జింక్, సిల్వర్, మోలిబ్డినమ్ కూడా అనుబంధంగా ఉంటాయి. కావర్ నిక్షేపాల చుట్టూ జింక్ విశాలమైన పరివేషాలను ఏర్పరుస్తుంది. ప్రకృతి జలాలలోని కావర్ విలువలనే కాకుండా వీటి ఆప్టుత్వాన్ని కూడా కావర్ నిక్షేపాన్వేషణకు సూచికగా తీసుకోవచ్చు. ఈ ఆప్టుత్వము నల్లైడ్ ఖనిజాలు ఆక్సీకరణ చెందినప్పుడు విడుదలైన “సల్ఫైడ్” వల కలుగుతుంది. కొన్ని సందర్భాలలో ఈ “సల్ఫైడ్” వైరైట్ నిక్షేపాలను, వాటి మూలకంగా కావర్ నిక్షేపాలను కనుక్కోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కాని కావర్ నిక్షేపపు ఉనికిని ఒక్క “సల్ఫైడ్” విలువను బట్టి నిర్ణయించరాదు.

జీవ భూరసాయనిక విధానాలు

భూవటలం మీద పెరిగే ప్రతి మొక్క మృత్తిక పొరలోని లవణాల మీద, అందులోని నీరు, తేమమీదా, సూర్యరశ్మి, కార్బన్ డై ఆక్సైడ్, ఆక్సిజన్ల మీదా ఆధారపడి ఉంటుందనే విషయము మనందరికీ తెలిసినదే. ప్రతి చెట్టు మృత్తిక పొరలోని లవణాలతోబాటు లోహాలను, వాటి సంయోగపదార్థాలను కూడా సేకరించుకొని వివిధ భాగాలలో కేంద్రీకరించు కొంటుంది. మొక్క వేర్వేరు భాగాలను పుటంబెట్టి దాని నుంచి వచ్చిన బూడిదను విశ్లేషించి కొన్నికొన్ని లోహాలను గుర్తించవచ్చు. ఈ విధంగా మొక్కల బూడిద లోని లోహాలకు ఆ మొక్కలు పెరుగుతున్న మృత్తిక పొరలోని లోహాలకు చక్కటి సమన్వయాన్ని గుర్తించడం జరిగింది. ఇటువంటి సమన్వయాలను ఆధారంగా చేసుకొని జీవ భూరసాయనిక నిశ్చేపాన్వేషణను ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇది చాలా సులభమైన పద్ధతి. క్యాటర్పరీ మహాయుగపు అవశేష శిలలతోను, హెచ్చుమందపు మృత్తిక పొరలతోను, హిమానీనద నిశ్చేపాలతోను కప్పబడిన ప్రదేశాలలో ఈ జీవ భూరసాయనిక పద్ధతులు మిగిలిన పద్ధతుల కంటే ఎక్కువగా ఉపయోగపడతాయి.

సాధారణంగా ప్రతిమొక్కలోను మృత్తిక పొరలోని లోహాలు కొంత శాతం కేంద్రీకరింపబడి ఉంటాయి. వీటిలో ఒకటిగాని, అంతకు ఎక్కువగాని లోహాలు ఎక్కువశాతంలో కేంద్రీకృతమై ఉంటే ఆ లోహనిశ్చేపాలకు సూచనగా గ్రహించవచ్చు. జీవ భూరసాయనిక పద్ధతుల సహాయంతో కింది లోహాల నిశ్చేపాలను వెదకవచ్చు. క్రోమియమ్, మాంగనీస్, ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్, కాపర్, జింక్, మోలిబ్డెనమ్, సిల్వర్, టిన్, టంగ్స్టన్, గోల్డ్, లెడ్ మెర్క్యురీ, ప్లాటినమ్.

మనదేశంలో చిన్న చిన్న మొక్కలతో కప్పబడి ఉన్న మందమైన మృత్తిక పొరలు గల ప్రదేశాలలోను, అడవులలోను, దట్టమైన చెట్లతో కప్పబడి ఉన్న లోయలు, పర్వత చరియలు మొదలైన ప్రదేశాలలోను జీవ భూరసాయనిక పద్ధతులద్వారా నిశ్చేపాన్వేషణను కొనసాగించ వచ్చు. ఇవికాక మనదేశంలోని ఇనకతో

కవుబడిన ప్రదేశాలలో కూడా ఈ పద్ధతులు ఎంతో ప్రయోజనకారిగా ఉంటాయి. ప్రఖ్యాత సోవియట్ శాస్త్రజ్ఞుడైన విన్ గ్రాదవ్ పరిశోధనలు, పర్యావరణికనల ఫలితంగా లోహనిక్షేపాలను కనుక్కోనే లోతు-లోహల ధర్మాలమీద ఆధారపడి ఉంటుంది అని తెలిసింది. ఈ విధంగా 50 మీటర్లలో ఉన్న కాపర్ నిక్షేపాలను, 20 మీటర్ల లోతునగల కోబాల్ట్, నికెల్, క్రోమియమ్, జింక్ ఖనిజాలను, 10 మీటర్ల లోతునగల ఆర్సెనిక్ ఖనిజాలను, 3 మీటర్ల లోతు గల మోలిబ్డెనమ్ ఖనిజాలను కనుక్కోవచ్చు. ఈ నిక్షేపపు లోతుపొద్దు ఖనిజ శ్రేణిల్యం వైనా, పృథ్వీనంపద వైనా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆ. పా. విన్ గ్రాదవ్ పరిశోధనల దృష్ట్యా నిక్షేపణ మండలంలోని మొక్కల భాగాల బూడిదలో ఖనిజనిక్షేపణ లేని చోట్ల ఉన్న మొక్కల భాగాల బూడిదలో కంటే సుమారు నూరు రెట్లు లోహ కేంద్రీకరణ జరుగుతుందని తెలుస్తున్నది. ఈ వృద్ధి కనీసం పది రెట్లున్నప్పటికీ దీనిని ఖనిజనిక్షేపణకు సూచనగా తీసుకోవచ్చు. కింద చూపిన పట్టికలో వీరి పరిశోధనల ఫలితాలు కొన్నిటిని చూపినాము.

(శాతాలలో)

లోహము	ఖనిజీకరణ లేని చోట్ల ఉన్న మొక్కల బూడిద	ఖనిజీకరణ మండలంలోని మొక్కల బూడిద	కేంద్రీకరణ స్థాయి
V	5×10^{-4}	1×10^{-2}	20 రెట్లు
Cr	5×10^{-4}	1×10^{-2}	..
Mn	1×10^{-2}	10	1000 రెట్లు
Co	4×10^{-4}	5×10^{-2}	10-100 ..
Ni	1×10^{-3}	1×10^{-2}	10 ..
Cu	5×10^{-3}	1×10^{-1}	100 ..
Zu	1×10^{-2}	1×10^{-1}	100 ..
Mo	5×10^{-4}	1×10^{-2}	100 ..
Pb	1×10^{-4}	1×10^{-2}	100 ..
U	1×10^{-6}	1×10^{-2}	10,000 ..

వైన ఉన్న మృత్తికపొర ఎంత పలచగావుంటే మొక్కలలో లోహ కేంద్రీకరణ అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. చెట్ల నిడివి, విస్తీర్ణాన్ని బట్టి కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో ఎన్నో కిలోమీటర్ల దూరానగల నిక్షేపాలను కూడా జీవ భూరసాయనిక పద్ధతులద్వారా కనుక్కోవచ్చు.

ఆక్రీకరణ మండలంమీదగాని, ఋణిజాన్వేషణ శైధిల్యమండలంమీదగాని మొక్కలుంటే ఆ ప్రాంతాలలో చేసే జీవ భూరసాయనిక నిశ్చేపాన్వేషణ చాలా మంచి ఫలితాలనిస్తుంది. జీవభూరసాయనిక పద్ధతిలో నిశ్చేపాన్వేషణ జరిపేటప్పుడు వివిధ ప్రాంతాలలోని ఒకే ఒకం మొక్కయొక్క ఏదైనా ఒక భాగం నమూనాగా తీసుకోవలె. ఉదాహరణకు ఒక ప్రాంతంలోని మొక్క ఆకులలో లోహకేంద్రీకరణ ఎక్కువగా ఉన్నదని గ్రహించినతరువాత ఆ నిశ్చేపాన్వేషణకు వివిధ ప్రాంతాలనుంచి అదే రకపు మొక్క ఆకులను సేకరించవలె. లోహకేంద్రీకరణ మొక్కలోని ఏ భాగంలో అయితే ఎక్కువగా ఉంటుందో తెలుసుకొని నిశ్చేపాన్వేషణకు అదేరకపు మొక్క అదే భాగాన్ని (ఆకు, వేరు, పువ్వు, కాయ, లేదా కొమ్మ) వివిధ ప్రాంతాలనుంచి సేకరించవలె. అటువంటి సందర్భాలలో మాత్రమే విశ్లేషణ ఫలితాలను పోల్చి చూసుకోవలసిఉంటుంది. నిశ్చేపాన్వేషణకు పట్టు బాగా వృద్ధిపొందిన చిన్న మొక్కలను ఎంచుకొన్నట్లయితే ఫలితాలు విజయవంతంగా ఉంటాయి.

సులభ ద్రావణీయాలైన లోహసంయోగ పదార్థాలకు చలనశక్తి హెచ్చుగా ఉంటుంది. కనక ఇవి మొక్కల వివిధ భాగాలలో చాలా తొందరగా కేంద్రీకరింపబడతాయి.

నిశ్చేపాన్వేషణ పద్ధతి

అన్వేషణ చేయదలచిన ప్రదేశంలో ఎక్కువభాగాన్ని ఆక్రమించుకొని ఉన్న ఒకజాతి మొక్కను ఎంచుకోవలె. అన్వేషణ ప్రారంభంలో ఈ మొక్క వివిధ భాగాలను - అంటే ఆకు, వేరు, పువ్వుము, మొదలైనవి - పిడివిడిగా సేకరించి వాటిని వేర్వేరుగా పుటంచేసి బూడిదచేయవలె. బూడిద చేసేటప్పుడు సులభ భావ్యశీల లోహమూలకాలు వాయురూపంలో పైకిపోకుండా జాగ్రత్త పహించవలె. ఈ విధంగా తయారయిన వేర్వేరు బూడిద భాగాలను సరిఅయిన పద్ధతి ద్వారా విశ్లేషణచేసి మనము వెదుకుతున్న నిశ్చేపానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన, అనుబంధ మూలకాలు ఏభాగపు బూడిదలో ఎక్కువగా కేంద్రీకరింపబడి ఉన్నాయో తెలుసుకోవలె. తరువాత ఆ మొక్క ఆ భాగాన్ని అన్వేషణ ప్రాంతంలోని మొక్కలన్నింటినుంచీ సేకరించవలె. ఈ సేకరణ ఒక క్రమమైన గ్రిడ్ పద్ధతిలో జరిపితే ఫలితాలను వివ్రలీకరించుకోవడానికి అవకాశము ఉంటుంది.

జీవ భూరసాయనిక పద్ధతులద్వారా నిక్షేపాన్వేషణ సోవియట్ దేశం లోను, స్కాండినేవియన్ దేశాలలోను విరివిగా అమలులో ఉంది. ఈ సందర్భంలో ఆ దేశాలలోని పరిశోధనలను కొన్నింటిని ఉదాహరణలుగా తీసుకొందాము.

త్కాలిష్ అనే సోవియట్ శాస్త్రజ్ఞుడు జీవ భూరసాయనిక పద్ధతిద్వారా ఐరన్ కలిసి ఉన్న నల్పైడ్ నిక్షేపాలను అన్వేషించినాడు (చార్కోవైరైట్, ఆర్సినోవైరైట్ మొదలైనవి). అన్వేషణ ప్రాంతంలో గ్రీడ్ వద్దతిలో మొక్కల ఆకులను సేకరించి వాటి బూడిదను విశ్లేషణచేసి అందులోని ఐరన్ ధాతువు యొక్క పరిమాణాన్నిబట్టి నిక్షేపపు ఉనికిని కనుక్కొన్నారు. ఈ పద్ధతి ఐరన్ కలిసి ఉన్న నల్పైడ్ నిక్షేపాలనే కాకుండా, ఫెర్రూజిన్ శిలల ఉనికిని కనుక్కోవడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఫెర్రూజిన్ శిలలమీద సేకరించిన ఆకులలో ఐరన్ ధాతువు సుమారు ఆరురెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది.

త్కాలిష్ ఉద్దేశంలో ఉపరితలపు మృత్తిక పొర 5 మీటర్లకు మించిన మందము ఉంటే ఆకుల బూడిదలో నూచనలు నిక్షేపాన్వేషణకు అనుకూలంగా ఉండవు. మన దేశంలో కూడా ఈ పద్ధతిని వాడుకలో పెట్టవచ్చు.

రంకామా (Rankama) చేసిన పరిశోధనల వల్ల ఈ జీవభూరసాయనిక పద్ధతులద్వారా హిమాలీయ ప్రాంతాలలో కూడా నిక్షేపాన్వేషణ చేయవచ్చు. మన దేశంలో కాశ్మీర్ ప్రాంతాలలోను, హిమాలయ ప్రాంతాలలోను ఈ పద్ధతుల ద్వారా నిక్షేపాన్వేషణ చేయవచ్చు.

కొన్ని మొక్కల బూడిద సంఘటన ఒక్కొక్క ఋతువులో ఒక్కొక్క మాదిరిగా ఉంటుంది. దీనికి ఋతువుల ప్రభావమే కారణము. అందువల్ల నిక్షేపాన్వేషణ చేసేటప్పుడు ఒకే ఋతువులో సేకరించిన నమూనాలను. మాత్రమే విశ్లేషించి పోల్చుచూసుకోవలె. ప్రదేశపు వాతావరణము, మృత్తిక పొర సంఘటన, PH, నేల సాంద్రత, మృత్తికలోని క్షేపీకలు. ఈ కారకాలన్నీ జీవ భూరసాయనిక నిక్షేపాన్వేషణలో ప్రాముఖ్యం వహిస్తాయి. మొక్క భాగంలోఉన్న లోహాలు ఆ ప్రాంతంలోని మృత్తిక పొర సంఘటనకు ప్రతి రూపంగా భావించవలె.

మొక్కలలో కేంద్రీకృతమై ఉన్న నికెల్, కోబాల్ట్, క్రోమియమ్ లోహపు

విలువలు ఈ నిక్షేపాల ఉనికిని కనుక్కోవడానికి, నిక్షేపాల సరిహద్దులను ఏర్పరచడానికి ఉపయోగపడతాయి.

సర్పెంటైన్ (Serpentine) శిలమీద, అతిమౌలిక శిలమీద ఉన్న మృత్తిక పొరలమీద మొక్కలలో కూడా వరసగా క్రోమియమ్, నికెల్ కేంద్రీకృతమవుతాయి. అందువల్ల క్రోమియమ్, నికెల్ నిక్షేపాలను వెదికేటప్పుడు ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. మృత్తిక పొరలలోని లోహాలన్నీ మొక్కలలో కేంద్రీకృతంకావు. కేంద్రీకృతమైన లోహాలలో కొన్ని హెచ్చు పరిమాణంలోను కొన్ని తక్కువ పరిమాణంలోను కేంద్రీకృతమవుతాయి. మృత్తికలో నికెల్, కోబాల్ట్ కాపర్ ఉన్నట్లయితే అక్కడి మొక్కలలో నికెల్ కంటే హెచ్చుగా కోబాల్ట్, కాపర్ కేంద్రీకృతమవుతాయి.

కాపర్: మొక్కలలోని కాపర్ విలువలకు, ఆ ప్రదేశంలోని నిర్మితులకు చాలామౌలికాలున్నట్లు శాస్త్రజ్ఞుల పరిశోధనల మూలంగా తెలిసింది. కాపర్ నిక్షేపాలున్న శిలమీద పెరుగుతున్న మొక్కలు నిక్షేపపు శిలలను బట్టి ఉంటాయి. కాపర్ నిక్షేపప్రదేశాలలో భ్రంశాలున్నట్లయితే ఈ భ్రంశాలు ఉపరితలం మీదున్న చెట్లలో గమనీయమైన మార్పులను కలగజేస్తాయి. కొన్ని మొక్కలు ఆక్సికరణ చేందిన కాపర్ నిక్షేపాలమీద మాత్రమే పెరిగి చుట్టూఉన్న ఇతర ప్రాంతాలలో పెరగవు. షారమృత్తిక మీద పెరిగే మొక్కలలో కాపర్ కేంద్రీకరణ తక్కువగా ఉంటుంది; ఎందువల్లనంటే షారవాతావరణంలో కాపర్ చలనము చాలాతక్కువ. బహులోహ నిక్షేపాలమీద పెరిగే మొక్కలలోని Cu, Zn నిష్పత్తి నిక్షేపవిహీన మృత్తికమీద పెరిగే మొక్కలలోని Cu, Zn నిష్పత్తి కంటే హెచ్చుగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ నిష్పత్తిని బట్టి కాపర్ నిక్షేపాన్వేషణ చేయవచ్చు. జింక్, లెడ్ నిక్షేపాలపైనున్న మొక్కలలో లెడ్ కంటే జింక్ ఎక్కువగా కేంద్రీకృతమవుతుంది.

మోలిబ్డెనమ్ మీద చేసిన పరిశోధనల ఫలితంగా, విన్ గ్రాడవ్ (1955) లెగ్యుమినస్ (Leguminous) మొక్కలలో మోలిబ్డెనమ్ కేంద్రీకృతమవుతుందని ఈ మొక్కలలోని మోలిబ్డెనపు విలువలను ఆధారంగా చేసుకొని మోలిబ్డెనం నిక్షేపాన్వేషణ జరిపించ వచ్చునని అన్నారు. ఈ మొక్కలే కాకుండా కొన్ని కొన్ని వృక్షాలుకూడా ఈలోహాన్ని కేంద్రీకరించు కొంటాయి.

మోలిబ్డినం నిక్షేపాలు లేనిచోట్ల మొక్కలలో ఈ లోహము 0.00001% నుంచి 0.00005% వరకు ఉంటుంది. నిమ్నశ్రేణి (Lower-grade) నిక్షేపాలున్న చోట్ల ఈలోహపు విలువ 0.00025% వరకు పెరుగుతుంది. అధికశ్రేణి నిక్షేపాలవద్ద 0.004% నుంచి 0.006% వరకు మోలిబ్డినమ్ ఉంటుంది. నిక్షేపాలలో ఉన్న కాపర్ విలువ మొక్కలలో మోలిబ్డినపు కేంద్రీకరణమీద ఏమాత్రం ప్రభావం చూపదు. మృత్తికలో ఫాస్ఫేట్ ఉన్నట్లయితే మొక్కలలోకి మోలిబ్డినమ్ ఎక్కువగా చేరుతుంది. నల్ఫేబ్ల పిషయంలో దీనికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది.

యురేనియ లోహంకోసం అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలలో జీవ భూరసాయనిక పద్ధతిలో అన్వేషణ జరపడం జరిగింది. అక్కడి పరిశోధనల ఫలితంగా శిలలోని యురేనియమ్ ఖనిజ నిక్షేపాలకు ఉపరితలంమీది మొక్క భాగాలలోని యురేనియమ్ లోహపరిమాణాలకు ప్రత్యక్షానుబంధము ఉంది (Direct Relationship). యురేనియమ్ నిక్షేపాన్వేషణకు బాగా లోతుకు వెళ్లువాతుకొని పోయిన పెద్దవృక్షాలు కూడావనికి వస్తాయి. ఈపద్ధతిని అమెరికాలో 25 మీటర్లలోతున ఉన్న యురేనియమ్ నిక్షేపాల ఉనికిని కనుక్కొన్నారు. మొక్కలు పీల్చుకొనే యురేనియమ్ పరిమాణము అంతర్భాగ జలాలలోని ఈలోహపు సాంద్రీకరణ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మనదేశంలోకూడా చాలా లోతువరకు వెళ్లని పరిశోధనలు పెద్ద పెద్ద వృక్షాలనే అన్వేషణకు సమూహాలుగా తీసుకొంటే మంచిది. యురేనియమ్ నిక్షేపాన్వేషణ ప్రారంభించే ముందు అక్కడి అవక్షేప శిలల నతి (Dip) దిశను చూసుకొని, అక్కడి అంతర్భాగ జలాల ప్రవాహం ఏదిశలో ఉందో పరిశీలించవలె. అన్వేషణకు కావలసిన సమూహాలను నతి దిశకు అడ్డంగా తీసుకోవలె. ఒక్కొక్క గ్రైడ్ నతికి అడ్డంగా ఉంటుంది.

(66, 67, 68 పేజీలలోని పటాలలో చూపించిన విధంగా.)

జీవభూరసాయనిక పద్ధతులు టంగ్ స్టన్ గోల్డ్, అవురూపలోహాలు, బేరియమ్ మొదలైన లోహాల నిక్షేపాలను వెదకడానికి కూడా పనికి వస్తాయి. జీవభూరసాయనిక పద్ధతద్వారా నిక్షేపాన్వేషణ చేసేటప్పుడు మొదటి సర్వేక్షణలో మొక్కల సమూహాలను 75 మీటర్ల దూరాలలో తీసుకోవచ్చు. ఖనిజ నిక్షేపాలు బహిర్గతమైన సందర్భాలలోను, మొదటి సర్వేక్షణలో పరివేషాల తీరు అర్థమైన సందర్భాలలోను మొక్కల సమూహాలను 10 గాని, 15 గాని మీటర్ల దూరా

లలో తీసుకోవలె. వాలుకు అడ్డంగా మాత్రం ఈ దూరం 5 నుంచి 10 మీటర్ల వరకు ఏర్పరచుకోవలె.

జీవభూరసాయనిక నిక్షేపాన్వేషణలో కింది విషయాలను బాగా గుర్తుంచుకోవలె.

(1) నిక్షేపాన్వేషణ జరిగే స్థలంలో ఒకేరకపు మొక్కలలోని ఒకే రకపు మొక్క భాగం బూడిదలను లోహపు పరిమాణాలను పోల్చిచూడవలె లోహకేంద్రీకరణ సాంవత్సరిక పుష్పాలలోకన్న (Annual plants) నర్మకాల పుష్పాల (Perennial Plants) లోను, కాండాలు, కొమ్మలలోకన్న వేళ్ళలోను, ముదురుకొమ్మలలో కన్న లేత కొమ్మలలోను, హెచ్చుగా ఉంటుంది.

(2) నిక్షేపాన్వేషణ జరిగే ప్రదేశము విశాలంగా ఉండి అందులో ఒకే రకపు మొక్క వీన్లను ఉండనప్పుడు నమూనాలను వివిధ రకాల మొక్కల నుంచి కూడా సేకరించవచ్చు.

(3) ఎడారి ప్రాంతాలలో ఈ పద్ధతి ప్రకారం తక్కువ లోతులలో ఉన్న నిక్షేపాలను, అతివృష్టి ప్రాంతాలలో అంతకంటే హెచ్చులోతులలో ఉన్న నిక్షేపాలను, సాధారణ వర్షపాతపు ప్రదేశాలలో అంతకంటే హెచ్చులోతులలో ఉన్న నిక్షేపాల ఉనికిని కనుక్కోవచ్చు. చుంచుతో కప్పబడిన ప్రాంతాలలో నిక్షేపాలను కనుక్కోనేలోతు చాలా తక్కువ.

(4) జీవభూరసాయనిక నిక్షేపాన్వేషణ పద్ధతిని విడిగా కాక మిగిలిన పద్ధతులతో బాటుగా వాడవలె. ఈ పద్ధతిలో ఋణాత్మక విలువలు (Negative Values) వచ్చినంత మాత్రాన నిక్షేపాన్వేషణను ఉపసంహరించుకోరాదు. కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో లోహాయతద్రావణాలు మొక్కల వేళ్ళను చేరుకోవడానికి పీలులేకుండా క్షే, మండలం ఉన్నట్లు ఇటువంటి ఋణాత్మక విలువలు సూచించడం జరుగుతుంది.

5. బహిర్ ప్రదేశాలలో జీవ భూరసాయనిక పద్ధతులు తదితర పద్ధతులకు సహాయకారులు మాత్రం గానే ఉంటాయి. కాని దట్టమైన అడవులతో కప్పబడిన ప్రాంతాలలో ఇతర భూరసాయనిక పద్ధతులు, భూభౌతిక శాస్త్ర పద్ధతులు పనికిరాని కారణం వల్ల జీవ భూరసాయనిక పద్ధతులను నిక్షేపాన్వేషణకు ప్రథమ సోపానంగా భావించవచ్చు. ఎడారులలోను, విస్తృతమైన

మైదానాలలోను శిలాశైథిల్యావ శిష్టాలతో కప్పబడిన ప్రాంతాలలోను ఈ వద్దతులు విజయవంతమైన విలువలనిస్తాయి.

భూ-వృక్ష శాస్త్ర పద్ధతి (Geo-Botanical Method)

కొన్ని మొక్కలు ఒక రకమైన సంఘటన ఉన్న మృత్తిక మీద వృద్ధి చెందుతాయనే ధర్మం మీద భూ-వృక్షశాస్త్ర నిశ్చేపాన్వేషణ పద్ధతి ఆధారపడి ఉంది. మొక్కలు జీవించడానికి, అభివృద్ధి చెందడానికి కొన్ని అప్రధాన మూలకాలే కాకుండా కొన్ని ముఖ్యమూలకాలు కూడా అవసరము (K, Ca, Mg, Na, P, S and C). ఈ మూలకాలు మొక్కల వేళ్ళ ద్వారా వివిధ భాగాలకు విస్తరించడం జరుగుతుంది. వీటిలో కొన్ని మూలకాలు మొక్కల పెరుగుదలకు తోడ్పడతాయి. మరికొన్ని ఈ పెరుగుదలను ఆరికడతాయి. కొన్ని అప్రధాన మూలకాలు మొక్కలకు ఉపయోగకారులుగా ఉంటాయి; మరికొన్ని వాటికి విషపూరితాలుగా ఉంటాయి. మృత్తిక పొరలలోని మూలకాలను పీల్చుకొని రేండ్రికరించుకొనే శక్తి మొక్కలన్నింటికీ ఒకే ప్రమాణంలో ఉండదు. కొన్ని మొక్కలు కొన్ని మూలకాలను కేంద్రీకరించుకొంటాయి. మృత్తిక పొరలలో కొన్ని మూలకాలు సాధారణ పరిమాణంకంటే హెచ్చుగా ఉన్నట్లయితే మొక్కలలో ప్రయోజనకరమైన మార్పులుగాని, అప్రయోజనకరమైన మార్పులుగాని సంభవిస్తాయి. వీటివల్ల వచ్చే ఫలితాలు మొక్కల ఆకుల రంగులలోను, పువ్వులలోను బాగా కనిపిస్తాయి. హానికరమైన మూలకాలు ఎక్కువ పాళ్లలో ఉన్న ప్రాంతాలలో కొన్నికొన్ని మొక్కలు పెరిగవు. అందువల్ల అటువంటి మూలకాలు రేండ్రికరింపబడి ఉన్న నిశ్చేపాలున్న చోట్ల ఖాళీ స్థలాలు కనిపిస్తాయి. కొన్ని సందర్భాలలో మొక్కల స్వరూపాత్మక లక్షణాలలో కొద్ది కొద్ది మార్పులు కనిపిస్తాయి. ఈ మార్పులు పత్రసాంద్రతలోను, పత్రవర్ణంలోను, పుష్పపరిమి ఐము, వర్ణాలలోను, వండ్లు, విత్తనాల ఉత్పత్తిలోను కనిపిస్తాయి. ఈ విధంగా కొన్ని మొక్కలు మాంగనీస్ మృత్తికమీద దట్టంగా పెరుగుతాయి. పువ్వులరంగు అధికంగా ఉంటుంది. కొన్ని పువ్వులరంగు తెలుపునుంచి గులాబీ రంగుకు మారుతుంది. కొన్ని మొక్కల ఆకుల ఆకారం మారుతుంది. కొన్నికొన్ని మొక్కలను ఆ ప్రాంతాల మృత్తిక సంఘటనకు, భూస్వరూపానికి సూచనలుగా తీసుకోవచ్చు.

భూ-వృక్షశాస్త్రవద్దతి నహాయంతో నిక్షేపాన్వేషణ జరపడానికి ప్రాంతీయ పరిస్థితులలో ఏవీ మొక్కలు ఎటువంటి మృత్తికమీద పెరుగుతాయో, ఏ మొక్కలు ఏవీ మూలకాలను కేంద్రీకరించుకొంటాయో తెలుసుకోవలె. మొక్కలలో మార్పులు (హానికరమైనవిగాని, ఉపయోగకరమైనవిగాని) తీసుకొని రాగల లోహమూలకాలు జింక్, కాపర్, ఐరన్, మాంగనీస్, లెడ్, లిథియం, అల్యూమినియమ్, మోలిబ్డినమ్, యురేనియమ్, థోరియమ్ మొక్కలలో విపరీతమైన మార్పులను కలగజేస్తాయి. వీటివల్ల మరుగుజ్జు మొక్కలు; అతినిడివి గల మొక్కలు కూడా పెరుగుతాయి. బోరాన్, సల్ఫైడ్ నిక్షేపాలు ఎక్కవగా ఉన్న మృత్తికమీద వృక్ష సంపద పెరగకుండా నగ్న ప్రదేశాలు ఏర్పడతాయి. కాపర్ ఎక్కువగా ఉన్న మృత్తికమీద చెట్లుగాకుండా పొదలు మాత్రమే పెరగవచ్చు.

సోవియట్ దేశంలోని అల్టాయ్ పర్వత శ్రేణులలో ఖనిజీకృతమై ఉన్న ప్రదేశాలలో *Gypsophila patrini* అనే “గడ్డిమొక్క” కాపర్ ఖనిజ మండలంతో చాలా సన్నిహితంగా ఉంటుంది. ఈ మొక్క కాపర్ ఖనిజీకరణ జరిగిన మండలం మీదనే పెరుగుతున్నట్లు పరిశోధనలో కనుక్కోవడం జరిగింది. అక్కడి పరిశోధనలను బట్టి ఈ మొక్క పెరుగుదలకు, మృత్తికలోగాని ఆధార శిలలలోగాని ఉన్న కాపర్ పరిమాణానికి చాలా సన్నిహిత సంబంధమున్నది. ఈ మొక్క విస్తారంగా పెరిగే చోట్ల ఆధార శిలలలోని కాపర్ విలువ 0.1 నుంచి 3.0 శాతం వరకు ఉంది.

ఈ విధంగా ఖనిజీకృత మండలానికి సూచకగా పనికివచ్చే వేరొక మొక్క *Astragalus*. కొలొరెడో పీఠభూమి మీద ఉన్న యురేనియమ్ ఇసుక రాళ్ళకు ఈ మొక్క సూచకగా ఉపయోగపడింది. దీని వేళ్ళు భూమిలో 10 మీటర్ల వరకు వ్యాప్తి చెందడంవల్ల 25 మీటర్ల లోతున ఉన్న ఖనిజ మండలాన్ని కూడా ఈ మొక్క సూచిస్తుంది. ఈ మొక్కలో సెలీనియమ్ చాలా హెచ్చుపాళ్ళలో ఉంటుంది. యురేనియం ఖనిజంలోని సెలీనియం పరిమాణాన్ని బట్టి ఈ మొక్క విస్తరించబడి ఉంటుంది. కార్నెల్లెట్ వున్న ప్రదేశాలలో సెలీనియమ్, సల్ఫర్, ఇవి రెండూ వున్న ప్రదేశాలలో యురేనియమ్ ఈ మొక్కలో చాలా సులభంగా ప్రవేశిస్తాయి. సల్ఫర్, కాల్షియమ్లను పీల్చుకొనే మొక్కలుకూడా యురేనియమ్ ఖనిజమండలానికి సూచకలుగా ఎన్నుకోవచ్చు. యురేనియమ్ ఖనిజాన్వేషణలోని విజయవంతమైన ఫలితాలు ఖనిజీకృత

మండలపు రోతునుబట్టి మొక్కలకు ఆవసరమైన సెలీనియమ్, నల్ఫర్ల ఉనికిని బట్టి ఉంటాయి. తక్కువ సెలీనియమ్ పరిమాణంతో ఉన్న యురేనియమ్ ఖనిజాలనుంచి యురేనియమ్ ను సంగ్రహించే మొక్కలు కూడా ఉన్నాయి. మన దేశ వాతావరణంలో ఏ మొక్కలు యురేనియమ్ ఖనిజాలకు సూచికలుకా వనికి వస్తాయో ఎంచుకోవలె. సూచిక మొక్కలను (Indicator plants) మామూలుగా గాని ఎయిరియల్ ఫోటోగ్రాఫ్ల సహాయంతోగాని మానవీకరణ చేయవచ్చు. ఈ విధమైన నిక్షేపాన్వేషణకు ముందుగా ఆ ప్రదేశంలోని ఆధారశిలల వైఖరి, వినరాలతీరు, అంతర్భూమి జలాల ప్రవాహవిశ, వతులీతులు తదితర నై సర్గిక స్వరూప, భూవిజ్ఞాన రూపురేఖలను అర్థం చేసుకోవలె.

లియేనియా, బ్రాసికేసియా, పోలిగోనేసియా కుటుంబాలకు చెందిన కొన్ని మొక్కలు జిప్సమ్ నిక్షేపాల ఉనికికి సూచికలుగా తీసుకోవచ్చు. భూవిజ్ఞాన-వృక్షశాస్త్రపద్ధతులను నిక్షేపాన్వేషణకేకాకుండా, శిలలరకాలను, అంతర్భూమిజల మండలాలను, లవణ మండలాలను, లవణకలశాలను, బైటుమిన్ ఎక్కువగా ఉన్న స్థలాన్ని గుర్తించడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు, అంతర్భూమి జలప్రవాహాలను కనుక్కోవటానికి, అందుమూలంగా జల భూ-సాయనిక పద్ధతులను ఉపయోగంలో పెట్టటానికి ఈ పద్ధతి చాలా సహాయకారి. భూవిజ్ఞాన వృక్షశాస్త్ర పద్ధతులు ఎయిరియల్ ఫోటో విశదీకరణతో జతపరచ వలసి ఉంటుంది. ఈ విధంగా చేస్తే భూవిజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞునికి నిక్షేపాన్వేషణ విదేశలో ప్రారంభించవలసో తెలుస్తుంది. ఈ పద్ధతిలోని విశిష్టత కంటితో చూడగానే నిక్షేపం స్వభావం తెలుస్తుంది. ఇందులోని రోపము—ఇది ఖనిజీకృతమండలాలను ప్రత్యక్షంగా చూపదు. దట్టమైన అటవీప్రదేశాలలోను, హెచ్చునిమ్నాన్నతాలున్న ప్రదేశాలలోను ఈ పద్ధతి చాలా అవసరము. ఈ సర్వేక్షణ ద్వారా అటువంటి ప్రదేశాలలోని కొన్ని ప్రాంతాలను భూవిజ్ఞాన రసాయనిక సర్వేక్షణకు ఎన్నిక చేసుకోవచ్చు. మన దేశంలో చాలా ప్రదేశాలు దట్టమైన అడవులతో కప్పబడిఉన్నాయి. మనకు బాగా తెలిసిన నిక్షేపాలమీద ఎటువంటి మొక్కలు పెరగవున్నాయో తెలుసుకొని ఇతర ప్రాంతాలలో ఈ సూచిక మొక్కలను వెదికి తరవాత భూవిజ్ఞాన సర్వేక్షణ గాని లేదా భూవిజ్ఞాన రసాయనిక సర్వేక్షణగాని జరిపించవలె. తగిన శ్రద్ధ తీసుకొని పరిశోధనలు జరిపినట్లయితే వివిధ నిక్షేపాన్వేషణకు సూచికలుగా వనికి వచ్చే మొక్కలను గుర్తించవచ్చు.

భూరసాయనిక సర్వేక్షణ -

శాస్త్ర పురోగతినిబట్టి సర్వేక్షణ పద్ధతులలో అనేక రకాలయిన మార్పులు వచ్చినాయి. భూరసాయనిక సర్వేక్షణ గురించి చాలాకాలం క్రితం ప్రారంభం జరిగినప్పటికీ ఇటీవలే ఈ పద్ధతి ఎక్కువ అమలులోకి రావడానికి కొన్ని కారణాలున్నాయి. నిక్షేపావసరాలు ఎక్కువ కావడం ముఖ్యకారణము. బహిష్కరణలనేని ప్రదేశాలలో నిక్షేపాన్వేషణ ఈ పద్ధతి మూలంగా జరిపించగలగడం రెండవ కారణము. శాస్త్ర పురోగతి మూడవ కారణము. భూరసాయనిక మాన చిత్రీకరణను ఈ కింది శిలలలో మూలకాల విస్తరణను గురించి తయారు చేయవచ్చు.

- (1) ఆధారశిలలు.—అగ్నిశిలలు, రూపాంతరప్రాప్త శిలలు
- (2) వివిధ యుగాల అవశేషశిలలు
- (3) వివిధ రకాల విరూపకారక నిర్మితులు
- (4) క్వాటర్నరీ అవశేషాలు
- (5) వివిధ రకాల శిలల కలయిక
- (6) జలసమూహాలు లేదా ప్రవాహాలు

భూరసాయనిక మానచిత్రాన్ని తయారు చేసేటప్పుడు ముఖ్య మూలకాల విస్తరణను, అనుబంధ మూలకాల విస్తరణను, ఖనిజీకృత నిర్మితులతో సంబంధాలున్న కొన్ని మూలకాల సమూహాలను చిత్రీకరించవచ్చు. భూరసాయనిక మానచిత్రాలలో మూలకాల ఉనికి కాకుండా వాటి పరిమాణాలను కూడా సూచించవచ్చు.

సర్వేక్షణ ఏ స్కేల్‌లో చేయవలసిందీ మన ఖ్యేయాలనుబట్టి, ఖనిజీకృత మండలపు వైశాల్యాన్నిబట్టి ఉంటుంది. ఖనిజీకృతమండలము ఎక్కువగా ఉండి శిలలతో చాలా సన్నిహితంగా ఉంటే చాలా చిన్న స్కేల్‌లో సర్వేక్షణ జరిపించవలె. భూరసాయనిక సర్వేక్షణ ఫలితాలను, భూభౌతిక సర్వేక్షణ ఫలితాలతో కలిపి అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఉదాహరణకు నికెల్ నిక్షేపాన్వేషణలో ఈ రెండురకాల పరిశోధనలు ఉపయోగపడతాయి. ఇదేవిధంగా (గ్రాఫైట్ నిక్షేపాన్వేషణలో భూరసాయనిక పద్ధతులు, విద్యుత్ పద్ధతులు ఉపయోగపడతాయి. భూ భౌతిక సర్వేక్షణలో సరిహద్దులను నిర్ణయించుకొన్న బహువిధ సర్వేక్షణ నిక్షేపాలను భూరసాయనిక పద్ధతులద్వారా పరిశోధించేటప్పుడు పరిశోధన పరిధిని, మనము ఎంచుకునే సమూహాలను తగ్గించుకోవచ్చు.

భూ భౌతిక శాస్త్ర విధానాలు

శిలలుగాని, ఖనిజనముదాయాలుగాని బహిర్గత మయినప్పుడు మాత్రమే భూవిజ్ఞాన శాస్త్ర వద్దతుల ద్వారా నిక్షేపాన్వేషణ జరపవచ్చు. శిలా బహిర్గతాలు అన్ని వేళలందూ భూమిలోపల గుప్తంగా ఉన్న నిక్షేపాలకు ఆధారాలను ఇవ్వ లేక పోవచ్చు. భూవిజ్ఞాన, శాస్త్రాల ద్వారా నిక్షేపాన్వేషణ ఇప్పటికే చాలా హెచ్చు స్థాయిలో జరిగినందువల్ల భూమి అంతర్భాగంలో గుప్తంగాఉన్న నిక్షేపాలను బహిర్గత శిలల ఆవనరం లేకుండా కనుక్కో గలగడం చాలా ముఖ్యమని ఋజువయింది. దీనికి సహాయంగా భూభౌతిక శాస్త్రం అభివృద్ధి చెందింది. కాలక్రమేణా భూభౌతిక శాస్త్ర వద్దతుల ద్వారా శిలల ఉనికిని వాటి వివిధ భౌతిక ధర్మాలను బట్టి కనుక్కోవడం మొదలుపెట్టినారు. భౌతిక శాస్త్ర సూత్రాలను భౌతిక పరీక్షకు అన్వయించుకోవడమే భూ భౌతిక శాస్త్రానికి నాంది.

ధాతురాశులకు (Ore Bodies), శిలలకు వాటి భౌతిక ధర్మాలలో ఎంతో లేదా ఉంటుంది. ఈ భౌతిక ధర్మాలలోని భేదాలను భౌతిక పరీకరాల ద్వారా గుర్తించి ఖనిజాల ఉనికిని తెలుసుకోవచ్చు. ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో శిలల భౌతిక ధర్మాలను కనుక్కొన్నప్పుడు ఆ భౌతిక ధర్మాలు ఆ శిలలవేనా? లేదా ఖనిజాలకు సంబంధించినవా? అని మనము నిర్ణయించుకొన్నట్లయితే ఈ విజ్ఞానము ఖనిజాల ఉనికికి దారి తీస్తుంది. ఈ విధంగానే భూమి అంతర్భాగంలో మరుగునపడి ఉన్న అవనతులు, అభినతులు, భ్రంశాలు, లవణ కలశాలు, ఖనిజ రాశులు మొదలైన వాటిని భౌతిక పరీకరాలద్వారా కనుక్కోవచ్చు. వైన చెప్పిన రూపురేఖలు తెలస్తేనే, ఖనిజాన్వేషణ సమన్యలకు అన్వయించి ఉంటాయని మన కందరకూ తెలిసినదే.

శిలల భౌతిక ధర్మాలను బట్టి, మనము వెదికే ఖనిజాలను బట్టి ఏరకపు భూ భౌతిక శాస్త్ర వద్దతి ద్వారా అన్వేషణ సాగించవలెనో నిర్ణయించ వలసి ఉంటుంది. భూ భౌతిక శాస్త్ర వద్దతులు భూమి ఉపరితలం మీద, భూమికి

కొంత ఎత్తునుండి, బోర్ హోల్ లోను ప్రయోగించ వచ్చు. భూ భౌతిక శాస్త్ర పద్ధతులద్వారా ఖనిజాన్వేషణను చదునుగా ఉన్న ప్రదేశంలోగాని లేదా కొద్దిపాటి ఎత్తువల్లాలు గల ప్రదేశాలలోగాని సులభంగా సాగించవచ్చు. ఎత్తువల్లాలు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలలో ఈ పద్ధతులద్వారా ఖనిజాన్వేషణ కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. ఉపరిస్థితిభారము (over burden) తక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాలలో ఈ పద్ధతుల ద్వారా ఖనిజాన్వేషణ సులభసాధ్యంగా ఉంటుంది. అందువల్ల భూ భౌతిక శాస్త్ర పద్ధతుల ద్వారా ఖనిజాన్వేషణ జరిపించినప్పుడు వచ్చిన ఫలితాలను ఒకేరీతిగా వివరించకుండా ఆయా ప్రదేశాలలోని విభిన్న రూపురేఖలను బట్టి వివరణ చేయవలసి ఉంటుంది. భూ భౌతిక శాస్త్ర పద్ధతులద్వారా సేకరించిన ఫలితాలను భూవిజ్ఞాన శాస్త్ర పద్ధతుల ద్వారా సేకరించిన ఫలితాలతో జోడించి వివరణ చేసినట్లయితే ఖనిజాల ఉనికిని కనుక్కోవడం మరింత సులభ సాధ్య మవుతుంది.

భూభౌతిక శాస్త్రపద్ధతులు ఎనిమిది విధాలు:

- (1) అయస్కాంత పద్ధతులు, (2) గురుత్వాకర్షణ పద్ధతులు
- (3) విద్యుత్ పద్ధతులు (4) విద్యుదయస్కాంత పద్ధతులు,
- (5) కంపన పద్ధతులు (6) రేడియో ధార్మిక పద్ధతులు, (7) ఎయిర్ బోర్న్ భూ భౌతిక శాస్త్ర పద్ధతులు (8) రిమోట్ సెన్సింగ్ (remote sensing)

(1) అయస్కాంత పద్ధతులు :- శిలలోని అయస్కాంతత్వపు మార్పుల వల్ల ఏర్పడిన స్థానిక భూ అయస్కాంతశక్తిలోని అనంగతాలను కచ్చితంగా కొలవడం మీద ఈ పద్ధతి ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ పద్ధతులు అయస్కాంతత్వమున్న ఖనిజాలకు మాత్రమే పనికివస్తాయి. మాగ్నటైట్, (క్రోమైట్, నికెల్), కోబాల్ట్ ఖనిజాలు, పిర్రోటైట్, పైరైట్ మొదలైన అయస్కాంతత్వమున్న ఖనిజాలను కనుక్కోవడానికి ఈ పద్ధతులు ఎక్కువ వాడుకలో ఉన్నాయి. “మాగ్నటైట్ అంశ”గాని, “క్రోమైట్ అంశ”గాని ఉన్న శిలలన్నీ అత్యధిక అయస్కాంతత్వముకలవి. సాధారణంగా అవక్షేపశిలలు అల్ప అయస్కాంతత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయి. వివిధ అయస్కాంత శక్తులనుబట్టి భూ అంతర్భాగంలో ఏ ఏ రకాలయిన శిలలున్నాయో తెలుసుకోవచ్చు. ఐరన్ ధాతువులు-

ముఖ్యంగా మాగ్నటైట్, పైరైట్ ఉన్న శిలలకు అయస్కాంతత్వము మిగిలిన శిలలకంటె ఎక్కువగా ఉంటుంది.

పురా అయస్కాంతత్వ పరిశోధనలనుంచి అగ్నిశిలలకు, అవక్షేప శిలలకు కూడా వివిధ దశలలో శాశ్వత అయస్కాంతత్వము ఉంటుందని ఇటీవల ఋణ వయింది. ఈ శత్యత అయస్కాంతత్వపు దిశ ఆ ప్రాంతం ప్రస్తుత అయస్కాంత క్షేత్రదిశకు భిన్నంగా ఉంటుంది. ఈ శాశ్వత అయస్కాంతత్వము శిలలు చల్లబడేటప్పుడు పొందిన ఉష్ణశేష అయస్కాంతత్వమని దాని దిశ ఆ శిలలు చల్లబడేటప్పుడున్న భూ అయస్కాంత క్షేత్రపు దిశ అని నిర్ధారణ జరిగింది. చాలామటుకు అగ్నిశిలలోని శాశ్వత అయస్కాంతత్వము భూ అయస్కాంత క్షేత్రపు శక్తి నిమిచి ఉంటుంది. అందువల్ల అయస్కాంత పద్ధతిలో ఖనిజాన్వేషణ సాగించే స్థలాలలోని అయస్కాంత అసంగతాలను వివరణ చేసేటప్పుడు ఆ స్థలాలలోని శాశ్వత అయస్కాంతత్వాన్ని మరవకూడదు. లేకపోతే ఫలితాలు పక్కదారులుతీస్తాయి. ఈ విధంగా అగ్నిశిలలో మాగ్నటైట్ నిక్షేపాలను వెదికేటప్పుడు ఇటువంటి జాగ్రత్త వహించవలె.

ఏ ప్రదేశంలోనైనా భూ అయస్కాంత క్షేత్రంలోని అయస్కాంతపు అసంగతాలను గుర్తవటవలెనంటే భూక్షేత్రంయొక్క నిశ్చల గుణాన్ని కనుక్కోవలె. ఈ భూక్షేత్రము ఏ ఒక్క ప్రదేశంలో కూడా స్థిరాంకంగా ఉండకుండా మార్పులు చెందుతూ ఉంటుంది. ఇటువంటి మార్పులలో వైశిక సంబంధ మయినవి, అయస్కాంతపు తుఫానులకు సంబంధించినవి ముఖ్యమైనవి. అయస్కాంత సర్వేక్షణల ఫలితాలలో ఇటువంటి మార్పులవల్ల కలిగే ప్రభావాల్ని తొలగించవలె.

అయస్కాంత మావనలు తీసుకొనేటప్పుడు ముందుగా ఎంచుకొన్న ఆనుకూలమైన ఆధారస్థలాలలోని అయస్కాంతపు విలువలకు ఈ విలువలకు గల భేదాలుగా వివరించడం జరుగుతుంది. ఖనిజాన్వేషణకు ఎన్నుకొన్న స్థలం చాలా చిన్నది అయినప్పుడు, ఆ స్థలంలోని భూ అయస్కాంత క్షేత్రము స్థిరాంకంగా భావించబడి ఆధార స్థలపు విలువకు సమానమయినదిగా ఊహించడం జరుగుతుంది. ఖనిజాన్వేషణ కొనసాగించే స్థలము చాలా విశాలమైనదయినట్లయితే భూ అయస్కాంత క్షేత్రంలోని మార్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది. అటువంటి సందర్భాలలో దీనికి సవరణ అవసరము.

అయస్కాంతత్వాన్ని మాపనం చేయడానికి వివిధరకాలయిన పరికరాలు ఉన్నాయి. అవి (1) పివోటెడ్ నీడిల్ పరికరాలు (Pivoted needle Instruments,) (2) వేరియోమీటర్లు (Variometers,) (3) ఫ్లక్స్-గేట్ పరికరాలు (Flux-gate Instruments), (4) ప్రోటాన్ ప్రిసెషన్ మాగ్నెటోమీటర్ (Proto-Precession magnetometer). వీటిలో వేరియోమీటర్ల సహాయంతో తీసుకొన్న మాపకాలలో కచ్చితత్వము ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫ్లక్స్-గేట్, ప్రోటాన్ మాగ్నెటోమీటర్లను ఉపయోగించి బోర్ హోల్లలోను, నీటిలోను, విమాన మార్గంలోను కూడా మాపనలు తీసుకోవచ్చు.

ఏ ప్రదేశంలోనైనా భూ అయస్కాంత క్షేత్రము ఆ ప్రదేశపు అయస్కాంతక్షితిజసమాంతర H (Horizontal), క్షితిజలంబ Z , అంశాల మైన, D అవసరి, (Declination) మీదా ఆధారపడి ఉంటుంది. భూ అయస్కాంతత్వము స్థిరాంకం కాదు. దైనిక మార్పులనుబట్టి, అయస్కాంతపు తుపానలను బట్టి, అది మార్పుచెందుతుంది.

అయస్కాంతపు అసంగతాల మాపనము

అంతర్భూమి స్వరూపం కొలతలలోను, అయస్కాంత గుణాలలోను వచ్చే మార్పులవల్ల మార్పుచెందని అయస్కాంతమూలకము ఆ క్షేత్రం దిశ. అందువల్ల దీనిని కచ్చితమైన ఫలితాలు కావలసిన సందర్భాలలో ఉపయోగించరు. మిగిలిన అయస్కాంతమూలకాలలో—అంటే H, Z, F లో ఏ ఒక్కటి అయినాగాని అంతకు ఎక్కువ గాని మూలకాలను ఎన్నుకొని వాటి తాలుకు అసంగతాలను, $\Delta H, \Delta Z, \Delta F$ మాపనం చేయవచ్చు. (F -శాశ్వత అయస్కాంత క్షేత్రము) ΔF అనేది శాశ్వత అయస్కాంత క్షేత్రదిశకు కూడా సంబంధించి ఉంటుంది. కనక ఈ అసంగతాల మాపనము కష్టమైనది. $\Delta H, \Delta Z$ మాపకాలలో రెండవది అనుకూలమైనది. ఎందువల్లనంటే భూమి అంతర్భాగంలో ఎటువంటి శిలలు, ఖనిజాలు ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి ΔH , కంటే ΔZ ఎక్కువ సహాయకారి అవుతుంది. కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో ఈ రెండింటిని మాపనం చేస్తారు.

క్షేత్రపద్ధతి

అయస్కాంత పరిశోధనకు ఏదైనా ఒక ప్రదేశాన్ని ఎన్నుకొన్న తరువాత

అందులోని శిలల అనువైర్భాసికి సమాంతరంగా ఆధార రేఖను తీసుకోవాలి. ఈ ఆధారానికి లంబదిశలో క్రమమైన అంతరాలలో తీసుకొన్న రేఖలగుండా మాపనాలు చేయవలె. కృత్రిమ విక్షోభాలు కలగజేసే పిద్యుత్తేజాలు మొదలైన వాటికి పీలయినంత దూరంలో ఒక నిర్దేశకస్థానాన్ని ఎన్నుకొని ఆ ప్రదేశంలోని అయస్కాంత మాపనలు నిర్దేశకస్థానం వద్దనున్న అయస్కాంత శక్తికి ఋణభేదాలుగా గాని, ధనభేదాలుగా గాని మాపనం చేసుకోవాలి. అయస్కాంత సర్వేక్షణచేసే ప్రదేశానికి ఆపరి గాని, ఆ ప్రదేశంలో గాని నిర్దేశక స్థానాన్ని (Reference Point) ఎన్నుకోవచ్చు. ప్రదేశానికి దగ్గరగా గాని, ప్రదేశంలో గాని అయస్కాంత క్షేత్రము సామాన్యంగా ఉన్నచోట ఈ నిర్దేశకస్థానాన్ని ఎన్నుకొంటే చాల సుకరము.

అయస్కాంత మాపనలు చేసేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఖనిజాన్వేషకుని వద్ద అయస్కాంత పస్తువులు ఉండరాదు. మోటార్లు, పనికిరాని ఇనుప సామాను, రైల్వేలైన్లు, వంతెనలు మొదలైన వానివద్ద మాపనలు తీసుకోరాదు. భూ క్షేత్రంలోని వైదిక మార్పులు మరొక పరికరం సహాయంతో గమనిస్తూ అయస్కాంత మాపనల విలువలలో తగిన సవరణలు చేసుకోవాలి. ఉష్ణోగ్రతలోని మార్పులకు, భూభాగపు నిమోగన్యతలకు కూడా సవరణలు చేసుకోవాలి. ఏ ప్రదేశంలో నయినా అనంగతాలను మాపనం చేసేటప్పుడు గమనించవలసిన ముఖ్య విషయము- భూస్యస్థానం (Zero point) - అంటే ఎక్కడైతే అయస్కాంత క్షేత్రము సాధారణమైన సంక్షోభ రహితమైన భూ అయస్కాంత క్షేత్రంగా ఉంటుందో అక్కడ పరికరాలు సూచించిన విలువ అన్నమాట. ఒక ప్రదేశంలో ఈ భూస్యస్థానం చాలాభాగం స్థిరాంకంగా ఉన్నట్లయితే అక్కడి అయస్కాంత మాపనలన్నీ ఈ భూస్యస్థానానికి అన్వయిస్తూ అనంగతాల విలువలను తీసుకోవచ్చు. ప్రాంతీయ అనంగత ప్రవణతలు, భూభాగ లక్షణాలు, వివిధ అయస్కాంత శక్తులున్న శిలల స్పర్శలు ఒకే భూస్యస్థానాన్ని నిర్దేశకంగా ఉంచుకోవడానికి పీలుపడనీయవు.

ΔZ , ΔH విలువల సమోన్నత రేఖల కేంద్రీకరణ, వికేంద్రీకరణలను బట్టి భూ అంతర్భాగంలోని శిలల అయస్కాంత గుణాలు, వాటిని బట్టి శిలల స్వభావము కనుక్కోవచ్చు. భౌమ శిలా పిశ్యాన పరిజ్ఞానంతోబాటు అయస్కాంత అనంగతాలను కలిపి వివరణచేస్తే ఫలితాలు ఖనిజాన్వేషణను సులభ

తరం చేస్తాయి. అయస్కాంత నర్వేక్షణతో మాగ్నెటైట్ క్రోమైట్, సల్ఫైడ్ ఖనిజాల ఉనికిని కనుక్కోవచ్చు.

గురుత్వాకర్షణ పద్ధతులు

నిర్దేశకస్థానానికి, పరిశీలన స్థానానికి మధ్యగల గురుత్వాకర్షణలోని భేదాలు (Δg) ఆధారంగా తీసుకొని భూ అంతర్భాగంలోని నిర్మితులను కనుక్కోవచ్చు. గురుత్వాకర్షణ అసంగతాలు చాలా తక్కువ విలువలతో ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని మాపనం చేసే పరికరాలు గ్రావిమీటర్లు (Gravimeters) చాలా సున్నితమైనవిగా ఉంటాయి. ఈ గ్రావిమీటర్లు (1) నిశ్చలమైనవి (2) అనిశ్చలమైనవి అని రెండు రకాలు.

గురుత్వాకర్షణ విలువలను గ్రావిమీటర్ల సహాయంతో మాపనం చేసే ముందు నిర్దిష్ట ప్రదేశాన్ని చదరపు గ్రిడ్ గా భాగించవలె. అన్నేషింపబడే ధాతువును బట్టి ఈ గ్రిడ్ అంతరాలు ఏర్పరుచుకోవచ్చు. తైలాన్నేషణకు 0.5 కి. మీ నుంచి 1 కి.మీ. వరకు గ్రిడ్ అంతరము ఉండవచ్చు. ధాతు ఖనిజాన్వేషణలో అంతరపు విలువ 10 నుంచి 50 మీటర్ల వరకు ఉండవలె. ఇంతకు మించరాదు. గ్రావిమీటర్లను నెలకొల్పిన స్టేషన్ల భౌగోళిక స్థానాలను, వాటి ఎత్తులను కచ్చితంగా తెలుసుకోవలె. అప్పుడే గ్రావిమీటర్లతో కనుక్కొన్న విలువలను ప్రమాణ నిర్దేశక పరిస్థితులకు తగ్గించుకోవడానికి వీలవుతుంది. గురుత్వాకర్షణ పై రేఖాంశము, ఎత్తు, ప్రదేశాలలో ఉన్న శిలావిన్యాసాలు, స్థలాకృతి, సూర్య చంద్రుల ఆకర్షణ తమ ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. అందువల్ల గురుత్వాకర్షణ అసంగతాలను అర్థంచేసుకొనే ముందు ఈ వైన పేర్కొన్న వాటికి సవరణలు చేసుకోవలె.

గురుత్వాకర్షణ అసంగతాలను వివరణ చేసుకొనేటప్పుడు ఆ స్థలంలోని శిలా సాంద్రతలను ప్రయోగశాల పద్ధతులతోను, క్షేత్ర పద్ధతులతోను, కనుక్కోవలె. వివిధ రకాలయిన నిర్మితులు ఏ విధమయిన గురుత్వాకర్షణ అసంగతాలను సూచిస్తాయో ముందుగానే తెలుసుకోవలె. శిలలలోని కొద్దిపాటి తేడాలవల్ల కలిగే అసంగతాలను బట్టి శిలలలోని మార్పులను, దానికి సంబంధించిన ఖనిజ విశేషాలను గుర్తుపట్టవచ్చు. ముందుగానే తెలుసుకొని ఉంచుకొన్న గురుత్వాకర్షణ అసంగతాలను బట్టి అటువంటి మార్పులను సూచించే శిలలు ఏ ఆకారంలో (గోళాకారము, క్షితిజ

సమాంతరంగా ఉన్న స్తంభాకారము, దీర్ఘచతురస్రము మొదలైనవి) ఉన్నాయో తెలుసుకోవచ్చు. క్రమరహితమైన ఆకారంలో ఉన్న శిలల ఉనికిని తెలుసుకోవడానికి రేఖాచిత్ర పద్ధతులెన్నో ఉన్నాయి.

గురుత్వాకర్షణ పద్ధతిలో మనము భూమిపైన ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో గురుత్వాకర్షణ ఎంతో తెలుసుకొని దానిని బట్టి భూ అంతర్భాగంలో ఏవిధమైన శిల ఎటువంటి రూపంలో ఉందో కనుక్కోవడం సాధ్యమవుతుంది.

గురుత్వాకర్షణ పద్ధతుల వల్లను, ఆయస్కాంత పద్ధతుల వల్లను సేకరించిన సమాచారం వల్ల మాత్రమే భూ అంతర్భాగంలోని శిలల స్వరూపము, ఆకృతి తెలుసు కోవడం కష్టము. వీటికి సహాయంగా భూవిజ్ఞాన శాస్త్ర సమాచారము, బోరుహోల్ దత్తాంశాలు చాలాముఖ్యము.

గురుత్వాకర్షణ పద్ధతుల వల్ల మనము కనుక్కోగల విషయాలు నాలుగు: (1) శిలలలోని తేడాలు, (2) శిలలవిస్తరణ, (3) శిలలు ఉన్నలోతు (4) శిలల ద్రవ్యరాశి.

విద్యుత్ పద్ధతులు

ఈ విద్యుత్ పద్ధతులలో విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని భూమిలోకి పంపి దాని ఫలితంగా ఏర్పడిన శక్తాల (Potentials) పిసరణ రీతులను మాన చిత్రీకరణ చేసి తెలుసుకోవడం ముఖ్యమైన విషయము. భూమితో విద్యుత్స్పృహ ఏర్పడటానికి అవకాశాలున్న చోట్లమాత్రమే ఈ పద్ధతులు పనికిపస్తాయి. అందు వల్ల ఈ పద్ధతులు విద్యుత్ వాహకాలు గాని ఎడారి శిలాప్రాంతాలలోను, గడ్డకట్టిన భూభాగాలలోను ఎంతమాత్రం పనికిరావు.

భూమిలో ఒక భాగం వద్ద విద్యుత్ను ప్రవేశపెట్టి మరొక భాగం వద్ద ఆ విద్యుత్ వెలికి వచ్చేట్లు ఏర్పాటు చేస్తే ఈ రెండు ప్రదేశాల మధ్యనున్న విద్యుత్ శక్తాలను లెక్కగట్టి చెప్పవచ్చు. ఒకవేళ భూమిలో విద్యుత్వాహకమైన ఏ ఖనిజ నిక్షేపమయినా ఉన్నట్లయితే ఈ శక్తాలలో తేడాలు కనిపిస్తాయి. విద్యుత్ను ప్రవేశపెట్టిన భూభాగంలో కన్నా హీన విద్యుత్వాహకపు వద్దార్థమున్నా ఈ శక్తాలలో తేడాలు కనిపిస్తాయి.

భూమిలో ఆతిథేయ శిలల కన్న మంచి విద్యుత్ వాహకమైన నిక్షేపమున్నప్పుడు పంపిన విద్యుత్ ఆతిథేయ శిలలో ప్రవహించడం కంటే ఈ నిక్షేప

పంలో ప్రవహించడానికి ఎక్కువ అవకాశముంటుంది. అందువల్ల విద్యుత్ ప్రవాహపు రేఖలు, సమ పొటెన్షియల్ రేఖలు (Equipotential Lines) ఈ నిక్షేపం సమీపంలో వక్రగతి చూపుతాయి. దీనికి ఫలితంగా నిక్షేపానికి సరిగా ప్రైభాగంలో వోల్టేజ్ (Voltage) ఏకరీతిలో ఉంటుంది. నిక్షేపం అంచులలో ఏ రెండు ప్రాంతాల మధ్యనైనా వోల్టేజ్ తేడాలు ఎక్కువవుతాయి. నిక్షేపము ఆతిథేయ శిల కన్న పీనవిద్యుద్వాహక మయిన సందర్భంలో, విద్యుత్ నిక్షేపాన్ని విడిచి పెడుతుంది. దీనికి ఫలితంగా నిక్షేపం ప్రైభాగంలో వోల్టేజ్ తేడాలు ఎక్కువవుతాయి. నిక్షేపం అంచులభాగాలలో ఇవి తగ్గుతాయి.

భూమి అంతర్భాగంలో ఉన్న ఖనిజ నిక్షేపాలకు, ఆతిథేయ శిలలకు వాటి నిరోధక శక్తులలో భేదాలు ఉంటాయి. నిక్షేపాన్వేషణ జరిపే ప్రదేశంలోని శిలల ఖనిజాల నిరోధక శక్తులు ఏవిధంగా ఉన్నాయో తెలుసు కోవడం చాలా అవసరము. సజాతీయ పదార్థాల (Homogeneous substances) విద్యుత్ నిరోధక శక్తిని కొలవడం అంత కష్టమైన పనికాదు. మాగ్నెటైడ్, పైరైట్, గెలీనా, వైరేలు సైడ్, గ్రాఫైట్ మొదలైన ఖనిజ నిక్షేపాలను ఏకసజాతీయాలగా తీసుకోవచ్చు. శిలల ఖనిజాల విద్యుత్ నిరోధకశక్తులను ప్రయోగశాలలో భౌతిక పరికరాల సహాయంతో కనుక్కోవచ్చు. వీటి విలువలు అనేక కారకాలవల్ల మారుతూ ఉంటాయి. విదరాలలోని నీరు, శిలలనచ్చిద్రవ, సంతృప్తత, పరిమితి లండ్రాల లోని పదార్థాల నిరోధకశక్తులు కొన్ని కారకాలు. ఖనిజాలలోను మంచి విద్యుద్వాహకాలు పీన విద్యుద్వాహకాలుగా విభజించవచ్చు. సాధారణంగా దృఢమైన శిలలు పీన విద్యుత్వాహకాలుగా ఉండి హెచ్చు విద్యుత్ నిరోధక శక్తిని కలిగి ఉంటాయి. ఎక్కువ విదరాలతో ఉండి బాగా సంకర్షణం చెందిన శిలలు కొన్ని ఖనిజాల మాదిరిగా తక్కువ విద్యుత్ నిరోధక శక్తిని కలిగి ఉంటాయి.

సాధారణంగా లోహద్యుతి (Metallic Lustre) ఉన్న ఖనిజాలు, వాటి నిక్షేపాలు మంచి విద్యుత్ వాహకాలు. వీటిలో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవలసినవి పైరైట్, పిర్రోటైట్, చార్కోనైట్, ఆర్పిసైట్, గెలీనా, మాగ్నెటైట్ మొదలైనవి వీటిలో సరిపడనివి హెమటైట్, జింక్ బ్లెండ్, గ్రాఫైట్, గ్రాఫైట్ కలిసి ఉన్న షేల్, ప్లిస్ట్, వైరేట్ సైడ్ సిలోమలేస్ కూడా మంచి విద్యుత్వాహకాలే.

నిక్షేపాలు ఎంత వరకు విద్యుత్ వాహకాలు అనేది వాటిలో విద్యుత్ వాహక ఖనిజాలు ఎంతవరకు ఉన్నాయో దానిమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అదే కాకుండా ఈ ఖనిజాల వినరణరీతి కూడా నిక్షేపం విద్యుత్ వాహకత్వాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. ఈ ఖనిజరేణువులు వినరణ చెందినప్పుడు రేణువుకూ రేణువుకూ స్పర్శనరికారేనప్పుడు అటువంటి నిక్షేపము హీన విద్యుత్ వాహకం గానే ఉండి విద్యుత్ వద్దతుల సహాయంతో దాని ఉనికిని కనుక్కోలేని రీతిలో ఉంటుంది. ఇటువంటి సందర్భాలలో విద్యుదయస్కాంత వద్దతులు పనికి వస్తాయి.

విద్యుత్ వద్దతులతో నిక్షేపాన్వేషణ జరిపించడానికి కావలసిన పరికరము ప్రయోగశాలలో చాలా సులభంగా తయారుచేసుకోవచ్చు. దీనికి కావలసిన పరికరాలు: విద్యుచ్ఛక్తిని వుట్టించడానికి హై-టెన్షన్ (High-Tension) బాటరీలు, నాలుగు లోహపు కడ్డీలు - రెండు విద్యుత్ ప్రవాహపు ఎలక్ట్రోడ్లు, మరి రెండు వోల్టేజ్ ప్రోబ్లు - ఒక మిల్లి అమ్మీటర్, ఒక వోల్ట్ మీటర్, తగినంత పొడవు ఉన్న విద్యుత్ బంధకము గల తీగె.

నిక్షేపాన్వేషణకు ఉపయోగపడే విద్యుత్ వద్దతులు రెండు రకాలు: ఒక వద్దతిలో ఒక నిర్ణీత స్థలపు శక్త్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని పరిశీలన స్థానాలవద్ద శక్త్యాలను కొలవడం జరుగుతుంది. రెండవ వద్దతిలో ప్రతి స్థానం వద్ద శక్తి ప్రవణతను (Gradient of the Potential) కొలవడం జరుగుతుంది.

మొదటి వద్దతిలో సమపొటెన్షల్ వద్దతి, “మిసె-ఎ-ల-మాసె (mise-a-la-masse)” వద్దతి ఉన్నాయి. రెండవ దానిలో భూ నిరోధక శక్తి వద్దతులు (Earth-Resistivity methods) పొటెన్షల్ డ్రాప్ (Potential-drop) వద్దతులు ఉన్నాయి.

సమ పొటెన్షల్ వద్దతిలో ఎలక్ట్రోడ్ల సహాయంతో వివిధ విలువలున్న సమపొటెన్షల్ రేఖలను (Equipotential lines) గీస్తారు. ఈ విధంగా తయారు చేసిన సమపొటెన్షల్ మానచిత్రాల (Equipotential maps) లో, సమపొటెన్షల్ రేఖలు మంచి విద్యుత్ వాహకాలైన పదార్థాలవద్ద దూర దూరంగా ఉంటాయి; అటువంటి పదార్థాల అంచుల వద్ద అవి దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయి.

“మిసె-ఎ-ల-మాసె” వద్దతి : ఈ వద్దతిలో భూ అంతర్భాగంలో ఉన్న విద్యుత్ వాహక ద్రవ్యరాశిని (నిక్షేపంగాని, శిలగాని) ఒక ఎలక్ట్రోడ్ గా

పరిగణించి భూతలంమీద వోల్టేజీలను కొలవడం జరుగుతుంది. ఇటువంటి ద్రవ్యరాశిని ఒక ఎలక్ట్రోడ్ గా ఉంచి భూతలం మీద కొన్ని కొన్ని స్థానాల వద్ద లోహపు కడ్డిని రెండవ ఎలక్ట్రోడ్ గా ఉంచి వీటి మధ్య విద్యుత్ ను ప్రవహింప జేసి వివిధ స్థానాలమధ్య నున్న వోల్టేజీను కొలిచి సమపొటెన్షిల్ రేఖలను చూపే మానచిత్రాలను తయారు చేస్తారు. ఈ సమపొటెన్షిల్ రేఖల వైఖరిని బట్టి భూమి లో మరుగునపడి ఉన్న నిక్షేపం ఉనికి, పరిమాణము, నతి మొదలైన వాటిని గురించి తెలుసు కోవచ్చు. ఈ పద్ధతిలో నిక్షేపాన్వేషణ జరిపేప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ ఎర్త్రింగ్ (electrical earthing) చేయడానికి పీలుగా మరుగు పడిన ద్రవ్యరాశి కొద్దిగా నమూనా పైకి కనిపించవలె.

“భూమి నిరోధక శక్తి” పద్ధతులు (Earth Resistivity Methods) :-
సవిన విద్యుత్ పద్ధతులలో ఈ “భూమి నిరోధక శక్తి” పద్ధతులు బాగా అభివృద్ధి చెందినవిగా పరిగణింప బడుతున్నాయి. రెండు విద్యుత్ ఎలక్ట్రోడ్లు, రెండు శక్మాల ఎలక్ట్రోడ్ల సహాయంతో ఏకజాతీయ భూతలాలలోని నిరోధకశక్తులను లెక్కగట్ట వచ్చు. విజాతీయ భూతలాలలోని నిరోధకశక్తులను ఆభాస నిరోధక శక్తులని (Apparent Resistivities) అంటారు.

నిరోధక శక్తి సర్వేక్షణలు (Resistivity Surveys) విద్యుత్ చిద్రణ (Electrical Drilling) గా గాని విద్యుత్ మానచిత్రీకరణ (Electrical mapping) గా గాని జరుపుతారు. నిక్షేపాన్వేషణలో విద్యుత్ మానచిత్రీకరణ చాలా ముఖ్యమైనది. విద్యుత్ చిద్రణ వల్ల భూ తలంమీదనున్న ఒక నిర్దిత స్థానందిగువ భాగంలో లోతును బట్టి విద్యున్నిరోధక శక్తి ఏ విధంగా మారుతుందో ముందుగా కనుక్కొంటారు. ఆ తరువాత ఆ ప్రాంతంలో మనకు తెలిసిన భూగర్భవిజ్ఞానాన్ని బట్టి ఈ విలువలను సరిగా విసరణ చేసుకొని భూ అంతర్భాగ నిర్మితిని అర్థం చేసుకోవలె.

విద్యుత్ ఎలక్ట్రోడ్ల మధ్యదూరం ఎక్కువయ్యేకొద్దీ భూతలం మీది విద్యుత్ శక్మాల బాగా లోతున ఉన్న విజాతీయ పదార్థాల మూలంగా మార్పులు చెందుతాయి. విద్యుత్ చిద్రణ పద్ధతిలో సేకరించిన విలువలను ఆభాస నిరోధక శక్తులను Y-అక్షం మీద ఎలక్ట్రోడ్ల మధ్యదూరా లను X-అక్షం మీద వ్యక్త పరచవలె. లోతున ఉన్న శిలాపదార్థాల విద్యుత్ ప్రవాహకతనుబట్టి తయారు చేసిన గ్రాఫ్ తీరు ఉంటుంది.

విద్యుత్ చిద్రణలో సేకరించిన విషయాలను అతికచ్చితంగా వివరణ చేయడం భూభౌతిక శాస్త్రంలో చాలా కష్టమైన పని.

విద్యుత్ మాన చిత్రీకరణ : నిక్షేపాన్వేషణలో ఆతిథేయ శిల నిరోధక శక్తికి భిన్నమైన నిరోధక శక్తి గల భిన్న ద్రవ్యరాశి చాలా ముఖ్యము. విద్యుత్ చిద్రణ సహాయంతో అటువంటి ద్రవ్యరాశి ఉనికిని గుర్తించ గలిగి నప్పటికి చిద్రణ ఎక్కడ ప్రారంభించవలెనో ముందుగా తెలుసుకోవలె. అందు వల్ల నిక్షేపాన్వేషణలో విద్యుత్ చిద్రణ పద్ధతి పాత్ర చాలా పరిమిత మైనది. విద్యుత్ మాన చిత్రీకరణ నిక్షేపాన్వేషణలో చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తుంది. ఈ పద్ధతిలో భూ తలం మీద షిటిజ సమాంతర (Horizontal) దిశలో విద్యుత్ నిరోధక శక్తులలోని మార్పులను కనుక్కోవలె. విలువలను “ఆభాస నిరోధక శక్తి” (Apparent Resistivity) విలువలుగానే తీసుకోవలె. ఈ విధంగా ఆభాసనిరోధక శక్తుల విలువలతో మానచిత్రాలను తయారు చేసుకో వచ్చు. ఈ మానచిత్రాలను వివరణ చేసి భూమిలో మంచి విద్యుత్ వాహకాలయిన శిలా రాళ్ళున్నాయో లేదా హీన విద్యుత్ వాహకాలయిన రాళ్ళున్నాయో తెలుసు కోవచ్చు. నిరోధకశక్తి విలువలు హెచ్చుగా ఉన్న చోట్ల హీన విద్యుత్ వాహకాలు, ఈ విలువలు తక్కువగా ఉన్న చోట్ల మంచి విద్యుత్ వాహకాలు ఉన్నట్లుగా మనము తెలుసుకోవలె. ఒక్కొక్క చోట శిథిలమైన శిలా వదర్థాలు ఆభాస నిరోధక శక్తి విలువలను బాగా తగ్గించి నిక్షేపం ఉనికిని మరుగు పరుస్తాయి. ఇటు వంటి పరిస్థితులలో విద్యుత్ అయస్కాంతపు పద్ధతుల సహాయం కూడా కావలసి ఉంటుంది.

బోరుహోల్ లలో కూడా విద్యుత్ నిరోధక శక్తి విలువలను మాపనం చేసి శిలల యొక్క, భిన్నాల యొక్క నిరోధకశక్తి విలువలను తెలుసుకోవచ్చు. ఇంతే కాకుండా వివిధ బోరుహోల్ లలోగల నీరలు, విదరాలు మొదలైన వాటిని సమన్వయం చేసుకోవచ్చు. భూతలంమీద కనుగొన్న విలువలు బోరుహోల్ లోని విలువలు ఒకే విధంగా ఉన్నాయా? లేదా ? అని కూడా తెలుసుకోవచ్చు.

విద్యుదయస్కాంత పద్ధతులు

ఏకాంతర విద్యుదయస్కాంత క్షేత్రము (Alternating electro-magnetic field) భూమిలో ప్రసారితమైనప్పుడు అది మధ్యలోనున్న ఏ

విద్యుత్ వాహక పదార్థంలోనైనా విద్యుత్ ప్రవాహాలను ఆపాదిస్తుంది. ఈ ద్వితీయ విద్యుత్ ప్రవాహాలు ఏ విధంగా ప్రవహిస్తాయంటే వీటివల్ల ఏర్పడిన విద్యుదయస్కాంత క్షేత్రము మొదటి క్షేత్రానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది. ఈ ద్వితీయ క్షేత్రము విస్తరించబడినప్పుడు ఏ స్థానం వద్దనైనా మొత్తం క్షేత్రము ప్రాథమిక క్షేత్రానికి (Primary Field) భిన్నంగా ఉంటుంది. ఆపాదించబడిన విద్యుత్ ప్రవాహపు శక్తి విద్యుత్ వాహకపు నిరోధక శక్తిపైనా, ప్రాథమిక క్షేత్రము ఏ పౌనఃపున్యంలో (Frequency) ఏకాంతరమవుతున్నదో దానిపైనా ఆధారపడి ఉంటుంది. సాధారణంగా చెప్పవలెనంటే నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, పౌనఃపున్యము ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఈ విద్యుత్ ప్రవాహము ఎక్కువ బలంగా ఉంటుంది. మరి విద్యుత్ వాహకాలైన గ్రాఫైట్, పైరైట్, పిర్టైటైట్ చార్కోలైట్, గెలీనా, మాగ్నెటైట్ మొదలైన ఖనిజాలున్న నిక్షేపాలను వెదకడానికి విద్యుదయస్కాంత పద్ధతులు చాలా వీలయినవి. విద్యుత్ వాహకాలుగాని హెమటైట్, జింక్ బ్లెండ్, క్రోమైట్ మొదలైన ఖనిజాలు తక్కువ విద్యుత్ నిరోధక శక్తిగల ఖనిజాలతో కలిసి ఉన్నట్లయితే విద్యుదయస్కాంత పద్ధతులు వీటి అన్వేషణకు పనికివస్తాయి. పైరైట్ గాని, గెలీనాగాని కలిసి ఉన్న జింక్ బ్లెండ్ నిక్షేపాలను విద్యుదయస్కాంత పద్ధతులద్వారా కనుక్కోవచ్చు. గ్రాఫైట్ ఖనిజమున్న ప్రదేశాలలో విద్యుదయస్కాంత పద్ధతులతో ఇతర ఖనిజాల ఉనికిని కనుక్కోవడం కష్టము; ఎందువల్లనంటే దాదాపుగా లోహానికంటే విద్యుత్ నిరోధక శక్తి కలిగి ఉన్న గ్రాఫైట్ ఇతరలోహ ఖనిజాల ఉనికిని తెలియనీయకుండా మరుగుపరుస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా పిర్టైటైట్ ఉన్న ప్రదేశాలలో విద్యుదయస్కాంత పద్ధతులద్వారా సల్ఫైడ్ నిక్షేపాల ఉనికిని సులభంగా కనుక్కోవచ్చు. ఎందువల్లనంటే ఈ పిర్టైటైట్ సల్ఫైడ్ నిక్షేపాలతో కలిసి ఉంటుంది.

విద్యుదయస్కాంత సంఘోభాలు (Disturbances) లోహనిక్షేపాలున్న ప్రదేశాలలోనే కాకుండా భ్రంశాలు, విదరాలు, విద్యుద్వాహక నీరలు ఉన్న చోట్ల కూడా కలుగుతుంటాయి. విద్యుదయస్కాంత పద్ధతులతో నిక్షేపాన్వేషణ జరిపించేటప్పుడు పై వాటివల్ల ఏర్పడిన సంఘోభాలను, తంతి తీగలు, నీటి గొట్టాలు, విద్యుత్ వాహక తీగలు మొదలైనవి ఉన్నచోట్ల కలిగే సంఘోభాలను విడిగా గుర్తించగలిగి ఉండవలె.

ఒక విద్యుదయస్కాంత క్షేత్రంలో ప్రతి స్థానంవద్ద విద్యుత్ తీవ్రత (Electric intensity) అయస్కాంత తీవ్రత ఉంటాయి. అన్వేషణ చేసే టప్పుడు మనము అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని మాపనం చేస్తాము కనక అయస్కాంత అనంగతాలను వివరణ చేసేటప్పుడు ఈ క్షేత్రాన్నే ఎంచుకొందాము. అంతర్భాగంలో విద్యుద్వాహక వదార్థం లేని పక్షాన ఏ స్థానం వద్దనైనా ఈ క్షేత్రము ఒక నిర్దిష్టమైన రేఖ మీద డోలనం చెందుతుంది. దీనిని క్షేత్రపు కంపన పరిమితిని ఇచ్చే సరిఅయిన విలువగల నదిశ (Vector) తో నిరూపణ చేయవచ్చు. సంక్షోభం చెందని అయస్కాంత క్షేత్రపు దిశ, విలువ ఉత్పత్తి స్థానము, పరిశీలన కేంద్రాల సాపేక్ష స్థానాలమీద, ఉత్పత్తి స్థానపు స్వభావం మీదా ఆధారపడి ఉంటాయి. అంతర్భాగంలో విద్యుత్వాహకము ఉన్నట్లయితే ఏ స్థానం వద్దనైనా క్షేత్రపు నదిశ మూలముగా ఒకే దిశలో డోలనం చెందకుండా ఒక నిర్దిష్టమైన సమతలంలో దీర్ఘవృత్తాన్ని (Ellipse) ఏర్పరుస్తుంది. ఇటువంటి సందర్భాలలో విద్యుదయస్కాంత క్షేత్రము దీర్ఘవృత్తంగా ద్రువణం చెందింది (elliptically polarised) అని అంటారు.

విద్యుదయస్కాంత క్షేత్రాన్ని “సెర్చ్ కాయిల్ (Search coil)” నహాయంతో మానచిత్రీకరణ చేస్తారు. సెర్చ్ కాయిల్ లో ఉద్భవించిన వోల్టేజ్ చుట్టకు లంబదిశలో ఉన్న విద్యుదయస్కాంతపు అంశానికి అనుపాతంలో ఉంటుంది. చుట్ట యొక్క లంబము క్షేత్రానికి θ కోణంలో ఉన్నప్పుడు, వోల్టేజ్ $F \cos \theta$ కు అనుపాతంలో ఉంటుంది. అందువల్ల కేబుల్ ప్రాథమిక క్షేత్రంలో చుట్టను ఉంచి వంచినప్పుడు, చుట్ట సమతలము క్షేత్రపు సదిశకు లంబంగా ఉన్నప్పుడు, సెర్చ్ కాయిల్ నుంచి వచ్చే సంకేతము (signal) ఎక్కువ బలంగా (Maximum) ఉంటుంది. దీనికి విరుద్ధంగా సదిశ చుట్ట సమతలంలో ఉన్నప్పుడు, సంకేతము అనలు వినబడదు. చలనం చెందని కేబుల్ క్షేత్రంలో అటువంటి నిశ్శబ్దపు స్థానాలు ఎన్నో ఉంటాయి. కాని అంతర్భాగంలో విద్యుద్వాహకం ఉన్నప్పుడు, క్షేత్రము దీర్ఘవృత్తాకారంలో ద్రువణం చెందుతుంది. ఇటువంటి సందర్భాలలో చుట్టలో ఉద్భవించిన వోల్టేజ్ ఏమీలేకుండా ఉండే స్థానం ఒకే స్థానం ఉంటుంది. అప్పుడు చుట్ట సమతలము దీర్ఘవృత్తపు సమతలంతో ఏకీభవిస్తుంది. త్రిపాది (Tripod) మీద నిలబెట్టిన సెర్చ్ కాయిల్ నహాయంతో ద్రువణము యొక్క సమతలాన్ని కనుక్కోవచ్చు. ద్రువణ సమతలానికి అనుచైర్ల్యము, నతి ఉంటాయి.

ద్రువణంలో దీర్ఘవృత్తపు ప్రధాన అక్షం వాలును (tilt) కొలిచి విద్యుదయస్కాంతపు పద్ధతిలో నిక్షేపాన్వేషణ కొనసాగిస్తారు. ఇది కాక విద్యుదయస్కాంత షేత్రపు ఇతర ధర్మాలను ఉపయోగించి కూడా నవీన పద్ధతులతో నిక్షేపాన్వేషణ జరుపుతున్నారు. వాలును (tilt) మాపనం చేసే పద్ధతిని “వాలు-కోణం (tilt angle)” పద్ధతి అంటారు. సాధారణంగా విద్యుదయస్కాంత పద్ధతులు (i) ఫిక్సెడ్-సోర్స్ (Fixed Source) పద్ధతులు, (ii) మూవింగ్ సోర్స్-రిసీవర్ (Moving Source-receiver) పద్ధతులని రెండు రకాలు. మొదటి రకపు పద్ధతులలో షేత్రపు ఉత్పత్తి స్థానము చలనం లేకుండా ఉండి గ్రాహకాన్ని కదలించడం జరుగుతుంది. రెండవ రకపు పద్ధతులలో విద్యుదయస్కాంత షేత్రము, గ్రాహకము రెండూకూడా కదలించ బడతాయి.

విద్యుదయస్కాంత పద్ధతులలో సేకరించిన ఫలితాలను వివరణ చేసేటప్పుడు మనము తెలుసుకొన్న అసంగతాలు నిక్షేపాలకు సంబంధించినవా? లేదా భూ ఉపరితలం మీదనున్న ఉపరిస్థితి భారానికి సంబంధించినవా? అని వివరణ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యమైనది. అనుమానాస్పదంగా ఉన్న సందర్భాలలో రెండు వివిధ పోనోమెట్రాలలో విలువలను తీసుకొంటే సరిపోతుంది.

విద్యుదయస్కాంత పద్ధతుల ద్వారా ఎంత లోతున ఉన్న నిక్షేపాలను కనుక్కోవచ్చు? అనేది అంత సులభమైన ప్రశ్నకాదు. ఖనిజ నిక్షేపం పరిమాణము, ఆకారము, విద్యుద్వాహక శక్తి, ఉత్పత్తిస్థానము, గ్రాహకాల మధ్య దూరము-వీటన్నింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకొని నిక్షేపం లోతును తెలుసుకోవలె.

భూకంపన పద్ధతులు (Seismic Methods)

స్థితి స్థాపక తరంగాల (Elastic Waves) వేగం ఒక్కొక్క శిలలో ఒక్కొక్క విలువతో ఉంటుంది అనే నత్యం మీద ఈ భూకంపన పద్ధతులు (Seismic Methods) ఆధార పడిఉన్నాయి. డై నమైట్ ను ఉపయోగించి పంపిన స్థితిస్థాపక తరంగాలు వివిధ రకపు శిలలద్వారా వివిధ వేగాలతో ప్రయాణించే శిలల అంతర్మఖాల (interfaces) వద్ద పరావర్తనము, వక్రీభవనము చెందుతాయి. ఒకే పర్యాయం పంపిన స్థితిస్థాపక తరంగాలు తిరిగి ఉత్పత్తి స్థానానికి ఎప్పుడు చేరుకొంటాయో తెలుసుకొని వివిధ శిలలయొక్క అంతర్మఖాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో గ్రహించవచ్చు.

ఒక మన పదార్థము రెండు విధాలైన స్థితిస్థాపక తరంగాలను తన గుండా ప్రసారం చేయగలుగుతుంది. ఇవి (i) దీర్ఘ తరంగాలు Longitudinal Waves) (ii) తిర్యక్ తరంగాలు (Transverse waves) అనే రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. దీర్ఘ తరంగాలను P- తరంగాలని, తిర్యక్ తరంగాలను S- తరంగాలని అంటారు.

భూమిలో కంపనాన్ని కలిగించినప్పుడు P, S-తరంగాలు ఏర్పడతాయి, ఇవి ఏక కాలంలో ప్రసరిస్తాయి. పరావర్తనం చెందినప్పుడు గాని, ప్రక్రిభవనం చెందినప్పుడుగాని తరంగం యొక్క స్వభావం మారుతుంది. ఈ విధంగా P - తరంగము పరావర్తనం చెందేటప్పుడు P - తరంగంగా గాని, S - తరంగంగా గాని వెలువడుతుంది. ఈ తరంగాలను, వాటి తదనంతర మార్పులను క్రింది విధంగా గుర్తించడం జరుగుతుంది. PP, PS, SP, PPS మొదలైనవి. శిలలలో కంపన వేగాలు చాలా పరిమితమైన హద్దులలో మారుతూఉంటాయి. కాబట్టి ఈ కంపనవేగాలను ఆధారంగా తీసుకొని శిలలను గుర్తించవచ్చు. దీర్ఘ తరంగాలు, తిర్యక్ తరంగాలకన్న ఎక్కువ వేగంగా ప్రయాణం చేస్తాయి. ద్రవ, వాయు పదార్థాలు తిర్యక్ తరంగాలను ప్రసరింప జేయలేవు.

కంపన పద్ధతులతో నిక్షేపాన్వేషణ జరిపించడం రెండు విధాలుగా చేయ వచ్చు. నిక్షేపాలకు, ఆతిథేయ శిలలకు మధ్యగల స్పర్శలను కంపన పద్ధతులతో గుర్తించి అన్వేషణ కొనసాగించడం మొదటి పద్ధతి. కంపన పద్ధతులను ఉప యోగించి శిలలను కప్పిఉన్న మృత్తిక మందాన్ని, ఆవక్షేప శిలల మందాన్ని కనుక్కోవడం రెండవ పద్ధతి. ఖనిజ నిక్షేపాలలోను, ఆతిథేయ శిలలలోను స్థితి స్థాపక తరంగాల కంపనవేగాలు చాలా తక్కువ తేడాలతో ఉంటాయి. కనక ఖనిజనిక్షేపాలు సాధారణంగా చాలా తక్కువ మందంతో ఉంటాయి. భూమిలో స్థితిస్థాపక తరంగాల ప్రసారం మీద ఈ ఖనిజనిక్షేపాల ప్రభావము చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ కారణంవల్ల ఖనిజనిక్షేపాలను ప్రత్యక్షంగా వెదకడంలో కంపనపద్ధతులు అంత విజయవంతం కాలేదు.

కంపన పద్ధతులను ఉపయోగించి ఉపరితలపు మృత్తికపొర మందము కనుక్కోవడం మిగిలిన అన్వేషణ పద్ధతులకు చాలా అవసరము. కంపన పద్ధ తుల సహాయంతో అవక్షేప శిలల మందం తెలుసుకోవడం నేల బొగ్గు, జిప్సమ్ సల్ఫర్ మొదలైన వాటి నిక్షేపాలను వెదకడానికి ఎంతో సహాయకారి. నేలబొగ్గు

నిజేపాలను కనుక్కోవడానికి పరావర్తన సర్వేక్షణ, వక్రీభవన సర్వేక్షణ రెండూ కూడా వాడుకలో ఉన్నాయి. ఇంజనీరింగ్ నిర్మాణ కార్యక్రమాలలో ఆధారశిల ఎంతలోతున్నదో తెలుసుకోవడానికి కంపన పద్ధతులు వాడుకలో ఉన్నప్పటికీ వీటికయ్యే విపరీతమైన ఖర్చు దృష్ట్యా వీటిని ఎక్కువగా ఉపయోగించ లేక పోతున్నారు.

కంపన తరంగాలను కృత్రిమంగా కలిగించడానికి ఎక్కువ వాడుకలో ఉన్న పద్ధతి డైనమైట్‌ను పేల్చడము. కంపనశక్తి మనకు ఎంతమేరకు కావలెనో అంతమేరకు మాత్రమే మనము డైనమైట్‌ను తీసుకొని కంపనాన్ని కలిగించడం ఈ పద్ధతిలో ఉత్తమము. ఈ విధంగా కంపనాన్ని కలిగించడానికి మనము పేలుడు పదార్థాలను ఉపయోగించడంలోను, నిలవచేయడంలోను చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవలె. కంపన తరంగాలను కనుక్కోవడానికి విద్యుదయస్కాంత సిద్ధాంతం ఆధారంగా వనిజేనే జియోఫోన్‌ల (Geo phones) ను ఉపయోగిస్తారు. కంపనాలను స్వయంచాలకంగా రికార్డ్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది.

కంపన పద్ధతులు రెండు విధాలు : (i) పరావర్తన పద్ధతి (Reflection Method), (ii) వక్రీభవన పద్ధతి (Refraction Method). పరావర్తన పద్ధతిలో భూ ఉపరి తలంలో ఉద్భవించిన తరంగాలు శిలలో V_1 వేగంతో ప్రయాణించేసి అంతర్ముఖం మీది ఒక బిందువు వద్ద పరావర్తనం చెంది, ఉపరి తలం మీద ఉంచిన శోధకం (Detector) ను 't' సెకన్ల కాలంలో చేరితే,

$$t = \frac{2h}{V_1}$$

అవుతుంది. ఒక్కొక్క అంతర్ముఖం ఒక్కొక్క నంకేరాన్ని వంపుతుంది. శిలలో రెండు అంతర్ముఖాలున్నట్లయితే మొదటి అంతర్ముఖం నుండి వచ్చే పరావర్తన తరంగము

$$t_1 = \frac{2h_1}{V_1}$$

కాలంలో శోధకాన్ని చేరుతుంది. రెండవ అంతర్ముఖం నుంచి వచ్చే పరావర్తన తరంగము

$$t_2 = \frac{2h_1}{V_1} + \frac{2h_2}{V_2}$$

కాలంలో శోధకాన్ని చేరుతుంది. V_1, V_2 లను ఆయాశిలలకు ప్రయోగ శాలలో కనుక్కోవచ్చు. మొదటి సమీకరణము సహాయంతో h_1 లెక్క గట్టవచ్చు. h_1 విలువను రెండవ సమీకరణంలో ప్రతిక్షేపించి h_2 ను కనుక్కోవచ్చు.

వక్రీభవన పద్ధతిలో కంపన తరంగాలు ఒక శీలలో ఒక వేగంతో ప్రయాణించేసి మరొక శీలలో ప్రవేశించేటప్పుడు వక్రీభవనము చెంది మరొక వేగంతో ప్రయాణం చేస్తాయి. ఈ కంపన తరంగాల వేగాలను కనుక్కొన్న తరువాత శీలల మందాలను లెక్కగట్టి చెప్పవచ్చు.

రేడియో ధార్మిక పద్ధతులు

కొన్ని మూలకాల కేంద్రకాలు విచ్చిన్నమయినప్పుడు కొన్ని శక్తి మంతాలైన వికిరణాలు (Energetic Radiations) వెలువడుతాయి. తరువాత ఈ మూలకాల కేంద్రకాలు మరొక కొత్త రకపు మూలకాల కేంద్రకాలుగా మారిపోతాయి. ఈ విధంగా కొత్తగా ఏర్పడిన శీల మూలకాలు కూడా రేడియో ధార్మిక శక్తిని కలిగి ఉండవచ్చు. వికిరణాలు ౧. రేణువులు, ౨ - రేణువులని రెండు విధాలు, ౩ - రేణువు హీలియమ్ కేంద్రకము. ౪ - రేణువు ఎలక్ట్రాన్. సాధారణంగా ౫ - రేణువు ధన విద్యుత్తును, ౬ - రేణువు ఋణ విద్యుత్తును కలిగి ఉంటాయి. విద్యుదయస్కాంత వికిరణంలో (Electromagnetic Radiation) ౭ - కిరణాలుంటాయి. ప్రకృతిలో స్వాభావిక సిద్ధంగా రేడియో ధార్మిక శక్తి కలిగియున్న మూలకాలు దాదాపు 50 వరకు ఉంటాయి. వీటినుంచి కృత్రిమంగా తయారైన రేడియో ధార్మిక పదార్థాలు 800 వరకు ఉంటాయి. ప్రకృతి సిద్ధమైన రేడియో ధార్మికత ముఖ్యంగా నెప్ట్యూనియమ్, యూరేనియమ్, థోరియమ్ ల శీలపదార్థాలకు పరిమితమై ఉంటుంది. ఇవికాక కొన్ని ఇతర మూలకాలలో ప్రకృతి సిద్ధంగా లభించే రేడియో ధార్మిక ఐసోటోప్లు కూడా ఉన్నాయి వీటిలో ముఖ్యంగా చెప్పకోవలసినవి పోటాషియమ్, రుబీడియమ్ ల ఐసోటోప్లు.

రేడియో ధార్మిక కేంద్రకాలు ప్రసరించే వికిరణాలు మూడు రకాలు ౧ - వికిరణాలు, ౨ - వికిరణాలు, ౩ - వికిరణాలు. ఇవి వాటి శక్తిని ఒక్కొక్క స్థాయిలో పోగొట్టుకొంటాయి. ౪ - వికిరణాలు చాలా తక్కువ మందమున్న పదార్థంతో ఆవివేయ బడతాయి. ౫ - వికిరణాలు ౬ - వికిరణాలకన్న హెచ్చుదూరం ప్రసరించబడుతాయి. ౭ - వికిరణాలు ప్రసారం చేయబడేటప్పుడు వాటి శక్తి అపవిత్రముగా తగ్గుతుంది. వీటి ఉనికిని చాలా దూరం వరకు కనుక్కోవచ్చు. ఈ మూడు వికిరణాలకు గాలినిగాని, మరి ఇతర వాయువునుగాని ఆయనీ కరణం చేసే శక్తి ఉంది. ఈ విధంగా చేసేటప్పుడు ఆగాలిని, లేదా వాయువును

విద్యుద్వాహకాలుగా మారుస్తాయి. ఇది కాకుండా - కిరణాలకు జింక్ నైట్రైడ్, పీలైట్, ఆక్రథసీన్ మొదలైన పదార్థాల స్పటికాల మీద పడినప్పుడు చిన్న చిన్న కాంతి మేరుపులను సృష్టించే శక్తి ఉంది. ఈ రెండింటి ప్రభావాలవల్ల రేడియో ధార్మిక పికిరణాలను కనుక్కోవచ్చు.

రేడియో ధార్మికత కేంద్రకం యొక్క భర్తం కాబట్టి రేడియోధార్మిక మూలకం రసాయన సంయోగం వల్ల ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. అందువల్ల రేడియో ధార్మికమూలకం ఎటువంటి క్లిష్ట సంయోగ పదార్థంగా ఉన్నప్పటికీ రేడియో ధార్మికత వల్ల దాని ఉనికిని కనుక్కోవచ్చు. α , β , γ -కిరణాలలో γ -కిరణాలు ఎక్కువ దూరం ప్రసరించబడతాయి. కాబట్టి రేడియోధార్మిక మూలకాల అన్వేషణకు γ -కిరణాలను ఉపయోగంలోనికి తీసుకొంటారు.

రేడియోధార్మిక భర్తాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని నిశ్చేపాన్వేషణ జరిపించడానికి భూ ఉపరితలం మీద గాని, అంతర్భాగంలో గాని ఉండవలసిన మేరుకు హెచ్చుగా ఉన్న γ -కిరణాలను కనుక్కోవడం ముఖ్యము. అన్ని రేడియో ధార్మిక మూలకాలు -కిరణాలను విడిచి పెట్టవు, అటువంటి మూలకాల శిశుమూలకాలు (daughter-elements) ఇటువంటి -కిరణాలను విడిచిపెడతాయి. అందువల్ల కొన్ని రేడియోధార్మిక మూలకాల నిశ్చేపాలను వాటి శిశు పదార్థాలు విడిచిపెట్టిన γ -కిరణాల సహాయంతో పరోక్షంగా కనుక్కొంటారు. ఉదాహరణకు యురేనియం నిశ్చేపాలను శిశుయురేనియం మూలకమైన రేడియం నుంచి వెలువడిన α -కిరణాల సహాయంతో కనుక్కొంటారు.

రేడియోధార్మిక పద్ధతులలో నిశ్చేపాన్వేషణ జరిపించడానికి రెండు విధాలైన పరికరాలున్నాయి. మొదటిది గైగర్ కౌంట్ (Geiger Counter) రెండవది సింటిలేషన్ కౌంట్ (Scintillation Counter). ఈ రెండు పరికరాలు γ -కిరణాలను కనుక్కోవడానికి ఉపయోగిస్తాయి. సింటిలేషన్ కౌంట్ గైగర్ కౌంట్ కన్న ఎక్కువ సున్నితమైనది. ప్రతి -కిరణాన్ని ఈ సింటిలేషన్ కౌంట్ లెక్కగడుతుంది.

రేడియో ధార్మిక ఖనిజాలే కాకుండా శిలలు కూడా γ -కిరణాలను ప్రసారం చేస్తాయి. పిచ్చాంతరాళంలో కూడా γ -కిరణాలు ఉన్నాయి. ఈ కారణంగా ప్రతి ప్రదేశంలోనూ పృష్టభూమి పికిరణము (Back-ground Radiation)

ఉంటుంది. రేడియో ధార్మిక సర్వేక్షణలు చేసేముందు ఆయా ప్రదేశాలలోని వృష్ట భూమి వికరణాన్ని తెలుసుకోవాలి. సర్వేక్షణ గైగర్ కౌంటర్ ను చేతిలో ఉంచుకొని నిర్దిష్టమైన దిశలో నడుస్తూ కౌంటర్ ను చించే విలువలను పరిశీలించవలె. ఏ చోట నైనా రేడియో ధార్మిక విసరణ వృష్టభూమి విసరణ కన్న హెచ్చుగా ఉన్నప్పుడు ఆ చోటుకు అన్నివైపులా వివరంగా ఈ సర్వేక్షణను జరిపించవలె. గైగర్ కౌంటర్ లో చూపే విలువ వృష్టభూమి కౌంటర్ కన్న రెండు లేదా మూడు రెట్లు ఉన్న సందర్భాలలో మాత్రమే వివరంగా సర్వేక్షణ జరిపించవలె సర్వేక్షణ పూర్తి అయిన తరువాత ఒకే వికరణంగల స్థానాలనున్న కలుపుతూ, సమోన్నత రేఖలను గీయవలె. ఈ విధంగా సమోన్నత రేఖలతో తయారు చేసిన పటంతో రేడియోధార్మికత కేంద్రీకరించబడిన స్థానాలు ఏర్పాటుగా తెలుస్తాయి. ఇటువంటి విలువలను వివరణ చేసేటప్పుడు ప్రదేశం భూవిజ్ఞానము, స్థలాకృతి దృష్టిలో ఉంచుకోవలె. ఎందువల్లనంటే బాగాలోతున ఉన్న ధనవంత మైన యురేనియమ్ నిక్షేపాలకన్న ఒకటి రెండు యురేనియమ్ ఖనిజాలుగాని థోరియమ్ ఖనిజాలుగాని ఉన్న పెగ్మటైట్ బహిర్గతం ఎక్కువ రేడియోధార్మికతను చూపుతుంది. ప్రదేశంలోని చిన్న చిన్న కాలువలు, లోయలు తదితర వల్లాలు రేడియోధార్మిక ఖనిజాల కేంద్రీకరణకు తగిన స్థావరాలు. అందువల్ల అటువంటి చోట్ల ప్రత్యేకంగా గైగర్ కౌంటర్ తో రేడియో ధార్మికతను కనుక్కోవలె.

భూమి ఉపరితలం మీద గైగర్ కౌంటర్ తో రేడియోధార్మిక సర్వేక్షణను జరిపించవచ్చు. ఇదే విధంగా వాయుమార్గాన పోతూ భూతలంమీది రేడియోధార్మికతను సింటిలేషన్ కౌంటర్ సహాయంతో కనుక్కోవచ్చు. ఇటువంటి పరిస్థితులలో రేడియోధార్మిక విలువలు ఒక కాగితం మీద స్వయంచాలకంగా రికార్డ్ చేయబడతాయి. ఈ కౌంటర్ లలో వాడే స్పటికాలకు విశ్వాంతరాళపు వికరణం తగలకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొంటారు. భూతలం మీదగాని, వాయు మార్గం గుండా గాని చేసిన ఈ సర్వేక్షణల విలువలు ఉపరితలపు పొరలో ఒక మీటర్ వరకు పరిమితమై ఉంటాయి.

నదీలోయలలోను, వాగులలోను, కేంద్రీకృతమై ఉన్న ప్లేనర్ ఖనిజాలలోని రేడియో ధార్మిక ఖనిజాలను గైగర్ కౌంటర్ సహాయంతో గుర్తించి అవి ఏ మూలంనుంచి కేంద్రీకృతమైనవో తెలుసుకోవచ్చు. ప్లేనర్ నిక్షేపాలలోని రేడియో ధార్మిక ఖనిజాలను గైగర్ కౌంటర్ చూపేవిలువలతో అంచనా వేయవచ్చు.

వాయువాహక (ఎయిర్ బోర్న్) పద్ధతులు

వాయువాహకాల సహాయంతో అయస్కాంత, విద్యుదయస్కాంత, రేడియో ధార్మిక పద్ధతులతో నిజేపాన్వేషణ సాగించవచ్చు. భూతలంమీద నిజేపాన్వేషణ ఏ నూత్రం ఆధారంగా జరుపుతామో అదే నూత్రం ఆధారంగా వాయువాహక పద్ధతిలో కూడా సర్వేక్షణ జరపడం జరుగుతుంది. వాయువాహక పద్ధతులలో చాలా తక్కువ ప్యవధిలో ఎక్కువ విశాలమైన ప్రదేశంలోని విలువలను సేకరించవచ్చు. సర్వేక్షణ జరపవలసిన ప్రదేశము చాలా పెద్దదయినప్పుడు భూతలంమీద సర్వేక్షణ కన్న వాయువాహక సర్వేక్షణ ఎన్నో రెట్లు లాభదాయకము. ఇదే కాకుండా మూడువిధాలైన (విద్యుత్, విద్యుదయస్కాంత, రేడియోధార్మిక) పద్ధతులలో ఒకే పర్యాయము సర్వేక్షణ జరిపించవచ్చు.

వాయువాహక పద్ధతులతో సర్వేక్షణ జరిపించే ముందు ఏదిశలలో సర్వేక్షణ జరిపించవలెనో, సర్వేక్షణ అంతరాలు ఎంతెంత ఉండవలెనో ముందుగానే నిర్ణయించుకోవలె. ఈ పద్ధతులలో మరొక ముఖ్యమైన విషయము: సర్వేక్షణ కయ్యే ఖర్చులకు వచ్చే ఫలితాలు లాభసాటిగా ఉండేటట్లుగా చూసుకోవలె. సర్వేక్షణ అంతరాలు ఎంత ఎత్తు నుంచి వాయువాహకం పోతుందో దానిమీద కూడా ఆధారపడి ఉంటాయి. 1000 అడుగుల ఎత్తునుంచి జరిపే సర్వేక్షణకు అంతరము $1/4$ మైలునుంచి ఒక మైలు వరకుగాని లేదా 500 మీటర్ల నుంచి 2 కిలో మీటర్ల వరకుగాని ఉండవచ్చు. అయస్కాంతపు, రేడియోధార్మిక సర్వేక్షణలు ఎక్కువ ఎత్తునుంచి సాగించవచ్చు. విద్యుదయస్కాంతపు సర్వేక్షణ తక్కువ ఎత్తునుంచి, అంటే 30 నుంచి 150 మీటర్ల వరకుగాని లేదా 100 నుంచి 500 అడుగుల వరకుగాని జరిపించవలె. ఈ సందర్భాలలో సర్వేక్షణ అంతరాలు 125-250 మీటర్లు గాని 400-1000 అడుగులుగాని ఉండవలె. ఈ పద్ధతిలో నిజేపాన్వేషణ కోసం సర్వేక్షణ జరిపించేటప్పుడు వాయుమార్గం గుండా తీసిన ఫోటోగ్రాఫ్లలోని స్థలాకృతిని, మరిగితర వివరాలను ఆధారంగా తీసుకొంటే సర్వేక్షణ చాలాసుకరంగా ఉంటుంది. సర్వేక్షణలో భూభౌతిక విలువలతో బాటు వాయువాహనపు ఎత్తు కూడా రికార్డు చేయవలె.

వాయువాహక పద్ధతిలో భూభౌతిక విలువలు సరిగా ఏ స్థానాలకు సంబంధించినవో చెప్పడానికి కొన్ని పరిమితులున్నాయి. ఈ పద్ధతిలో మనము సేకరించే అసంగతాలు భూతలం మీద సేకరించిన అసంగతాల మాదిరి

వివరంగా ఉండవు. ఈ కారణంగా కేవలం వాయువాహక పద్ధతులలో సేకరించిన ఫలితాలను ఆధారంగా చేసుకొని నిక్షేపాన్వేషణకు భూమి మీద తవ్వకాలు ప్రారంభించరాదు. భూతలం మీది సర్వేక్షణలోని విలువల సహాయంతో వాయువాహక పద్ధతిలోని విలువలను రూఢి చేసుకొన్న తరువాతనే వివరంగా నిక్షేపాన్వేషణకు ఉపక్రమించవలె.

భూభౌతిక పద్ధతులు - పరిమితులు

ప్రతి భూభౌతిక పద్ధతికీ కొన్ని పరిమితులున్నాయి. చాలా సందర్భాలలో ఒకే భూభౌతిక పద్ధతి ఆధారం చేసుకొని నిక్షేపాన్వేషణ జరిపించడం అంతసులభం కాకపోవచ్చు. రెండు గాని అంతకు ఎక్కువగాని పద్ధతులను ఉపయోగించి నిక్షేపాన్వేషణ జరిపించడం చాలా మంచిది. ఏ పద్ధతులు, ఎన్ని పద్ధతులు ఉపయోగంలోకి తీసుకోవలె అనే విషయం స్థానిక స్థలాకృతి మీద, భూ విజ్ఞానం మీద, ఖనిజ సంఘటనం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనికి తోడు ఆర్థికంగా ఎంతవరకు లాభదాయకమో కూడా ఆలోచించవలె. ఈ విషయంలో మనము ముందుగా తయారు చేసుకొన్న నియమాల కన్న అనుభవము, విచక్షణ ఎక్కువ సహాయకారులుగా ఉంటాయి.

భూ భౌతిక పద్ధతులలో ఒకే పద్ధతిలో సేకరించిన ఫలితాలు వివరణ చేసేకన్న వాటికి మరొక పద్ధతితో సేకరించిన ఫలితాలను జోడించి వివరణ చేయడం చాలా లాభదాయకమని చెప్పడానికి ఈ దిగువ కొన్ని ఉదాహరణలు ఇవ్వడం జరిగింది.

అయస్కాంతపు అసంగతాల సహాయంతో అయస్కాంత నిక్షేపాలున్నవని చెప్పగలము కాని అవి మాగ్నటైట్ నిక్షేపాలా? లేదా పిర్టైటైట్ నిక్షేపాలా అనిచెప్పలేము. దీనికి సెల్ఫ్ పొటెన్షియల్ పద్ధతి జోడించినట్లయితే పిర్టైటైట్ ఉన్నదోలేదో చెప్పగలము.

భూమి పొరదిగువ భాగంలో వివిధ రకాలయిన విద్యుద్వాహక నిక్షేపాలు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నట్లయితే విద్యుదయస్కాంత పద్ధతిలో వీటన్నింటినీ గుర్తు పట్టడం సాధ్యంకాదు. దీనికి తోడు నిరోధకత సర్వేక్షణ (Resistivity Survey) జరిపితే అది సాధ్యమవుతుంది.

విద్యుత్ పద్ధతిలోని అసంగతాలు సల్ఫైడ్ నిక్షేపాల వల్ల ఏర్పడినవా లేదా సంక్లిష్ట శిలా పదార్థం వల్ల ఏర్పడినవా? అనేది చెప్పడం కష్టము. దీనికి తోడు అయస్కాంత సర్వేక్షణ జరిపిస్తే సల్ఫైడ్ నిక్షేపాలున్నవో లేదో చెప్పవచ్చు. ఎందువల్ల నంటే చాలాచోట్ల సల్ఫైడ్ నిక్షేపాలలో అయస్కాంత ధర్మమున్న పిర్రోటైట్ ఉంటుంది.

విద్యుదయస్కాంత సర్వేక్షణలో గుర్తించబడిన సల్ఫైడ్ నిక్షేపాల పరిమాణం చెప్పడానికి గురుత్వాకర్షణ పద్ధతులు సహాయ పడతాయి.

పైన పేర్కొన్న భూభౌతిక పద్ధతులలో ఒకటి గాని అంతకు హెచ్చుగాని పద్ధతులలో అంతరిక్షంలో తిరుగుతున్న కృత్రమ ఉపగ్రహం నుంచి కూడా సర్వేక్షణ జరిపించవచ్చు. ఉపగ్రహము భూమికి చాలాఎత్తున ఉంటుంది. కాబట్టి సర్వేక్షణకు వాడే పరికరాలు చాలా సున్నితమయినవి, శక్తిమంతమైనవి అయి ఉండవలె.

ఉపగ్రహపు సహాయంతో సేకరించిన ఫలితాలకు భూతలంమీద సేకరించిన ఫలితాలనుచేర్చి వివరణ చేసిన తరువాతనే నిక్షేపాన్వేషణకు త్రవ్వకాలు ప్రారంభించవలె.

రిమోట్ సెన్సింగ్ పద్ధతి

ఆధునిక యుగంలో విజ్ఞానాభివృద్ధితో బాటు అన్వేషణ పద్ధతులు కూడా అభివృద్ధి చెందినాయి. ఈ విధంగా రిమోట్ సెన్సింగ్ పద్ధతి ద్వారా నిక్షేపాన్వేషణ జరపడానికి ప్రయత్నాలు సాగుతున్నాయి. ఈ పద్ధతి ఇంకా ప్రారంభదశలోనే ఉంది. ఆయినప్పటికీ ముందు ముందు ఈ పద్ధతి ఎక్కువ వాడుకలోకి రావడానికి చాలా అవకాశాలున్నాయి. ఈ పద్ధతిలో శీలల, ఖనిజ స్వరూపాల సంఘటన, నాంధ్రత, వయనము, ఉష్ణోగ్రత, వాటిలోని తేమ మొదలైన వాటిని ఈ స్వరూపాలు పరావర్తించే విద్యుదయస్కాంత వికిరణాల సహాయంతో రికార్డ్ చేయవచ్చు. పరావర్తనం చెందే విద్యుదయస్కాంత వికిరణాల తరంగదైర్ఘ్యము (Wave Length) వర్ణపటంలో అతినీలలోహిత ప్రాంతం (Ultra-Violet Region) నుంచి సూక్ష్మతరంగ ప్రాంతం (Micro-Wave Region) వరకు ఉంటుంది.

రిమోట్ సెన్సింగ్ వద్దతుల సహాయంతో ఖనిజ నిక్షేపాన్వేషణకు మూలాధారమైన ప్రాంతీయ సర్వేక్షణను జరిపించవచ్చు. వాయువాహకాల సహాయంతోగాని, అంతరిక్షంలోని ఉపగ్రహాల సహాయంతోగాని ఈ రిమోట్ సెన్సింగ్ వద్దతులు ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ వద్దతులను మామూలు భూ విజ్ఞాన శాస్త్ర వద్దతులతో జతపరిచినట్లయితే విషయసేకరణ మరింత సులభతరమవుతుంది. అంతరిక్షం నుంచి ఉపగ్రహం సహాయంతో తీసిన ఫోటోగ్రాఫ్ నుంచి ఎక్కువ విస్తీర్ణమున్న ప్రాంతాల ప్రాంతీయ నిర్మితులను, శిలా స్వరూపాలను అర్థంచేసుకోవడం చాలా సులభసాధ్యమవుతుంది. బహువర్ణపట (Multi-Spectral) ఫోటోగ్రఫీ సహాయంతోను, తాడారు ప్రతిబింబ సహాయంతోను శిలాస్వరూపాల అశ్రు విజ్ఞాన మార్పులను, నిర్మితులను ఎక్కువ విశదంగా తెలుసు కోవచ్చు. నిక్షేపాన్వేషణలో రాడారు సహాయంతో ఖనిజ సముదాయాలన్న భ్రంశమండలాలనూ, నైసర్గిక స్వరూప ఖనిజ మార్గ దర్శకాలను, వటలను, శిలా స్వరూపాల స్పర్శలనూ గుర్తించ వచ్చు. భ్రంశమండలాలను శిలా స్పర్శలను, ఆక్సికరణ మండలాలను "థర్మల్ ఇమేజరీ (Thermal Imagery)" సహాయంతో కూడా గుర్తించవచ్చు. వృక్ష భూరసాయనిక నిక్షేపాన్వేషణలో (Bio-Geochemical Prospecting) మొక్కలలోని మార్పులు ఏ విధంగా ఉన్నాయో తెలుసుకోవలె కదా! ఖనిజీకృత ప్రాంతంలో పెరుగుతున్న ఒకే రకపు మొక్కల ఆకుల సముదాయంలోని మార్పులను బహు వర్ణపట ఫోటోగ్రఫీ సహాయంతో కనుక్కువచ్చు. రిమోట్ సెన్సింగ్ వద్దతుల సహాయంతో మనము కనుక్కులేనివి ఈ కింద పేర్కొనబడిన ఖనిజ మార్గ దర్శకాలు: లోహోద్భవ ఉపయుగాల (Metallogenetic Epochs) కు ఖనిజ నిక్షేపాలకున్న వయోసంబంధం (age-relationship), ఖనిజ కేంద్రీకరణకు అనుకూలమైన భూత వర్తమాన వాతావరణ పరిస్థితులు, అంతర్భూ మజలలోని లోహపరిమాణము, ఆక్సికరణ అవతరణము (oxidational Subsidence) గుర్తించడం, కుడ్యశిలాశైథిల్యము (Wall Rock alteration), హైపోజీన్ మండలికరణ (Hypogene Zoning) ద్రావణీయాల రహ దారులను సూచించే ఖనిజ మార్గ దర్శకాలు.

ఉపగ్రహాల సహాయంతో పరిశోధనలు ఇంకా ప్రారంభదశలోనే ఉన్నాయి. ముందు ముందు ఈ పరిశోధనలు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యం పొందడానికి అవకాశాలున్నాయి. రిమోట్ సెన్సింగ్ వద్దతులు రానున్న కాలంలో వివిధ పరిణామాలు చెంది నిక్షేపాన్వేషణకు ఎక్కువ ఉపయోగకారిగా ఉంటుందనడానికి ఏ మాత్రం సందేహంలేదు.

ముగింపు

ఖనిజ నిక్షేపాలను వెదకడానికి మొదట్లో కొన్ని గుర్తుల సహాయం తీసుకొనేవారు. తరవాత భూవిజ్ఞాన శాస్త్రపద్ధతులు విరివిగా వాడుకలోకి వచ్చినాయి. ఆ తరవాత భూరసాయనిక పద్ధతులు, భూభౌతిక పద్ధతులు అమలులోకి వచ్చినాయి. నిక్షేపాన్వేషణ పద్ధతులు ఎక్కువయినకొద్దీ కొత్త నిక్షేపాల ఉనికిని కనుక్కోవడం సులభమయింది. ఈ విధంగా కొత్త కొత్త నిక్షేపాలు బయటపడటంతో వాటిని వెలికి తీసి వాడటం కూడా ఇంతకు ముందెన్నడూ కనిపిస్తోంది. ఎరుగని వేగంతో జరుగుతుంది. దీని ఫలితము భూతలంమీదను, అంతర్భాగంలోను ఉన్న ఖనిజనిక్షేపాలు హరించుకొని పోవడం చాలా తొందరగా జరుగుతుంది. ఈ విధంగా భూమిమీది ఖనిజసంపద తరిగి పోయినప్పుడు ఇన్ని నాళ్ళుగా ఖనిజాల మీద ఆధారపడిన మానవుడు ఏమి చేయవలె? రానున్న ఖనిజసంక్షోభం నుంచి తప్పించుకోవడానికి మానవుడు ఇప్పటినుంచీ సముద్ర జలాల నుంచి, సముద్రపు అడుగున భూతలంనుంచి, భూ అంతర్భాగం నుంచి ఖనిజాలను సేకరించడానికి విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు. ఈ విధమైన ప్రయత్నాలలో ఫలవంతమైనది సముద్రం అడుగున ఉన్న శిలల నుంచి చమురును తవ్వీ తీయడం. సముద్రపు నీటిలో అనేక లోహాలున్నాయి. సముద్రపు లోతులలో భూతలం మీద ఖనిజాలున్నాయి. వీటిని సేకరించవలెనంటే వీటి అన్వేషణ కొత్త పద్ధతుల సహాయంతో చేయవలె. తరవాత వాటిని బయటకు తీయడానికి గాని, కేంద్రీకరించడానికి గాని ఆర్థికంగా లాభసాటిగా ఉండే పద్ధతులు కనిపెట్టవలె. అప్పుడు మరికొంత కాలం మానవుడు ఖనిజ సంపదమీద ఆధారపడి మనుగడి సాగించవచ్చు. శాస్త్రపురోభివృద్ధితో బాటు ఇవన్నీ జరగడానికి అవకాశముందని చెప్పడం అతిశయోక్తికాదు. భూ అంతర్భాగంలో సముద్ర జలాలలోను, సముద్రగర్భంలోని శిలలలో ఉన్న ఖనిజ నిక్షేపాలన్నీ హరించుకొని పోయినప్పుడు మానవుడు మరో గ్రహం నుంచి ఖనిజాలను సేకరించడం అంతకష్టం కాకపోవచ్చు. ఆ తరుణం రాకమానదు.